



دليل المعلم

# الإنتاج النباتي

( النظري والتدريب العملي )

دليل المعلم / الإنتاج النباتي

المستويان الثالث والرابع

للمرحلة الثانوية

الفرع الزراعي

الطبعة الأولى

١٤٣٤هـ / ٢٠١٣م

المستويان الثالث والرابع

للمرحلة الثانوية

الفرع الزراعي





إدارة المناهج والكتب المدرسية

# دليل المعلم الإنتاج النباتي

(النظري والتدريب العملي)

المستويان الثالث والرابع  
للمرحلة الثانوية  
الفرع الزراعي

## تأليف

م. محمود نجاتي عياش

د. عمر زكي الذيابات

م. نبيل علي بطاينة

م. عامر منير للس

الناشر  
وزارة التربية والتعليم  
إدارة المناهج والكتب المدرسية

يسر إدارة المناهج والكتب المدرسية استقبال آرائكم وملاحظاتكم على هذا الدليل عن طريق العناوين الآتية:

هاتف: ٤٦١٧٣٠٤/٥-٨، فاكس: ٤٦٤٥٨٨٨ - ٤٦٣٧٥٦٩، ص.ب: (١٩٣٠)، الرمز البريدي: ١١١١٨،

أو بوساطة البريد الإلكتروني: VocSubjects.Division @ moe.gov. jo

قررت وزارة التربية والتعليم استخدام هذا الدليل في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار مجلس التربية والتعليم رقم (٢٠١٣/٦٦)، في جلسته رقم (٢٠١٣/٥)، تاريخ ١٩/٨/٢٠١٣م، بدءاً من العام الدراسي ٢٠١٣/٢٠١٤م.

الحقوق جميعها محفوظة لوزارة التربية والتعليم  
عمّان - الأردن / ص . ب . ١٩٣٠

#### لجنة التوجيه والإشراف على التأليف

د. عمر مقداد مقداي  
م. عادل أحمد ممتاز  
م. عبد الله محمود الهور  
م. بادرة حميد اليماني  
م. غسان فوزان الحايك

التحرير العلمي: د. عمر مقداد مقداي  
التحرير اللغوي: ناصر علي محمد  
التحرير الفني: نداء فؤاد أبو شنب  
التصميم: فخري موسى الشبول  
الإنتاج: سليمان أحمد الخلايلة

دقق الطباعة: د. عمر مقداد مقداي  
وراجعها: م. عادل أحمد ممتاز

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية  
(٢٠١٣/١٠/٣٦٦٦)  
ISBN: 978-9957-84-504-9

المقدمة

٩

الطالب الذي نريد في التعليم المهني

١٠

إرشادات التعامل مع الدليل

١١

النتائج العامة

١٣

الخطة الزمنية

١٥

نموذج مقترح لتحضير حصة

١٦

إرشادات تطبيقية

١٦

### المستوى الثالث

الوحدة الأولى: البستنة الشجرية

٢٥

أولاً: اللوزيات

٢٦

التمرين (١-١): تمييز نباتات اللوزيات

٤٢

التمرين (٢-١): قطف ثمار اللوزيات

٤٤

ثانياً: التفاحيات

٤٦

التمرين (٣-١): تكثير التفاحيات بالترقيد الهرمي

٦٠

التمرين (٤-١): تمييز نباتات التفاحيات

٦٠

التمرين (٥-١): تقليم التفاحيات تقليماً إثمارياً

٦٢

التمرين (٦-١): جني ثمار التفاحيات

٦٢

ثالثاً: الحمضيات

٦٤

التمرين (٧-١): تكثير الحمضيات بالعقل الساقية شبه المتخشبة.

٧٤

التمرين (٨-١): تمييز نباتات الحمضيات

٧٦

التمرين (٩-١): تقليم الحمضيات تقليماً إثمارياً

٧٦

التمرين (١٠-١): خدمة بساتين الحمضيات

٧٨

التمرين (١١-١): جني الحمضيات

٧٨

رابعاً: الموز

٨٠

التمرين (١٢-١): تكثير نباتات الموز بالفسائل

٨٨

التمرين (١٣-١): تمييز نباتات الموز

٨٨

التمرين (١٤-١): تقليم نباتات الموز

٩٠

التمرين (١٥-١): جني الموز وإنضاجه

٩٠

خامساً: الزيتون

٩٢

التمرين (١٦-١): تكثير نباتات الزيتون بالعقل الغضة.

١٠٢




١٠٢	التمرين (١٧-١) : تمييز نباتات الزيتون .....
١٠٤	التمرين (١٨-١) : تقليم الزيتون تقليمًا إثماريًا .....
١٠٤	التمرين (١٩-١) : جني ثمار الزيتون .....
١٠٦	سادسًا: نخيل البلح .....
١٢٤	التمرين (٢٠-١) : تكثير نباتات النخيل بالفسائل .....
١٢٦	التمرين (٢١-١) : زراعة فسائل النخيل في الأرض الدائمة .....
١٢٨	التمرين (٢٢-١) : تمييز نباتات النخيل .....
١٣٠	سابعًا: العنب .....
١٤٠	التمرين (٢٣-١) : تكثير نباتات العنب بالترقيد البسيط .....
١٤٠	التمرين (٢٤-١) : التقليم الإثماري لشجيرات العنب .....
١٤٢	التمرين (٢٥-١) : تمييز نباتات العنب .....
١٤٤	ثامنًا: التين .....
١٥٠	التمرين (٢٦-١) : تكثير نباتات التين بالعقل الساقية المتخشبة .....
١٥٢	التمرين (٢٧-١) : تمييز نباتات التين .....
١٥٤	تاسعًا: الفراولة .....
١٥٨	التمرين (٢٨-١) : تكثير نباتات الفراولة بالمدادات .....
١٦١	<b>الوحدة الثانية: البستنة الخضرية</b> .....
١٦٢	أولاً : الفصيلة الباذنجانية .....
١٦٤	البندورة .....
١٦٦	الباذنجان .....
١٦٨	البطاطا .....
١٧٠	الفلفل .....
١٧٢	التمرين (٢-١) : الوصف النباتي للفصيلة الباذنجانية .....
١٧٤	ثانيًا: الفصيلة القرعية .....
١٧٤	الكوسا .....
١٧٨	الخيار .....
١٨٠	البطيخ .....
١٨٤	التمرين (٢-٢) : عمليات الخدمة للفصيلة القرعية .....
١٨٤	التمرين (٣-٢) : تسليق الخيار وتقليمه في البيوت المحمية .....
١٨٦	التمرين (٤-٢) : الوصف النباتي للفصيلة القرعية .....

١٨٨	ثالثاً : الفصيلة الصليبية الملفوف
١٨٨	الزهرة
١٩٠	الفجل
١٩٢	التمرين (٢-٥): الوصف النباتي للفصيلة الصليبية
١٩٤	التمرين (٢-٦): عملية تبيض الزهرة
١٩٦	رابعاً : الفصيلة البقولية
١٩٦	الفاصولياء
١٩٨	البازيلاء
٢٠٠	خامساً: الفصيلة الخيمية
٢٠٠	الجزر
٢٠٢	البقدونس
٢٠٤	سادساً : الفصيلة النرجسية
٢٠٦	البصل
٢٠٨	الثوم
٢١٠	سابعاً: الفصيلة اليزفونية
٢١٠	الملوخية
٢١٢	ثامناً: الفصيلة الخبازية
٢١٢	الباميا
٢١٤	تاسعاً: الفصيلة الرامرامية
٢١٤	السبانخ
٢١٦	عاشراً: الفصيلة المركبة
٢١٦	الخس
٢١٨	التمرين (٢-٧) : جني الخضراوات
<b>المستوى الرابع</b>	
٢٢٣	الوحدة الأولى: المحاصيل الحقلية
٢٢٤	أولاً: الفصيلة النجيلية
٢٣٢	التمرين (١-١): تجهيز الأرض لزراعتها بالمحاصيل الحقلية
٢٣٤	التمرين (١-٢): زراعة الأرض بالمحاصيل الحقلية
٢٣٦	التمرين (١-٣): خدمة المحاصيل الحقلية
٢٣٨	التمرين (١-٤): الوصف النباتي للقمح والشعير
٢٣٨	التمرين (١-٥): الوصف النباتي للذرة الصفراء والبيضاء

٢٤٠	ثانياً : الفصيلة البقولية .....
٢٥٠	التمرين (١-٦): الوصف النباتي للعدس .....
٢٥٠	التمرين (١-٧): الوصف النباتي للحمص .....
٢٥٢	التمرين (١-٨): الوصف النباتي للفلو .....
٢٥٢	التمرين (١-٩): الوصف النباتي للكرسنة .....
٢٥٢	التمرين (١-١٠): الوصف النباتي للجلبانة .....
٢٥٤	التمرين (١-١١): الوصف النباتي للبقية .....
٢٥٤	التمرين (١-١٢) : الوصف النباتي للبرسيم المصري والفصة (البرسيم الحجازي) .....
٢٥٦	ثالثاً: الفصيلة السمسامية .....
٢٥٨	رابعاً: الفصيلة المركبة .....
٢٦٠	التمرين (١-١٤): الوصف النباتي لدوار الشمس .....
٢٦٠	التمرين (١-١٥): الوصف النباتي للعصفر .....
٢٦٢	خامساً: الفصيلة الرامرامية .....
٢٦٢	التمرين (١-١٦): الوصف النباتي للشمنندر .....
٢٦٤	سادساً: آلات الحصاد .....
٢٦٦	سابعاً: آلات جمع الأعلاف وكبسها .....
٢٧٢	ثامناً: آلات جرش الأعلاف وخلطها .....
٢٧٦	تاسعاً: المشكلات التي تواجه زراعة المحاصيل الحقلية في الأردن .....
٢٧٩	<b>الوحدة الثانية: إنتاج النباتات الطبية والعطرية</b> .....
٢٨٠	أولاً: البابونج .....
٢٨٢	التمرين (٢-١): جني نورات البابونج وتجفيفها وتعبئتها وتخزينها .....
٢٨٤	ثانياً: الزعتر .....
٢٨٦	التمرين (٢-٢): جني نباتات الزعتر وتجفيفها وتعبئتها وتخزينها .....
٢٨٨	ثالثاً: النعناع .....
٢٨٨	التمرين (٢-٣): جني نباتات النعناع وتجفيفها وتعبئتها وتخزينها .....
٢٩٠	رابعاً: الميرمية .....
٢٩٠	التمرين (٢-٤): جني نباتات الميرمية وتجفيفها وتعبئتها وتخزينها .....
٢٩٢	خامساً: اليانسون .....
٢٩٢	التمرين (٢-٥): جني نباتات اليانسون وتجفيفها واستخراج بذورها وتعبئتها وتخزينها .....
٢٩٤	سادساً: الحلبة .....
٢٩٦	التمرين (٢-٦): جني نباتات اليانسون وتجفيفها واستخراج بذورها وتعبئتها وتخزينها .....

٢٩٨	..... سابعا: القزحة
٣٠٠	..... التميرين (٢-٧): جني نباتات القزحة وتجفيفها واستخراج بذورها وتعبئتها وتخزينها
٣٠٢	..... ثامنا: تجهيز الأرض وزراعتها ببذور النباتات الطبية والعطرية وأشتالها
٣٠٢	..... التميرين (٢-٨): تجهيز الأرض وزراعتها ببذور النباتات الطبية والعطرية وأشتالها
٣٠٤	..... تاسعا: خدمة النباتات الطبية والعطرية
٣٠٦	..... التميرين (٢-٩): إجراء عمليات الخدمة اللازمة للنباتات الطبية والعطرية
٣٠٨	..... التميرين (٢-١٠): التمييز بين النباتات الطبية والعطرية
٣١٠	..... عاشرا: الأهمية العلاجية والاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية
٣١٠	..... الحادي عشر: تقسيم النباتات الطبية والعطرية
٣١٣	..... <b>الوحدة الثالثة: الوقاية النباتية</b>
٣١٤	..... أولا: الحشرات الاقتصادية، تصنيفها وصفاتها العامة
٣٢٠	..... ثانيا: مكافحة الكيماوية للآفات الزراعية
٣٢٦	..... التميرين (٣-١): دراسة الملققات التي على علب المبيدات
٣٢٦	..... التميرين (٣-٢): تحضير محاليل مبيدات الآفات القابلة للذوبان في الماء ورشها
٣٢٨	..... التميرين (٣-٣): تحضير الطعوم السامة من مادة فوسفيد الزنك
٣٣٠	..... ثالثا: مكافحة غير الكيماوية للآفات الزراعية
٣٣٢	..... التميرين (٣-٤): التعقيم الشمسي للتربة في الزراعة المحمية
٣٣٤	..... التميرين (٣-٥): مكافحة الميكانيكية للآفات الزراعية
٣٣٦	..... التميرين (٣-٦): استخدام المصائد في مكافحة الآفات
٣٣٨	..... رابعا: مكافحة المتكاملة
٣٤٠	..... خامسا: أبرز آفات النبات الشائعة في الأردن وأمراضها
٣٥٤	..... سادسا: الآلات المستخدمة في مكافحة الآفات
٣٥٨	..... التميرين (٣-٧): آلات الرش اليدوية
٣٦٠	..... التميرين (٣-٨): آلات تعفير المبيدات
٣٦٢	..... التميرين (٣-٩): معايرة آلة الرش المحمولة أو المجرورة
٣٦٥	..... <b>الملاحق</b>
٣٦٧	..... <b>ملحق (١): إجابات الأسئلة</b>
٤١٩	..... <b>ملحق (٢): استراتيجيات التقويم وأدواته</b>





## المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الزملاء المعلمون الأفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انطلاقاً من رؤية وزارة التربية والتعليم نحو التطوير والتحديث الشامل للعملية التربوية، وفي ضوء الرؤية الملكية التي تولي القطاع الزراعي أهمية كبيرة لإحداث تنمية شاملة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، نضع بين أيديكم دليل مبحث (الإنتاج النباتي) للمرحلة الثانوية/ الفرع الزراعي/ المستوى الرابع وقد جاء محتوى التعلم لهذا الدليل ترجمة صادقة للنتائج العامة والخاصة للمباحث الزراعية، ومركزاً على اهتمام الطلبة وتنمية التفكير الناقد لديهم، وبناء التوازن بين المعارف والمهارات والقيم، لتجذير العمل الزراعي لديهم، ومراعياً توظيف استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفروق الفردية وتنوع اهتمامات الطلبة وفق الخصوصيات البيئية.

واعتمد هذا الدليل على الكتاب مباشرة على نحو متسلسل لتسهيل عملية تخطيط الدروس، وراعى التنوع في أساليب التدريس بما يتلاءم مع مستوى المتعلمين وميولهم وقدراتهم، وعمل على تحقيق التكامل بين النظرية والتطبيق وتزويد المعلم ببعض المعلومات الإثرائية التي تعينه على تحقيق النتائج.

وقد ارتبط أيضاً بخطة تحضير الدروس (دفتر التحضير)؛ لكي يسهل على المعلم تحضير الدروس وتنفيذ الخطة وتقويم الطلبة اعتماداً على أساليب التقويم وأدواتها الحديثة.

واهتم كذلك بتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بوصفها أداة لتفعيل التعلم الإيجابي؛ تخطيطاً؛ وتنفيذاً؛ وتقويماً.

إنّ هذا الدليل ما هو إلا جهد متواضع، نأمل منكم ألا تقتصروا عليه في إعداد الدروس وإثراء المحتوى الدراسي، فهو إحدى الوسائل التي تعينكم على أداء مهمتكم بما يوفره من البدائل والأنشطة والاقترحات اعتماداً على خبراتكم وقدراتكم.

والله وليّ التوفيق

المؤلفون

تهدف خطة التطوير التربوي المبني على الاقتصاد المعرفي إلى إعداد جيل من الطلبة يتمتع بمهارات حياتية تركز على عقيدة الأمة، ومبادئها، وقيمها الأصيلة، ويمثل استثماراً حقيقياً للمعرفة والخبرات. ولما كان طلبة اليوم هم بناء المجتمع غداً، الذين يتحملون مسؤولية الارتقاء به في مختلف جوانب الحياة، فإن المناهج الجديدة تسعى إلى تنمية طالب يتصف بما يأتي:

- ١ - يتحلّى بأخلاقيات المهنة النابعة من القيم العربية والمعتقدات الإسلامية.
- ٢ - يبحث عن المعرفة، وينظّمها، ويحلّلها، ويوظّفها، ثم يولّد معرفة جديدة تُسهم في رفع مستوى العمل.
- ٣ - يطبّق مهارات الاتصال والتواصل في تعامله مع الآخرين، فضلاً عن حسن الاستماع، والموضوعية في الحوار.
- ٤ - يمارس التفكير الناقد والإبداعي، والاستقصاء، وحلّ المشكلات بصورة عملية على نحوٍ مستمرّ، ويستخدم ذلك في اتخاذ القرارات.
- ٥ - يوظّف العناصر والأسس الخاصة بالعمل الفني للإبداع في مجالات العمل الزراعي.
- ٦ - يحافظ على البيئة، ويطبّق إجراءات الصحة والسلامة في العمل الزراعي.
- ٧ - يُرشّد الاستهلاك بالاستخدام الأمثل للموارد في مجالات العمل الزراعي.
- ٨ - يستخدم أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بكفاءة، وإتقان، وأمان، والتزام في البحث، والتحليل، ومعالجة البيانات، والعروض التقديمية، وغيرها.
- ٩ - يتخذ القرار المناسب في ما يخصّ التوجّه نحو سوق العمل أو التعليم العالي.
- ١٠ - يطور نفسه في مجالات البحث والاستقصاء والتعلّم المستمر.
- ١١ - يستعمل الأجهزة الحديثة لتطوير مستوى العمل.
- ١٢ - يمتلك الكفايات المهنية اللازمة لسوق العمل.
- ١٣ - يتحمّل المسؤولية، ويحترم العمل.
- ١٤ - يندمج ويشارك مشاركة فاعلة في سوق العمل والإنتاج.
- ١٥ - يقدر ذاته بمستويات عالية، ويمارس عمليات التقويم الذاتي على نحوٍ مستمر.
- ١٦ - يتصف بالقدرة على الابتكار وإنشاء مشروعات صغيرة؛ وذلك لتلبية حاجات المجتمع على اختلاف مستوياته، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة ودخل الأسرة وينهض بالاقتصاد الوطني.

تضمّنت صفحات الدليل مجموعة من العناصر التي يُعتَقَد أنها تُمثّل أبرز جوانب الموقف التعليمي التعلّمي، وفي ما يأتي توضيح لكلّ من هذه العناصر:

- **نتائج التعلّم**  
نتائج خاصّة يتوقّع أن يحقّقها الطلبة، وتتميز بشموليتها وتنوّعها (معارف، مهارات، اتجاهات)، وتُعدّ مرجعاً للمعلّم؛ إذ يُبنى عليها المحتوى، والركيزة الأساسية للمنهاج، وتُسهم في تصميم نماذج المواقف التعليمية المناسبة، وفي اختيار استراتيجيات التدريس، وبناء أدوات التقويم المناسبة لها.
- **المفاهيم والمصطلحات**  
مفاهيم و مصطلحات أساسية وردت في الكتاب المدرسي، يجب التركيز عليها في تصميم الموقف التعليمي.
- **السلامة العامة**  
إرشادات الأمن والسلامة التي ينبغي مراعاتها عند تنفيذ الموقف التعليمي.
- **استراتيجيات التدريس**  
الخطوات والإجراءات المنظمة التي يقوم بها المعلم أو الطلبة لتنفيذ الموقف التعليمي، وهي خطوات مقترحة يمكن للمعلم تطويرها أو تغييرها بما يتلاءم و ظروف الطلبة و إمكانات المدرسة ، مع مراعاة توظيف تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات (ICT) عند الحاجة.
- **إدارة الصف**  
إجراءات تهدف إلى تنظيم الموقف التعليمي و ضبطه ؛ لتسهيل تنفيذ الدرس بكفاءة، ومن أمثلتها ما يأتي:  
  - ١- تنظيم زمني متوقع لكل خطوة من خطوات الدرس.
  - ٢- تنظيم جلوس الطلبة على شكل (مجموعات، أو حلقات دائرية، أو على شكل حرف (U).
  - ٣- تهيئة البيئة الصفية من إنارة كافية و تهوية و نظافة وغيرها.
  - ٤- تهيئة الأدوات و المواد اللازمة لتنفيذ الدرس.
  - ٥- إثارة دافعية الطلبة للتعلم.
  - ٦- كيفية استخدام أوراق العمل و أدوات التقويم المناسبة و الأنشطة المتضمنة.
- **الزمن المتوقع**  
المدة الزمنية المتوقعة لتحقيق النتائج الخاصة.
- **الفروق الفردية**  
مجموعة أنشطة وأسئلة و إضافات تضمنها المحتوى، أُعدّت لتلبية احتياجات الطلبة وفق قدراتهم المتنوعة، من حيث: (النوع الاجتماعي و الاحتياجات الخاصة و البيئات الاجتماعية).
- **استراتيجيات التقويم وأدواته**  
الخطوات والإجراءات المنظمة التي يقوم بها المعلم أو الطلبة لتقويم الموقف التعليمي، وقياس مدى تحقّق النتائج، وهي عملية مستمرة في أثناء تنفيذ الموقف التعليمي يمكن تطويرها أو بناء نماذج أخرى مشابهة



تُطبَّق بالتكامل مع إجراءات إدارة الصف.

### • التكامل الرأسي و الأفقي

التكامل الرأسي يعني ربط المفهوم بمفاهيم أخرى ضمن المبحث نفسه، والأفقي يُقصد به ربط المفهوم بمفاهيم أخرى في المباحث الأخرى.

### • مصادر التعلم

مصادر تعليمية تعين على تحقيق النتائج، ويمكن للطالب و المعلم الرجوع إليها، بهدف زيادة معلوماته و خبراته، وتشمل: الكتب و الموسوعات و مواقع الإنترنت و الأقراص المدججة و الزيارات الميدانية و مقابلات أشخاص، وغير ذلك.

### • المادة المحوسبة

المادة التعليمية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة في عدد من المباحث الدراسية: (الرياضيات، العلوم، الحاسوب، اللغة العربية، التربية الوطنية، الإدارة المعلوماتية) لتكون رديفة وداعمة لتحقيق نتائج التعلم بالإضافة إلى التسجيلات و الأقراص المدججة و أرشيف التلفزيون التربوي.

### • أخطاء شائعة

هي توقعات لأخطاء محتملة و شائعة بين الطلبة و المجتمع تتعلق بالمهارات و المفاهيم و القيم الواردة مع تقديم معالجة لهذه الأخطاء.

### • الملاحق

تضمّن الدليل ملاحق منفصلة يتناول كلٌّ منها أحد الجوانب الآتية :  
إجابات أسئلة الكتاب و أوراق العمل و أدوات التقويم و جداول و رسوم توضيحية و بيانية و خرائط و صور.

- الإلمام بمحاصيل الفاكهة الآتية: (اللوزيات، التفاحيات، الحمضيات، الموز، الزيتون، نخيل البلح، العنب، الفراولة) من حيث: الإزهار والإثمار، المناخ والتربة، وطرق التكاثر، ومسافات الزراعة، وعمليات الخدمة، والنضج والجني، وأبرز الأمراض والحشرات، وأهم الأصناف الشائعة محلياً.
- تبني اتجاه إيجابي نحو تطبيق التقنيات الحديثة المتعلقة لعمليات ما بعد حصاد الفاكهة.
- تقدير أهمية إنتاج محاصيل الفاكهة في الأردن وأثرها في الدخل القومي.
- إجراء عمليات التكاثر الخضري لمحاصيل الفاكهة (العقل، الفسائل، المدادات وغيرها).
- تقليل محاصيل الفاكهة (الزراعة، وتقليم التربية الإثماري).
- جني محاصيل الفاكهة وفرزها وتعبئتها.
- تمييز محاصيل الفاكهة من حيث: الإزهار، والأوراق، والسيقان، والأزهار، والثمار.
- الإلمام بمحاصيل الخضراوات التابعة للفصائل الآتية: (الباذنجانية، القرعية، الصليبية، البقولية، الخيمية، النرجسية، اليزفونية، الخبازية، الرمامية، المركبة) من حيث: احتياجاتها البيئية، مواعيد زراعتها في الأردن، طرق الزراعة، كميات التقاوي، عمليات الخدمة اللازمة، والنضج والجني، وأهم الأصناف الشائعة محلياً، وأبرز الأمراض والحشرات.
- تبني اتجاه إيجابي نحو تطبيق التقنيات الحديثة الخاصة بعمليات إنتاج الخضراوات.
- تقدير أهمية إنتاج محاصيل الخضراوات، وتبين أثره في الأمن الغذائي في الأردن.
- تجري عمليات الخدمة الآتية للفصيلة القرعية: (الترقيع، الحف، العزق، الري، التسميد، مقاومة الآفات ومكافحتها).
- تسليق الخضراوات داخل البيوت البلاستيكية وتقليمها.
- إجراء عمليات الجني والفرز والتدريج والتعبئة لمحاصيل الخضراوات.
- تمييز محاصيل الخضراوات التابعة للفصائل الآتية: (الباذنجانية، القرعية، الصليبية، البقولية، الخيمية، النرجسية، اليزفونية، الخبازية، الرمامية، المركبة) من حيث: الأوراق، السيقان، الأزهار، الثمار، البذور، الجذور.
- الإلمام بالمحاصيل الحقلية التابعة للفصائل الآتية: (النجيلية، البقولية، السمسمية، الرمامية، المركبة) من حيث: احتياجاتها البيئية، والدورة الزراعية، ومواعيد زراعتها في مناطق الأردن المختلفة، وطرق الزراعة، وكميات التقاوي، وعمليات الخدمة اللازمة، وطرق حصادها، ودراساتها، وتخزينها، وكمية الإنتاج، وأهم الأصناف الشائعة محلياً، وأبرز الأمراض والحشرات.
- تبني اتجاه إيجابي نحو تطبيق التقنيات الحديثة المتعلقة بعمليات إنتاج المحاصيل الحقلية.
- إدراك أهمية استخدام آلات الحصاد المختلفة.

- تعرّف أجزاء آلات الحصاد المختلفة.
- الإلمام بآلات تجهيز الأعلاف الخضراء والأعلاف الجافة.
- تقدير الأهمية الاستراتيجية لإنتاج المحاصيل الحقلية في الأردن.
- تحضير الأرض لزراعتها بالمحاصيل الحقلية.
- زراعة بذور المحاصيل الحقلية .
- إجراء عمليات الخدمة الآتية للمحاصيل الحقلية: (رّي، تسميد، عرق، مكافحة الأعشاب).
- تمييز نباتات المحاصيل الحقلية من حيث: (الأوراق، السيقان، الأزهار، الثمار، البذور، الجذور).
- تقدير أهمية التوسع في إنتاج النباتات الطبية والعطرية في الأردن.
- تبني استخدام النباتات الطبية والعطرية بوصفها مكملًا علاجيًا.
- تمييز استعمال النباتات الطبية والعطرية في علاج بعض الأمراض.
- تبني استخدام طرق وقاية النبات الآمنة بيئيًا وصحيًا.
- تعرّف طرق استخدام المكافحة المتكاملة.
- تبني اتجاه إيجابي للمحافظة على البيئة و إنتاج زراعي آمن، وذلك بتطبيق برامج المكافحة المتكاملة.
- تعرّف أبرز آفات النباتات الشائعة الانتشار في الأردن وطرق وقايتها ومكافحتها.
- الإلمام بآلات الرشّ والتعفير.
- إجراء عمليات الخدمة اللازمة لآلات الرشّ والتعفير.
- إدراك أهمية استخدام آلات الرش والتعفير في الوقاية النباتية.
- إجراء عملية المكافحة الكيميائية للآفات الزراعية.
- تطبيق عملية المكافحة بالطرق غير الكيميائية للآفات الزراعية.
- إجراء عملية المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية.
- إجراء عملية الخدمة اللازمة لكلّ من آلات الرش والتعفير.
- تشغيل آلات الرش والتعفير.
- تمييز أنواع آلات الرش والتعفير .

## نموذج خطة مقترح لتحضير الدروس

.....: عنوان الدرس		.....: المستوى		.....: المبحث		
..... إلى		.....: التاريخ من		.....: عنوان الوحدة		
التنفيذ		التقويم		استراتيجيات التدريس	النتائج الخاصة	الرقم
الزمن	الإجراءات	الأداة	الاستراتيجية			

مصادر التعلم (المواد والأدوات):

## جدول المتابعة اليومي

اليوم والتاريخ	الشعبة	الصف	النتائج المحققة	الواجب البيتي



## توزيع الوحدات الدراسية لمبحث الإنتاج النباتي وفق عدد الساعات المقررة

المبحث: الإنتاج النباتي

المستوى الثالث

الفرع: الزراعي

عدد الأسابيع	عدد الساعات		موضوعات الوحدة	اسم الوحدة
	عملي	نظري		
	٢	٧	أولاً: اللوزيات التمرين (١-١) : تمييز نباتات اللوزيات التمرين (٢-١) : قطف ثمار اللوزيات	الوحدة الأولى البستنة الشجرية
	٣	٩	ثانياً : التفاحيات التمرين (٣-١) : تكثير التفاحيات بالترقيد الهرمي التمرين (٤-١) : تمييز نباتات التفاحيات التمرين (٥-١) : تقليم التفاحيات تقليماً إثمارياً التمرين (٦-١) : جني ثمار التفاحيات	
	٣	٥	ثالثاً: الحمضيات التمرين (٧-١) : تكثير الحمضيات بالعقل الساقية شبه المتخشبة التمرين (٨-١) : تمييز نباتات الحمضيات التمرين (٩-١) : تقليم الحمضيات تقليماً إثمارياً التمرين (١٠-١) : خدمة بساتين الحمضيات التمرين (١١-١) : جني الحمضيات	
	٢	٣	رابعاً: الموز التمرين (١٢-١) : تكثير نباتات الموز بالفسائل التمرين (١٣-١) : تمييز نباتات الموز التمرين (١٤-١) : تقليم نباتات الموز التمرين (١٥-١) : جني الموز وإنضاجه	
	٢	٥	خامساً: الزيتون التمرين (١٦-١) : تكثير نباتات الزيتون بالعقل الغضة التمرين (١٧-١) : تمييز نباتات الزيتون التمرين (١٨-١) : تقليم الزيتون تقليماً إثمارياً. التمرين (١٩-١) : جني ثمار الزيتون	

## توزيع الوحدات الدراسية لمبحث الإنتاج النباتي وفق عدد الساعات المقررة

المبحث: الإنتاج النباتي

المستوى الثالث

الفرع: الزراعي

عدد الأسابيع	عدد الساعات		موضوعات الوحدة	اسم الوحدة
	عملي	نظري		
	٢	٥	سادساً: نخيل البلح التمرين (١-٢٠): تكثير نباتات النخيل بالفسائل التمرين (١-٢١): زراعة فسائل النخيل بالأرض الدائمة	
	٤	٩	سابعاً: العنب التمرين (١-٢٣): تكثير نباتات العنب بالترقيد البسيط التمرين (١-٢٤): تقليم شجيرات العنب تقليماً إثمارياً التمرين (١-٢٥): تمييز نباتات العنب	
	٢	٥	ثامناً: التين التمرين (١-٢٦): تكثير نباتات التين بالعقل الساقية المتخشبة التمرين (١-٢٧): تمييز نباتات التين	
	١	٢	تاسعاً: الفراولة التمرين (١-٢٨): تكثير نباتات الفراولة بالمدادات	
	١	٦	أولاً : الفصيلة الباذنجانية البندورة الباذنجان البطاطا الفلفل	الوحدة الثانية البيستنة الخضرية
	٢	٥	التمرين (٢-١): الوصف النباتي للفصيلة الباذنجانية ثانياً : الفصيلة القرعية الكوسا الخيار البطيخ التمرين (٢-٢): عمليات الخدمة للفصيلة القرعية التمرين (٢-٣): تسليق وتقليم الخيار في البيوت المحمية التمرين (٢-٤): الوصف النباتي للفصيلة القرعية	

## توزيع الوحدات الدراسية لمبحث الإنتاج النباتي وفق عدد الساعات المقررة

المبحث: الإنتاج النباتي

المستوى الثالث

الفرع: الزراعي

عدد الأسابيع	عدد الساعات		موضوعات الوحدة	اسم الوحدة
	عملي	نظري		
	١	٣	ثالثاً : الفصيلة الصليبية الملفوف الزهرة الفجل التمرين (٢-٥): الوصف النباتي للفصيلة الصليبية التمرين (٢-٦): عملية تبيض الزهرة	الوحدة الثانية البستنة الخضرية
		٢	رابعاً : الفصيلة البقولية الفاصولياء البازيلاء	
		٢	خامساً: الفصيلة الخيمية الجزر البقدونس	
		٣	سادساً : الفصيلة الترجسية البصل الثوم	
		١	سابعاً: الفصيلة اليزفونية الملوخية	
		١	ثامناً: الفصيلة الخبازية الباميا	
		١	تاسعاً: الفصيلة الرامرامية السبانخ	
		١	عاشراً: الفصيلة المركبة الخسّ	
			التمرين (٢-٧) : جني الخضراوات	
٣٢	٢٦	٧٠		

# توزيع الوحدات الدراسية لمبحث الإنتاج النباتي وفق عدد الساعات المقررة

المبحث: الإنتاج النباتي

المستوى الرابع

الضرع: الزراعي

عدد الأسابيع	عدد الساعات		موضوعات الوحدة	اسم الوحدة
	عملي	نظري		
٨	٧	٥	أولاً: الفصيلة النجيلية	الوحدة الأولى المحاصيل الحقلية
			التمرين (١-١): تجهيز الأرض لزراعة المحاصيل الحقلية	
			التمرين (٢-١): زراعة الأرض بالمحاصيل الحقلية	
			التمرين (٣-١): خدمة المحاصيل الحقلية	
			التمرين (٤-١): الوصف النباتي للقمح والشعير	
			التمرين (٥-١): الوصف النباتي للذرة الصفراء والبيضاء	
			ثانياً: الفصيلة البقولية	
			التمرين (٦-١): الوصف النباتي للعدس	
			التمرين (٧-١): الوصف النباتي للحمص	
			التمرين (٨-١): الوصف النباتي للفلو	
١	١	١	التمرين (٩-١): الوصف النباتي للكرسنة	
			التمرين (١٠-١): الوصف النباتي للجلبانة	
			التمرين (١١-١): الوصف النباتي للبيقية	
			التمرين (١٢-١): الوصف النباتي للبرسيم المصري والفصة (البرسيم الحجازي)	
			ثالثاً: الفصيلة السمسمية	
			التمرين (١٣-١): الوصف النباتي للسمسم	
			رابعاً: الفصيلة المركبة	
			التمرين (١٤-١): الوصف النباتي لدوّار الشمس	
			التمرين (١٥-١): الوصف النباتي للعصفر	
			خامساً: الفصيلة الرامرامية	
١	١	١	التمرين (١٦-١): الوصف النباتي للشمندر	
			سادساً: آلات الحصاد	
			سابعاً: آلات جمع الأعلاف وكبسها	
			ثامناً: آلات جرش الأعلاف وخلطها	
			تاسعاً: المشكلات التي تواجه زراعة المحاصيل الحقلية في الأردن	

## توزيع الوحدات الدراسية لمبحث الإنتاج النباتي وفق عدد الساعات المقررة

المبحث: الإنتاج النباتي

المستوى الرابع

الضرع: الزراعي

عدد الأسابيع	عدد الساعات		موضوعات الوحدة	اسم الوحدة
	عملي	نظري		
	١	٢	أولاً: البابونج التمرين (١-٢): جني نورات البابونج وتجفيفها وتعبئتها وتخزينها	الوحدة الثانية إنتاج النباتات الطبية والعطرية
	١	١	ثانياً: الزعتر التمرين (٢-٢): جني نباتات الزعتر وتجفيفها وتعبئتها وتخزينها	
	١	١	ثالثاً: النعناع التمرين (٣-٢): جني نباتات النعناع وتجفيفها وتعبئتها وتخزينها.	
	١	١	رابعاً: الميرمية التمرين (٤-٢): جني نباتات الميرمية وتجفيفها وتعبئتها وتخزينها.	
	١		خامساً: اليانسون التمرين (٥-٢): جني نباتات اليانسون وتجفيفها واستخراج بذورها وتعبئتها وتخزينها	
		١	سادساً: الحلبة التمرين (٦-٢): جني نباتات اليانسون وتجفيفها واستخراج بذورها وتعبئتها وتخزينها	
	١		سابعاً: القزحة التمرين (٧-٢): جني نباتات القزحة وتجفيفها واستخراج بذورها وتعبئتها وتخزينها	
	٢		ثامناً: تحضير الأرض وزراعتها ببذور النباتات الطبية والعطرية وأشتالها التمرين (٨-٢): تحضير الأرض وزراعتها ببذور النباتات الطبية والعطرية وأشتالها	
		١	تاسعاً: خدمة النباتات الطبية والعطرية. التمرين (٩-٢): إجراء عمليات الخدمة اللازمة للنباتات	



## توزيع الوحدات الدراسية لمبحث الإنتاج النباتي وفق عدد الساعات المقررة

المبحث: الإنتاج النباتي

المستوى الرابع

الضرع: الزراعي

عدد الأسابيع	عدد الساعات		موضوعات الوحدة	اسم الوحدة
	عملي	نظري		
			<p>الطبية والعطرية.</p> <p>التمرين (٢-١٠): التمييز بين النباتات الطبية والعطرية</p> <p>عاشراً: الأهمية العلاجية والاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية</p> <p>الحادي عشر: تقسيم النباتات الطبية والعطرية</p>	
	٥	٣	<p>أولاً: الحشرات الاقتصادية: تصنيفها وصفاتها العامة</p> <p>ثانياً: مكافحة الكيمائية للآفات الزراعية</p> <p>التمرين (٣-١): دراسة الملصقات على علب المبيدات</p> <p>التمرين (٣-٢): تحضير محاليل مبيدات الآفات القابلة للذوبان في الماء ورشها.</p> <p>التمرين (٣-٣): تحضير الطعوم السامة من مادة فوسفيد الزنك</p>	الوحدة الثالثة الوقاية النباتية
	٦	١	<p>ثالثاً: مكافحة غير الكيمائية للآفات الزراعية</p> <p>التمرين (٣-٤): التعقيم الشمسي للتربة في الزراعة المحمية</p> <p>التمرين (٣-٥): مكافحة الميكانيكية للآفات الزراعية</p> <p>التمرين (٣-٦): استخدام المصائد في مكافحة الآفات</p> <p>رابعاً: مكافحة المتكاملة</p>	
	٥	٢	<p>خامساً: أبرز آفات وأمراض النباتات الشائعة في الأردن</p> <p>سادساً: الآلات المستخدمة في مكافحة الآفات</p> <p>التمرين (٣-٧): آلات الرش اليدوية</p> <p>التمرين (٣-٨): آلات تعفير المبيدات</p> <p>التمرين (٣-٩): ضبط آلة الرش المحمولة أو المجروورة</p> <p>التمرين (٣-١٠): خدمة آلات الرش</p>	
٣٢	٤٦	٥٠		المجموع



# المستوى الثالث

٣



# الوحدة الأولى

البستنة الشجرية

النتائج الخاصة

- يوضح مفهومي اللوزيات والبراعم الثمرية البسيطة.
- يتعرف أنواع اللوزيات.
- يتعرف طبائع الإزهار والإثمار في اللوزيات.
- يبين أنواع البراعم الثمرية في اللوزيات.
- يميز بين طبائع الإزهار والإثمار في اللوزيات.

المفاهيم والمصطلحات

اللوزيات، الفصيلة الوردية، البراعم الثمرية البسيطة

السلامة المهنية

استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس وتوظيف خبرات الطلبة السابقة بطرح الأسئلة الآتية: لماذا سميت اللوزيات بهذا الاسم؟ ما اسم الفصيلة التي تتبع لها اللوزيات؟ ما نوع البراعم الثمرية في اللوزيات؟ ما الأنواع التي تشملها اللوزيات؟ مناقشة إجابات الطلبة وتدوينها على السبورة، والتوصل إلى استنتاج مفهومي اللوزيات والبراعم الثمرية البسيطة، وتعرف الأنواع التي تشملها اللوزيات.

التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرف طبائع الإزهار والإثمار في اللوزيات يقسم الطلبة إلى خمس مجموعات، ويُعين مقرر لكل مجموعة، ويحدد الزمن اللازم، لتنفيذ المهمات الآتية:

- المجموعة الأولى: دراسة الشكل (١-١): طبيعة حمل البراعم الثمرية في الدراق، وتجييب عن الأسئلة الآتية: أين تحمل البراعم الثمرية في محصولي الدراق والنكتارين؟ هل توجد البراعم غالبًا في مجموعات أم منفردة؟ كم يبلغ عدد الأزهار التي يعطيها البرعم الزهري عند تفتحه؟ ما لون الزهرة / الأزهار المتفتحة؟

- المجموعة الثانية: : دراسة الشكل (٢-١): طبيعة حمل البراعم الثمرية في اللوز، وتجييب عن الأسئلة الآتية: أين تحمل البراعم الثمرية في محصول اللوز؟ ما المقصود بالدوابر الثمرية هل تحمل البراعم في مجموعات أم منفردة؟ كم عدد الأزهار التي يعطيها البرعم الزهري عند تفتحه؟ ما لون الزهرة / الأزهار المتفتحة؟

- المجموعة الثالثة: دراسة الشكل (٣-١): طبيعة حمل البراعم الثمرية في المشمش، وتجييب عن الأسئلة الآتية: أين تحمل البراعم الثمرية في المشمش؟ ما المقصود بالدوابر الثمرية؟ هل تحمل البراعم في مجموعات أم منفردة؟ كم يبلغ

جاءت تسمية هذه الفاكهة باسم اللوزيات نسبة إلى اللوز، وتسمى كذلك بالفاكهة ذات النواة الحجرية (Stone Fruit)؛ لصلابة جزء الثمرة الداخلي (الإندوكارب).

تتبع مجموعة اللوزيات الفصيلة الوردية (Rosaceae)، والجنس (Prunus)، وتشمل: الدراق والنكتارين، والبرقوق بأنواعه، الأوروسي، والياباني، والأمريكي، والمشمش، والكرز بنوعيه: (الحلو، والحامض)، واللوز. وسيأتي الحديث عن هذه الأنواع، من حيث: الإزهار والإثمار، والمناخ والتربة، وطرق التكاثر، بالإضافة إلى مسافات الزراعة، وعمليات الخدمة، وأهم الأمراض والحشرات، وأهم الأصناف الشائعة محليًا.

الإزهار والإثمار (Flowering and Fruiting)

البراعم الزهرية في اللوزيات من النوع البسيط، أي أنه ينتج من تفتحها زهرة واحدة، كما في الدراق، والنكتارين، والمشمش، واللوز، أو أكثر من زهرة، كما في الكرز، والبرقوق.

البراعم الثمرية البسيطة (Simple Buds): تعد هذه البراعم بسيطة، لأن البرعم يعطي زهرة واحدة عند تفتحها، أو أكثر، ومثال ذلك براعم أشجار اللوزيات.

هل تعلم؟

وتحمل البراعم الزهرية في اللوزيات كما يأتي:

الدراق والنكتارين (Peach and Nectarine): تحمل البراعم الثمرية في هذين المحصولين على نموات الموسم السابق، وغالبًا ما توجد هذه البراعم في مجموعات مؤلفة من ثلاثة براعم، الأوسط منها خضري، أو من برعمين، أحدهما خضري، كما في الشكل (١-١). وقد توجد براعم زهرية منفردة، يعطي الواحد منها عند تفتحها زهرة واحدة، لونها زهري.

عدد الأزهار التي يعطيها البرعم الزهري عند تفتحه؟ ما لون الزهرة / الأزهار المتفتحة؟

- المجموعة الرابعة: دراسة الشكل (٤-١): طبيعة حمل البراعم الثمرية في البرقوق، وتجييب عن الأسئلة الآتية: أين تحمل البراعم الثمرية في البرقوق؟ ما المقصود بالدوابر الثمرية؟ هل تحمل البراعم في مجموعات أم منفردة؟ كم يبلغ عدد الأزهار التي يعطيها البرعم الزهري عند تفتحه؟ ما لون الزهرة / الأزهار المتفتحة؟

- المجموعة الخامسة: دراسة الشكل (٥-١): طبيعة حمل البراعم الثمرية في الكرز الحلو، وتجييب عن الأسئلة الآتية: أين تحمل البراعم الثمرية في الكرز الحلو؟ ما المقصود بالدوابر الثمرية؟ هل تحمل البراعم في مجموعات أم منفردة؟ كم يبلغ عدد الأزهار التي يعطيها البرعم الزهري عند تفتحه؟ ما لون الزهرة / الأزهار المتفتحة؟ ● يعرض منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي. الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى. ● يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح موحد لدى الطلبة جميعهم.

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

- باستخدام برمجية العروض التقديمية، صمّم عرضًا تقديميًا يتكوّن من خمس شرائح عن طبائع الازهار والإثمار في اللوزيات، ثم اعرض نتائج بحثك على زملائك.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء.
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-١).

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

- كتاب الإنتاج النباتي - المستوى الثاني - الوحدة الثالثة.

## مصادر التعلّم

### للمعلّم

- فهمي شتات وآخرون، أشجار الفاكهة، ط ٢، جامعة القدس المفتوحة، عمان الأردن، ٢٠٠٦ م.

- Eagle Wood Cliffs، plant Science، Growth، and Development، Utilization of Cultivated Plant New Jersey: Printice-Hall Inc. New Jersey 1991

### للطالب

- فهمي شتات، بساتين التفاحيات واللوزيات والعنب والزيتون، وزارة الزراعة، عمان، ١٩٩٥ م.



الشكل (١-١): طبيعة حمل البراعم الثمرية في الدراق.

الّلوز (Almond): تحمل البراعم الثمرية في اللّوز جانبيًا، إمّا على دوائر ثمرية محمولة على نمّوات عمرها سنتان، أو أكثر، وإمّا على نمّوات الموسم السابق، ويمكن أن تحمل البراعم في مجموعات، كما في الدراق، أو منفردة. ويعطي البرعم الزهري عند تفتحه زهرة واحدة، لونها يتراوح بين الأبيض والزهري، كما في الشكل (٢-١).



الشكل (٢-١): طبيعة حمل البراعم الثمرية في اللّوز.

المشمش (Apricots): تحمل البراعم الثمرية في المشمش جانبيًا على دوائر ثمرية عمرها سنتان، أو أكثر، أو على نمّوات الموسم السابق، وقد تحمل في مجموعات مكوّنة من ثلاثة

١٥

براعم، أو سطحها خضري، أو من برعمين، أحدهما خضري، وقد يحمل البرعم الثمريّ منفردًا. ويعطي البرعم الزهري الواحد زهرة بيضاء واحدة، كما في الشكل (٣-١).



الشكل (٣-١): طبيعة حمل البراعم الثمرية في المشمش.

البرقوق (Plum): تحمل البراعم الثمرية في شجرة البرقوق جانبيًا على دوائر ثمرية عمرها سنتان، أو أكثر، أو على نمّوات الموسم السابق، ويعطي البرعم الزهري الواحد بين (٣-١) أزهار، لونها أبيض، كما في الشكل (٤-١).



الشكل (٤-١): طبيعة حمل البراعم الثمرية في شجرة البرقوق.

الكرز الحلو (Sweet Cherry): تحمل البراعم الثمرية في شجرة الكرز جانبيًا على دوائر ثمرية عمرها سنتان، أو أكثر، وعند قاعدة نمّوات الموسم السابق التي عمرها سنة، ويعطي البرعم الواحد بين (٤-١) أزهار، لونها أبيض، كما في الشكل (٥-١).

١٦

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى





الشكل (٥-١): طبيعة حمل البراعم الثمرية في الكرز الحلو.

تفتتح البراعم الزهرية في اللوزيات قبل البراعم الخضريّة، وتعدّ براعم اللوز الزهرية أبكر في التفتح من البراعم الزهرية للدراق، والنكتارين، والمشمش، والبرقوق، والكرز الحلو. وزهرة اللوزيات كاملة الجنس (خنثى)، أي أنها تحتوي أعضاء التذكير والتأنيث معاً.

#### التلقيح والإخصاب في اللوزيات

نظرًا إلى وجود ظاهرة العقم الذاتي في بعض أنواع اللوزيات، مثل الكرز الحلو، واللوز، وبعض أصناف البرقوق الياباني، فإنه لا بدّ من زراعة أكثر من صنف من أصناف الكرز مثلًا في البستان الواحد، والحرص على وجود خلايا النحل في أثناء تفتح البراعم الزهرية، ووصول هذه البراعم إلى مرحلة التفتح الكامل.

#### مفاهيم

ظاهرة العقم الذاتي (Self Infertile): عدم مقدرة حبوب لقاح صنف ما على إخصاب أزهاره.

#### مفاهيم

ظاهرة العقم الخلطي (Infertile Cross): تعني أن النبات لا يستطيع أن ينتج ثمارًا أو بذورًا حتى باستخدام حبوب لقاح صنف آخر، لأنّ الصنفين لا يلحق أحدهما الآخر، ولأنه يلزم وجود صنف ثالث في البستان نفسه تكون حبوب لقاحه متوافقة مع الصنفين الآخرين، بحيث يعمل ملقحًا لهما.

– يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح موحد لدى الطلبة جميعهم.

### النتائج الخاصة

- يوضّح مفهومي العقم الذاتي والعقم الخلطي.
- يفرق بين العقم الذاتي والعقم الخلطي.
- يتعرّف عمليتي التلقيح والإخصاب في اللوزيات.
- يحدد الاحتياجات المناخية الملائمة لنمو اللوزيات وإنتاجها.

### المفاهيم والمصطلحات

العقم الذاتي، العقم الخلطي

### السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

### التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بتنفيذ المعلم جلسة مناقشة عامة تتعلق بمفهومي العقم الذاتي، والعقم الخلطي، وذلك بطرح مجموعة من الأسئلة، مثل: ماذا تسمى عدم مقدرة حبوب لقاح صنف ما على إخصاب أزهاره؟ ما أهمية وجود خلايا النحل في أثناء تفتح البراعم الزهرية؟ ما المقصود بالعقم الذاتي؟ ماذا تسمى عدم مقدرة النبات على إنتاج ثمار أو بذور حتى باستخدام حبوب لقاح صنف آخر؟ ما المقصود بالعقم الخلطي؟ ما الفرق بين العقم الذاتي والعقم الخلطي؟ مناقشة إجابة الطلبة عن الأسئلة، وتدوين الصحيح منها على السبورة.

### التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرّف عمليتي التلقيح والإخصاب في اللوزيات يعرض المعلم مثالاً لتوضيح ظاهرة العقم الخلطي، ويهيئ البيئة الصفية المناسبة للعمل، ثم يوزعهم في ثلاث مجموعات ويعين مقررًا لكل مجموعة ويحدد الفريق اللازم، كما يأتي: المجموعة الأولى تنفذ النشاط (١-١) وتجيّب عن السؤال الآتي: هل تعدّ أشجار البستان ذاتية التلقيح أم خلطيه التلقيح؟ المجموعة الثانية تنفذ النشاط (١-١)، وتجيّب عن السؤال الآتي: هل هناك احتياجات خاصة يجب توافرها وقت الإزهار؟ المجموعة الثالثة تنفذ النشاط (١-١) وتجيّب عن السؤال الآتي: ماذا تنصح صاحب البستان أن يعمل؟ يعرض منسق المجموعة ما تتوصل إليه مجموعته. • الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى. • يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح موحد لدى الطلبة جميعهم.

### التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرّف احتياجات أنواع اللوزيات إلى البرودة شتاء يعرض المعلم الجدول (١-١)، ثم يقسم الطلاب إلى مجموعات، ويهيئ البيئة الصفية المناسبة للعمل، ويكلفهم تنفيذ النشاط (١-٢)، ثم يوزعهم في ثلاث مجموعات، وتنفّذ كلّ منها النشاط (١-٢).

– يعرض منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.

– الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.

## الملاحق

ملحق أدوات التقويم (١-٢)، (١-٣)، (١-٤).

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف بعض الطلبة الرجوع إلى أحد كتب البستنة الشجرية المتوفرة في مكتبة المدرسة للبحث عن ظاهرتي العقم الذاتي والعقم الخلطي.

## استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم: مراجعة الذات
- أداة التقييم: قائمة رصد (١-٢)
- استراتيجية التقييم: التقييم المعتمد على الأداء
- أداة التقييم: سلم تقدير (١-٣)
- استراتيجية التقييم: التقييم المعتمد على الأداء
- أداة التقييم: سلم تقدير لفظي (١-٤)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

– كتاب الإنتاج النباتي – المستوى الثاني – الوحدة الثالثة.

## مصادر التعلم

### للمعلم

– فهمي شتات وآخرون، أشجار الفاكهة، ط ٢، جامعة القدس المفتوحة عمان الأردن، ٢٠٠٦ م.

- Eagle Wood Cliffs، plant Science، Growth، and Development، Utilization of Cultivated Plant. New Jersey: Printice-Hall Inc. New Jersey 1991

### للطالب

– فهمي شتات، بساتين التفاحيات واللوزيات والعنب والزيتون، وزارة الزراعة، عمان، ١٩٩٥ م.

ويوضح المثال الآتي ظاهرة العقم الخلطي:

لديك ثلاثة أصناف من الكرز، هي: بينج (Bing)، ولامبرت (Lambert)، و نابليون (Napoleon)، هذه الأصناف يجب توافرها معاً في بستان الفاكهة نفسه، لكي نحصل على ثمار وبذور، لأنّ حبوب لقاح الصنف لامبرت توافق ميسم الصنف بينج وميسم الصنف نابليون، أمّا حبوب لقاح بينج، أو نابليون، فلا يوجد توافق بين مياصمها.

### فكر

تعدّ أزهار بعض أنواع أشجار الفاكهة، وتكوّن ثماراً في داخلها البذور، ولكن بعضها يعجز عن ذلك، لماذا؟

### نشاط (١-١)

سأل صاحب بستان فاكهة نفسه عند تأسيس بستانه السؤالين الآتيين: هل تعدّ أشجار البستان ذاتية التلقيح أم خلطية التلقيح؟ وهل هناك احتياجات خاصة يجب توافرها وقت الإزهار؟ ماذا تصحح صاحب البستان أن يعمل؟

### ٢ المُنْخَاف

تعدّ اللوزيات من أشجار الفاكهة المدارية التي تحتاج إلى برودة؛ لكسر طور السكون الفسيولوجي، إلا أنها تختلف في عدد ساعات البرودة التي تحتاج إليها، وبصورة عامة تتراوح احتياجاتها بين (٣٠٠-٧٠٠) من ساعات البرودة شتاء، تقل عن ٧,٢ س<sup>٥</sup>، كما في اللوز، والدراق، والكتارين، وأن بعضها يحتاج إلى ساعات برودة تتراوح بين (٨٠٠-١٣٠٠) ساعة، كما في الكرز الحلو.

يتضح ممّا تقدم أنّ الراعم الزهرية تفتح في اللوز قبل أيّ نوع آخر من اللوزيات، ويؤدي اختلاف أنواع اللوزيات في احتياجاتها إلى برودة الشتاء إلى الاختلاف في توزيعها الجغرافي، إذ يمكن زراعة أشجار اللوز في المناطق الشفاغورية، والواديان المطلة على غور الأردن، إلا أنه لا يمكن زراعة أشجار الكرز في تلك المناطق.

من ناحية أخرى، تحتاج أشجار اللوزيات إلى صيف معتدل يميل إلى الحرارة، وجفاف نسبي؛ لأنّ الصيف الرطب الذي يميل إلى البرودة يعوّق نضج الثمار، ويؤثر في نسبة

١٨

العقد، ويؤدي إلى انتشار الأمراض، انظر الجدول (١-١) الذي يبين احتياجات أنواع اللوزيات من البرودة شتاء.

الجدول (١-١): احتياجات أنواع اللوزيات إلى البرودة شتاء.

اسم النوع	ساعات البرودة أقل من ٧,٢ س <sup>٥</sup>	ملاحظات
اللوز	٤٥٠-١٠٠	حسب الأصناف
الدراق	١١٠٠-٤٠٠	توجد بعض الأصناف التي لا تزيد احتياجاتها على ٢٥٠ ساعة تزرع حالياً في منطقة وادي الأردن، مثل صنف الدراق (فلوردا جولد)
الكتارين	١١٠٠-٤٠٠	حسب الأصناف
البرقوق الياباني	١٠٠٠-٧٠٠	حسب الأصناف
البرقوق الأوروبي	١٣٠٠-٨٠٠	حسب الأصناف
البرقوق الأمريكي	٣٦٠٠	
الكرز الحامض	١٢٠٠	
الكرز الحلو	١٣٠٠-١١٠٠	حسب الأصناف

### نشاط (٢-١)

ادرس الجدول (١-١) ثمّ أجب عن الأسئلة الآتية:

- ١- أين يمكن زراعة البرقوق الأمريكي في الأردن؟
- ٢- أين يمكن زراعة الكرز الحامض في الأردن؟

ومن ناحية أخرى، أصبح الآن ممكناً إنتاج أصناف من الدراق والكتارين ذات الاحتياجات المتدنية من برودة الشتاء، مثل فلوريدا جولد (Flordagold)، وفلوريدا صن (Flordasun)، ولهذا يمكن زراعتها في وادي الأردن.

١٩

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يحدد التربة الملائمة لنمو اللوزيات وإنتاجها.
- يتعرف طريقتي تكثير اللوزيات بالبذور وبالتطعيم.
- يوضح المقصود بكل من التنضيد والتطعيم والأصول والطعوم.

## المفاهيم والمصطلحات

التنضيد، التطعيم، الأصول، الطعوم

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر / أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بعمل مراجعة سريعة للحصة السابقة، ثم ينفذ المعلم جلسة مناقشة عامة عن التربة الملائمة لنمو اللوزيات وإنتاجها، وطرق تكثيرها. ويمكن إثارة الأسئلة الآتية: ما نوع التربة المثلى لأنواع اللوزيات؟ ما خصائص التربة المثلى لأنواع اللوزيات؟ ما مدى توافر التربة المثلى لأنواع اللوزيات في الأردن؟ كيف تحل مشكلة محدودية توافر التربة المثلى لأنواع اللوزيات في الأردن؟ ماذا تسمى طريقة إنبات البذور بغرض الحصول على أشتال بذرية؟ ماذا تسمى عملية كسر حالة السكون الفسيولوجي لبذور اللوزيات؟ كيف تكسر حالة السكون الفسيولوجي لبذور اللوزيات؟ هل تختلف مدة التنضيد باختلاف أنواع اللوزيات؟ مناقشة إجابة الطلبة وتدوينها، والتوصل إلى نوع التربة الملائمة لنمو اللوزيات وإنتاجها.

التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرف مدة التنضيد بالأيام ودرجات الحرارة المناسبة لبذور اللوزيات يكلف المعلم الطلبة دراسة الجدول (٢-١)، يقسم الطلبة إلى ثلاث مجموعات، ويهيئ البيئة الصفية المناسبة للعمل، كما يأتي: المجموعة الأولى تدرس الجدول (٢-١)، وتجب عن الأسئلة الآتية: هل تختلف مدة التنضيد بالأيام بين أنواع بذور اللوزيات المختلفة؟ هل تختلف ساعات البرودة أقل من (٧,٢)°س اللازمة لتنضيد بذور أنواع اللوزيات المختلفة؟ المجموعة الثانية تدرس الجدول (٢-١) وتجب عن الأسئلة الآتية: لماذا تختلف مدة التنضيد بالأيام بين بذور اللوزيات المختلفة؟ لماذا تختلف ساعات البرودة اللازمة لتنضيد بذور أنواع اللوزيات المختلفة؟ المجموعة الثالثة تدرس الجدول (٢-١) وتقارن بين بذور أنواع اللوزيات المختلفة من حيث: عدد الأيام اللازمة للتنضيد والساعات.

- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.

- تقديم التغذية الراجعة من قبل المعلم للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

التدريس المباشر / أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بتنفيذ المعلم جلسة مناقشة عامة عن طريقة تكثير اللوزيات بالتطعيم

## التربة

تعد التربة الخصبة العميقة، الجيدة التصريف و التهوية، ذات الحموضة والقوام المناسبين، الخالية من مسببات الآفات هي التربة المثلى لأنواع اللوزيات، ونظرًا إلى محدودية توافر هذا النوع من التربة في الأردن، فقد استعان الخبراء بالأصول المناسبة لأنواع اللوزيات، وطعموا عليها أنواع اللوزيات وأصنافها المرغوب فيها، لحل مشكلات التربة، ولذلك يراعى اختيار الأصول المناسبة عند إنشاء بساتين اللوزيات.

## طرق التكاثر

يمكن تكثير اللوزيات بطرق عدّة، أهمها:

البذور: تستنبت البذور للحصول على أشتال بذرية، مهيأًا لتطعيمها بأنواع اللوزيات وأصنافها المرغوب فيها، نظرًا إلى أن بذور اللوزيات تمز في حالة سكون فسيولوجي، ولا بد من تنضيدها قبل زراعتها. وتختلف مدة التنضيد باختلاف أنواع اللوزيات، كما في الجدول (٢-١).

الجدول (٢-١): مدة التنضيد بالأيام ودرجات الحرارة المناسبة لبذور اللوزيات.

اسم النوع	عدد الأيام اللازمة للتنضيد	ساعات البرودة أقل من ٧,٢°س
اللوز	٣٠-٢٠	٧
الدراق	١٠٠-٤٠	٧-٤
المشمش	٦٠	٥
المحلب	١٠٠	٥
المريانا	١٠٠	٤-١

التطعيم: يمكن تطعيم أصول اللوزيات البذرية بالأصناف المرغوب فيها بعد وصولها إلى الحجم المناسب، وذلك بإحدى طرق التطعيم، وبخاصة التطعيم بالعين (التطعيم الدرعي)، وأكثر الأصول استعمالاً هي:

١. الأصول المستعملة في تطعيم أصناف الدراق والنكتارين:

أ. أصل لوز بذري: يعد من الأصول القوية التي تتحمل الجفاف والأراضي الكلسية، ويتصف بحساسيته للرطوبة الزائدة، وملاءمته الأراضي الجيدة التهوية والصرف،

٢٠

ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ماذا تسمى عملية وضع الطعم الذي يحتوي عيناً واحدة في ساق الأصل تحت القلف المعد لذلك؟ كيف يمكن تطعيم أصول اللوزيات البذرية بالأصناف المرغوب فيها؟ ما الأصول المستعملة في تطعيم أصناف الدراق والنكتارين والمشمش؟ ما المعايير التي تحدد اختيار الأصول عند إجراء عمليات تطعيم الدراق في مشاتل الفاكهة؟ مناقشة إجابة الطلبة وتدوينها على السبورة. والتوصل إلى المقصود بعملية التطعيم، وتعرف أهم الأصول المستعملة في تطعيم أصناف الدراق والنكتارين والمشمش.

## مراعاة الضرووق الفردية

### علاج

### إثراء

– ابحث في المصادر المتاحة ( كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن حلول لمعالجة أبرز المشكلات التي تواجه توافر أنواع اللوزيات في مناطق الأردن المختلفة.

## استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم: مراجعة الذات
- أداة التقييم: سجل وصف سير التعلم (١-٥)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

– مجلة المهندس الزراعي، العدد الخاص بالمؤتمر الزراعي الوطني الثاني، العددان (٦٩-٧٠)، نقابة المهندسين الزراعيين، عمان، الأردن، حزيران، ٢٠٠١م.

- George, A. Cquaah. Horticulture Principles and practices. Pearson Prentice Hall. 2005

#### للطالب

– خليل جرن، دليل المزارع السنوي، وزارة الزراعة، عمان، الأردن، ٢٠٠٨م.  
– محمد زبن، الموسوعة الزراعية: الفاكهة والأشجار المثمرة، دار الطريق للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٠م.

وحساسيته لمرض التدرن البكتيري، وللعديد من أمراض التربة الفطرية.  
ب. أصل دراق بذري: يصلح هذا الأصل لتطعيم أصناف الدراق والكتارين جميعها عليه، ويفضل استعماله في الأراضي الجيدة التهوية والتصريف. ونحصل على هذا الأصل بزراعة بذور من أصناف مناسبة من الدراق، مثل: صنف Sun cling ، أو صنف Lovell، وقد طوّرت في السنوات الأخيرة أصول بذرية من الدراق مقاومة للنيماطودا، مما يجعلها صالحة للاستعمال في زراعات الدراق المرورية، منها على سبيل المثال: أصل Nemaguard، وأصل Nemared، إلا أنّ حساسية هذه الأصول للكلس الموجود بنسبة عالية في أراضينا يحدّ من إمكانية استخدامها في منطقة شرق حوض البحر المتوسط.  
ج. أصل هجين (دراق لوز) G.F.677: هو أحد أفراد مجموعة الأصول المنتجة بواسطة التلقيح الخلطي بين الدراق واللوز، ويعدّ من الأصول القوية المعروفة بتوافقها مع أصناف الدراق والكتارين التجارية جميعها، وتحملها وجود نسبة عالية من الكلس في التربة تقدر بنحو (١٢٪).  
د. أصل البرقوق: يمكن استعمال أصل البرقوق Myrobalan، أو برقوق Marianna، لأغراض تطعيم أصناف الدراق والكتارين عليها، ويصلح للزراعة في الأراضي الرطبة، إذ لا يمكن استعمال أصل دراق أو أصل لوز، إلا أنّ أصل البرقوق لا يتوافق مع أصناف الدراق والكتارين جميعها، ممّا يحدّ من استعماله على نطاق واسع.

**فكر** ما المعايير التي تحدد اختيار الأصول عند إجراء عمليات تطعيم الدراق في مشاتل الفاكهة؟

٢. الأصول المستعملة في تطعيم أصناف المشمش:

أ. أصل مشمش بذري: يمتاز بتوافقه مع أصناف المشمش التجارية جميعها، ومقاومته لنيماطودا تعقد الجذور، وحساسيته لفطر تعفن جذور البلوط، والتدرن البكتيري، والتعفن التاجي، ويفضل استعماله في الأراضي الخفيفة ذات التهوية والتصريف الجيدين، وتعمّر الأصناف المطعمة على هذا الأصل طويلاً.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى



## النتائج الخاصة

– يقترح حلولاً لمعالجة أبرز المشكلات التي تواجه عدم التوافق بين الأصول والطعوم في بعض أشجار اللوزيات.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

– لتعرف الأصول المستعملة في تطعيم أصناف اللوز، والكرز الحلو، يقسم الطلبة إلى أربع مجموعات لتنفيذ ما يأتي :

- المجموعة الأولى: تبين أهم الأصول المستعملة في تطعيم أصناف اللوز.
- المجموعة الثانية: تبين أهم الأصول المستعملة في تطعيم أصناف الكرز الحلو
- المجموعة الثالثة: تعدّ نشرة تقدم فيها نصائح وإرشادات للمزارعين عن الأصول المستعملة في تطعيم أصناف اللوز، البرقوق، الكرز الحلو، وتناقش ذلك مع الطلبة.
- المجموعة الرابعة: تبحث في شبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية عن أصول لكل من البرقوق الأوروبي، والكرز، والمشمش، تكون أكثر ملاءمة للتربة، وتعرض ما تتوصل إليه، وتناقشه مع الطلبة.

## حل المشكلات/ والاستقصاء.

– قبل البدء بتكليف الطلبة تنفيذ خطوات الاستقصاء لابد من تهيئتهم وإشعارهم بوجود مشكلة، وذلك بطرح السؤال الاستقصائي الآتي: كيف تحل مشكلة عدم التوافق بين الأصول والطعوم في بعض أشجار اللوزيات؟ تُرصد إجابات الطلبة. تكليف المجموعات باتباع خطوات الاستقصاء الآتية:

- الخطوة الأولى: تحديد المشكلة، وذلك بالإجابة عن السؤال السابق.
- الخطوة الثانية: تكليف المجموعات التوصل إلى أسباب المشكلة وذلك بالبحث في المصادر المتاحة.
- الخطوة الثالثة: تكليف المجموعات اقتراح حلول عملية لمعالجة المشكلة بالبحث في المصادر المتاحة ( كتب، مواقع إنترنت، وغيرها)
- الخطوة الرابعة: اختيار الحل الأمثل من وجهة نظر أفراد المجموعة وتبرير إجاباتهم. بعد الانتهاء من تنفيذ خطوات الاستقصاء يعرض مقرر المجموعة ما يتوصلون إليه من نتائج باستخدام برمجية العروض التقديمية.

الملاحق ملحقات أدوات التقويم (١-٦).

ب . أصل دراق بذري: يستعمل في الأراضي الجيدة التهوية والصرف، غير أن توافقه مع أصناف المشمش التجارية جميعها غير مضمون، ويمتاز بحساسيته للديدان الثعبانية باستثناء الأصليين: نيماجارد، ونيمارد المقاومين للنيما تودا. ج . أصل البرقوق: يستعمل هذا الأصل في الأراضي الثقيلة الرطبة، إلا أن الأشجار المطعمة على أصل برقوق عرضة للانفصال (للكسر) في منطقة التطعيم في السنوات الأولى من عمر البستان، وبخاصة في المواقع المعرضة للرياح القوية، ويعزى هذا الانفصال إلى ظاهرة عدم التوافق بين هذا الأصل وبعض أصناف المشمش. ويمكن أن تنمو العديد من السرطانات من المجموعة الجذرية للأشجار المطعمة على هذا الأصل، مما يعوق عمليات الخدمة تحت الأشجار، ومن الأمثلة على أصل البرقوق أصل مايروبلان، وأصل ماريانا.

٣. الأصول المستعملة في تطعيم أصناف اللوز:

أ . أصل لوز بذري: يُعد من الأصول القوية التي تتحمل الجفاف والأراضي الكلسية، وهو حساس للرطوبة الزائدة، ويلائم الأراضي ذات التهوية والتصريف الجيد، ويمتاز بحساسيته لمرض النادرن البكتيري وللعديد من أمراض التربة الفطرية. ب . أصل دراق بذري: يحدّد هذا الأصل من ثمّ أصناف اللوز المطعمة عليه، ويترتب على ذلك دخول هذه الأشجار مرحلة الإثمار في سن مبكرة، وزراعة عدد أكبر من الأشجار في وحدة المساحة، ومن أهم عيوبه أن أصناف اللوز المطعمة عليه لا تعمّر طويلاً، وأنه حساس للتربة الكلسية والنيما تودا في مناطق الزراعة المروية، و عرضة للإصابة بحشرة الكابنودس. ج . أصل G.F.677: أشجار اللوز المطعمة عليه قوية النمو، وجذورها عميقة، ويصلح لتطعيم أصناف اللوز الضعيفة النمو عليه، ويمتاز هذا الأصل بتحملة الجفاف، ومواءمته الأراضي الكلسية.

## حل المشكلات

تعدّ ظاهرة عدم التوافق بين الأصول والطعوم في بعض أشجار اللوزيات مشكلة تتطلب حلاً، اقترح حلاً علمياً للتغلب على هذه الظاهرة.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الضروقات الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة ( كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن المقصود بالتنضيد، التطعيم، الأصول، الطعوم، ثم عرض النتائج على زملائهم.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: القلم والورقة.
- أداة التقويم: اختبار ( ١-٦).

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

#### مصادر التعلم

##### للمعلم

- Hartman، H.، Kester، D.، davies، F. and Geneve، R. ، Plant propagation : principles and practices 7th edition . 2002

##### للطالب

– طه عبدالله نصر، إكثار أشجار الفاكهة / القواعد العلمية والأساليب العصرية، مكتبة المعارف الحديثة، الإسكندرية، ٢٠٠٣ م .

٤ . الأصول المستعملة في تطعيم أصناف البرقوق :

أ . أصل برقوق مايروبلان Myrobalan: يمتاز بتوافقه مع أصناف البرقوق جميعها، وتحمله التربة الثقيلة والرطبة، ومقاومته للنيما تودا.

ب . أصل برقوق Marianna 2624: قوي النمو، مقاوم للنيما تودا، ويتوافق مع أهم أصناف البرقوق التجارية، ويصلح للأراضي الثقيلة والرطبة.

جـ . أصل دراق بذري: تستعمل في أغلب الأحيان أصول الدراق المقاومة للنيما تودا، مثل أصل Nemared أو Nemaguard، خاصة في مناطق الزراعة المروية، إذ يوجد احتمال كبير للإصابة بالنيما تودا.

د . أصل لوز بذري: يصلح للأراضي الجيدة التهوية والصرف، إلا أنه غير متوافق مع أصناف البرقوق جميعها.

٥ . الأصول المستعملة في تطعيم أصناف الكرز الحلو:

أ . أصل مازارد Mazzard: أصل قوي، مقاوم للنيما تودا تعقد الجذور، وحفارات السيقان، ويصلح للزراعة في الأراضي الثقيلة، إلا أن المجموع الجذري فيه سطحي نسبياً.

ب . أصل محلب Mahaleb: أصل قوي، يتحمل الجفاف في التربة، ويتحمل وجود الكلس في التربة أكثر من الأصل مازارد، ومجموعه الجذري عميق نسبياً، ولكنه حساس للتربة الرطبة، وبخاصة عند اقتران ذلك بالصرف السيئ.

جـ . أصل ستوكتون موريلو Stockton Morello: من الأصول المقزّمة، يعطي شجرة تعادل ثلث حجم مثيلاتها المطعّمة على الأصول القوية، ولكنه غير متوافق مع صنف Napoleon.

#### مهارات البحث والاتصال

يجب اختيار الأصل الأكثر ملاءمة للتربة، لأنه لا يوجد أصل في اللوزيات يتفوق على غيره في الصفات جميعها. ابحث في شبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية عن هذه الأصول لكل من البرقوق الأوروبي، والكرز، والمشمش، واعرض ما تتوصل إليه عن طريق برمجية العروض التقديمية، وناقشه مع زملائك.

### أخطاء شائعة

## النتائج الخاصة

- يصف طريقة تكثير اللوزيات بالعقل.
- يتعرف مسافات الزراعة المناسبة لأنواع اللوزيات
- يصف عمليات الخدمة اللازمة لبساتين اللوزيات.

## المفاهيم والمصطلحات

العقل.

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر / أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بعمل مراجعة سريعة للوحدة السابقة، ثم ينفذ المعلم جلسة مناقشة عامة عن طريقة تكثير اللوزيات بالعقل. ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ماذا يسمى جزء النبات الذي يزرع للحصول على نباتات كاملة جديدة؟ ما المقصود بالعقل؟ متى تجمع العقل؟ ما أنواع العقل؟ متى نلجأ إلى تكثير اللوزيات بالعقل؟ ما المقصود بالزراعة الكثيفة لأشجار الدراق؟ ما المقصود بطريقة صفوف الأشجار أو الجدران الشجرية عند زراعة أشجار الدراق؟ مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرف مسافات الزراعة المناسبة لأنواع اللوزيات يعرض المعلم الجدول (١-٣)، ثم يقسم الطلبة إلى ثلاث مجموعات، كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تدرس العوامل التي تعتمد عليها مسافات الزراعة في اللوزيات.
- المجموعة الثانية: تجيب عن الأسئلة الآتية: كيف يؤثر حجم الأشجار النهائي في المسافات اللازمة لزراعة اللوزيات؟ كيف يؤثر نوع الأصل الذي طعم في مسافات زراعة في اللوزيات؟ كيف تؤثر طريقة التربية في مسافات زراعة اللوزيات؟
- المجموعة الثالثة: تحدد معدل مسافات الزراعة المتبعة في بساتين أنواع اللوزيات المختلفة.
- تنظيم الطلبة للنتائج التي توصلوا إليها وعرضها ومناقشتها للتوصل إلى فهم صحيح موحد لدى الطلبة جميعهم.
- التدريس المباشر / العمل في الكتاب المدرسي
- يعرض المعلم عمليات خدمة بساتين اللوزيات، ثم يقسم الطلبة إلى ثلاث مجموعات، كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تكلف دراسة عمليتي الحرث والعزق، وتجب عن الأسئلة الآتية: ما الهدف من عمليتي الحرث والعزق؟ ما الموعد المناسب لحرث بساتين اللوزيات في المناطق المرتفعة؟ كم عدد مرات حرث بساتين اللوزيات

ملحق أدوات التقويم (١-٧).

## الملاحق

العقل: يُلجأ إليها في الحالات المعروفة بالزراعة الكثيفة، مثل زراعة أشجار الدراق بالطريقة المستمسة صفوف الأشجار (Hedge rows)، أو ما يعرف بالجدران الشجرية (Tree Walls) التي تتطلب توفير أعداد كبيرة من الغراس في وقت قصير، وبتكلفة منخفضة.

## مسافات الزراعة

تعتمد مسافات الزراعة بين أشجار اللوزيات على عوامل عديدة، أهمها:

- 1) حجم الأشجار النهائي عند وصولها إلى مرحلة النضج، فأشجار اللوز أكثر ارتفاعاً وعرضاً من أشجار الدراق، ولذلك تزرع على مسافة تتراوح بين (٧-٩) أمتار بين كل شجرة وأخرى، في حين يزرع الدراق على مسافة تتراوح بين (٤-٥) أمتار.
- 2) نوع الأصل المطعم عليه، فأشجار الدراق المطعمة على أصل مقزم تزرع على مسافة أقل من الدراق المطعم على أصل الدراق البديري.
- 3) طريقة التربة، إذ تقصر المسافة في حالة التربة الكأسية.

الجدول (١-٣): يبين معدل مسافات الزراعة لأنواع اللوزيات.

اسم النوع	مسافة الزراعة بالأمتار
الدراق	بين ٤×٤م إلى ٤×٥م، وأحياناً ٥×٥م
النكارين	بين ٤×٤م إلى ٤×٥م، وأحياناً ٥×٥م
البرقوق الأوروبي	٦×٦م إلى ٧×٧م
البرقوق الياباني	٥×٤م إلى ٦×٦م
المشمش	بين ٥×٥م إلى ٧×٧م
اللوز	بين ٦×٦م إلى ٧×٧م
الكرز الخلو	بين ٥×٥م إلى ٧×٧م

## عمليات الخدمة

تشمل عمليات خدمة بساتين اللوزيات ما يأتي:

- 1) الحرث والعزق: نظراً إلى اعتماد معظم بساتين اللوزيات في المناطق المرتفعة من الأردن على مياه الأمطار فإنه لا بد من الاستفادة القصوى من تلك الأمطار، ويكون ذلك بحرث البساتين في الخريف حرثاً عميقاً إلى حد ما؛ لتهيئة التربة لاستيعاب مياه الأمطار، والتخلص من الأعشاب التي تنافس الأشجار على الماء والغذاء.

٢٤

في المناطق المرتفعة؟ ما الهدف من الحرثتين الخريفية والربيعية؟ لماذا يجب أن تكون هاتان الحرثتان في اتجاهين متعاكسين؟ كيف يمكن التخلص من الأعشاب النامية حول الأشجار في بساتين اللوزيات؟

● المجموعة الثانية: تكلف دراسة عملية التسميد لبساتين اللوزيات، وتحديد العوامل التي يتوقف عليها نوع السماد وكميته وموعد إضافته وطريقة إضافته؟

● المجموعة الثالثة: تكلف دراسة عملية ري بساتين اللوزيات من حيث العوامل التي تؤثر في كمية مياه الري.

- وكذلك تحدد كميات مياه الري اللازمة، لري بساتين اللوزيات خلال موسم النمو.

- ينظم الطلبة النتائج التي توصلوا إليها عرضها ومناقشتها والتوصل إلى فهم صحيح موحد لدى الطلبة جميعهم.



## مراعاة الضروك الفردية

### علاج

### إثراء

## استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم: الملاحظة
- أداة التقييم: السجل القصصي (١-٧)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

- George, A. Quaah. Horticulture Principles and practices. Pearson Prentice Hall. 2005

### للطالب

- سلام أيوب، الدليل الفني لتطعيم الأشجار المثمرة، المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٦م.

وتحترت البساتين مرة أخرى مع بداية فصل الربيع، وتسمى الحُرثة الربيعية، وهي تهدف إلى التخلص من الأعشاب، وخلط الأسمدة الكيميائية. ويجب أن تكون الحُرثان الحريفية والربيعية باتجاهين متعاكسين، أما في المناطق التي تعتمد على الري، فيلزم حرثه ثلاثة خلال فصل الصيف؛ للتخلص من الأعشاب الصيفية.

## فكر

لماذا يجب أن تكون الحُرثان الحريفية والربيعية باتجاهين متعاكسين؟

أما الأعشاب النامية تحت الأشجار فيصعب التخلص منها بالحرث، باستخدام الجرّار، لذا يجب عزقها يدويًا، أو باستخدام عازقات ميكانيكية صغيرة الحجم، مع مراعاة عدم الإضرار بجذوع الأشجار، أو الجذور، ويمكن استخدام مبيدات الأعشاب لهذه الغاية. التسميد: يعتمد اختيار نوع السماد، وكميته، وموعد إضافته، وطريقة إضافته على عدد من العوامل، منها:

١. نوع الري: ففي بساتين اللوزيات التي تعتمد على مياه الأمطار فقط (الأراضي البعلية) تضاف الكمية التي تحتاج إليها الأشجار دفعة واحدة خلال فصل الشتاء، أما في حالة الري التكميلي فإن عدد مرات التسميد يزداد حتى يصل إلى ثلاث مرات، تضاف قبل الري، الأولى منها في فصل الشتاء، والثانية في فصل الربيع، والثالثة في فصل الصيف.

٢. نوع الأسمدة: تضاف الأسمدة العضوية لأشجار اللوزيات المثمرة؛ كي تستفيد منها الأشجار قبل البدء بالحُرثة الشتوية بمعدل ١,٥ إلى ٢,٥ طن/دوم. ويمكن إضافة (١٠٠ إلى ١٥٠ غرامًا) من سلفات الأمونيوم سنويًا لكل شجرة لوزيات في حالة الأشجار غير المثمرة، أما الأشجار المثمرة فيضاف ١,٥-٢,٥ كغم إلى كل شجرة منها.

كمية مياه الري: تختلف احتياجات أشجار الفاكهة من مياه الري باختلاف أنواع الفاكهة، فهناك محاصيل تحتاج إلى كميات عالية من المياه، مثل الحمضيات والموز، وأخرى تحتاج إلى كميات متوسطة من المياه، مثل التفاحيات واللوزيات، ومنها ما يحتاج إلى كميات قليلة نسبيًا من المياه، مثل الزيتون والعنب والفسنق الحلبي.

٢٥

إضافة إلى ما تقدم فإن كمية المياه تختلف باختلاف الأصناف ضمن النوع الواحد من الفاكهة، فالأصناف المتأخرة في نضجها من الدراق تحتاج إلى كميات أكبر من الأصناف المبكرة من المحصول ذاته.

وهناك العديد من العوامل الأخرى، مثل درجات الحرارة، والرياح، ونوع التربة، وكمية الأمطار، وتوزيعها، والرطوبة الجوية لها دور مهم في تحديد احتياجات بساتين الفاكهة للري.

ونظرًا إلى الاختلاف الكبير في العوامل المذكورة من موقع إلى آخر ضمن حدود المنطقة الواحدة، فإن تحديد كميات الري اللازمة لأشجار الفاكهة يصبح أمرًا صعبًا، ويتطلب توافر الخبرة العلمية والعملية للتعامل مع الأجهزة المختلفة التي تستعمل في تحديد كميات الري، وأفضل الأوقات لإعطاء النبات هذه الكمية. وفي ما يأتي جدول تقريبي لكميات مياه الري بالتر المكعب اللازمة لري دوم واحد من بساتين اللوزيات.

الجدول (٤-١): كميات مياه الري اللازمة لري بساتين اللوزيات خلال موسم النمو.

المحصول	كميات مياه الري م / دوم
دراق، نكتارين، برقوق	٤٥٠-٤٥٠
مشمش، كرز	٧٥٠-٤٥٠
لوز	٥٠٠-٤٠٠

وتضاف كميات الري هذه خلال فصلي الربيع والصيف، وبخاصة خلال المدة الواقعة بين مرحلة عقد الثمار وبلوغها مرحلة النضج. ويجب تجنب الري بعد منتصف أيلول في بساتين اللوزيات الحساسة لمرض التعفن التاجي، وأمراض الذبول الأخرى. وينبغي إعطاء أشجار اللوزيات رية جيدة مدة (٢٠-٣٠) يومًا قبل تفتح البراعم الزهرية في المناطق التي تقل أمطارها عن ٢٥٠ ملم إذا لم تهطل أمطار كافية خلال تلك المدة. أما في حالة تساقط أوراق أشجار اللوزيات بسبب العطش، أو لسبب آخر في أثناء فصل الصيف، فيجب تجنب ري تلك الأشجار في نهاية الصيف، أو بداية الحريف؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى تفتح البراعم الزهرية.

٢٦

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يوضح المقصود بكل من التقليم، والتقليم الإثماري.
- يصف عملية تقليم أشجار اللوزيات تقليماً إثمارياً.
- يتعرف أكثر الآفات شيوعاً في بساتين اللوزيات.
- يتعرف أهم أصناف اللوزيات الموجودة في الأردن.

## المفاهيم والمصطلحات

التقليم الإثماري.

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر / أسئلة وأجوبة

- التمهيد للحصة بتنفيذ المعلم جلسة لمناقشة التقليم الإثماري. ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ماذا يُسمى العلم والفن الذي يختص بإزالة بعض الأجزاء من الأشجار أو تقصيرها؟ ما الذي يهدف إليه المزارع من إجراء عملية التقليم؟ ما أنواع التقليم؟ كيف يمكن تحديد نوع التقليم؟ ماذا يُسمى التقليم الذي يجري للأشجار الكبيرة المثمرة بهدف تنظيم الإثمار وتوزيعه على الأشجار توزيعاً جيداً؟ ما أهداف التقليم الإثماري؟ مناقشة إجابة الطلبة، وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرف عملية تقليم أشجار اللوزيات تقليماً إثمارياً يقدم المعلم عرضاً توضيحياً، ثم يكلف الطلبة ضمن المجموعات القيام بما يأتي:
  - المجموعة الأولى: يُطلب إليها زيارة بستان المدرسة، وتدوين أسماء خمسة أنواع من الأشجار على الأقل، وتحديد نوع التقليم المناسب لكل نبات من حيث (موعد إجراء التقليم، وطريقة إجرائه، والغرض منه، والكمية المزالة من النبات، والجزء الخاضع للتقليم من النبات)، ثم عرض ما أنجزته على طلبة الصف.
  - المجموعة الثانية: يُطلب إليها البحث في الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) والمصادر المختلفة عن أثر العوامل المتعلقة بالأصول النباتية والخواص البيولوجية والفسولوجية والوراثية للنبات، المتعلقة بالبيئة (المناخ، الموقع الجغرافي، والترية) في عملية تقليم أشجار اللوزيات تقليماً إثمارياً، ثم عرض ما تتوصل إليه.
  - المجموعة الثالثة: تكلف مستعينة بموضوع تقليم وتربية أشجار اللوزيات في كتاب الإنتاج النباتي/م/٢ تنفيذ التدريبات العملية المتعلقة بأشجار اللوزيات في المدرسة بوصفها تمارين ممارسة.
- ينظم الطلبة النتائج التي توصلوا إليها لعرضها ومناقشتها، والتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة.

الملاحق ملحق أدوات التقويم (١-٨)، (١-٩).

## التقليم الإثماري: تلخيص عملية تقليم الإثمار في أشجار اللوزيات في ما يأتي:

١. تجديد الدواير الثمرية أو الفروع والنموات التي تحمل البراعم الزهرية، ويكون ذلك بإزالة جزء من الدواير الثمرية كل عام؛ لتشجيع تكوين دواير ثمرية جديدة تحل محلّ الدواير الهرمة التي أزيلت. أمّا الأشجار التي تحمل أزهارها على أغصان عمرها سنة؛ فيمكن تجديد هذه الأغصان بتقصير بعض النموات الجانبية التي عمرها سنة إلى أعقاب طول كل منها (٢-٥) سم، عليها بعض البراعم الخضرية، ثمّ تقصير الفروع الجانبية بإزالة جزء منها، بشرط أن يكون مكان التقصير هذا عند أحد النموات الجانبية التي عمرها سنة أو سنتان.
٢. إزالة الطرود المائية التي تنمو على ساق الشجرة، أو على الفروع الرئيسية.
٣. إزالة الفروع المتشابكة، وبخاصة المصابة التي تبدو عليها إفرازات صمغية.
٤. تقليم بعض الأغصان الكبيرة السن في أشجار المشمش التي يبلغ عمرها (٥-٦) سنوات، لأنّ إثمارها يبدأ بالتراجع كمّاً ونوعاً، ولأنّ تقليمها يفسح المجال للمزارع بتجديد النموات الثمرية.

## تكامل منهجي

مستعينة بموضوع التقليم وتربية أشجار الفاكهة، من كتاب الإنتاج النباتي /م، الوحدة الثالثة/ نفذ التدريبات العملية المتعلقة بأشجار اللوزيات في مدرستك بوصفها تمارين ممارسة.

١. الآفات: أكثر الأمراض شيوعاً في بساتين اللوزيات هو تعقّد الجذور، والتسمغ، وتعقّد الأوراق، والأثرانوز، والتبقّع الحلقفي، والعفن البني.
٢. أمّا الحشرات التي تهاجم أشجار اللوزيات فتشمل المن بأنواعه، وحفّار جذور اللوزيات، وسوسة القلف، ودودة ثمار اللوز، وذبابه الفاكهة.
٣. أصناف اللوزيات، كما في الشكل (١-٦): قبل البدء بسرد أهم أصناف اللوزيات، تجدر الإشارة هنا إلى استمرار ظهور أصناف جديدة من اللوزيات، من وقت إلى آخر، في محطات البحوث الزراعية العالمية، ومراكز البحوث في كليات الزراعة الجامعية؛ نتيجة لإجراء التهجين بين الأصناف أو الأنواع، إضافة إلى حدوث الطفرات.

٢٧

## التدريس المباشر / أسئلة وأجوبة

- تنفيذ المعلم جلسة مناقشة عامة عن أبرز الآفات شيوعاً في بساتين اللوزيات في الأردن.
- ويمكن الاستعانة بالأسئلة الآتية:
  - ما أكثر الأمراض شيوعاً في بساتين اللوزيات؟
  - ما أكثر الحشرات شيوعاً في بساتين اللوزيات؟
  - كيف يمكن معالجة الأمراض والحشرات التي تصيب بساتين اللوزيات؟
- مناقشة إجابات الطلبة وتصويبها وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

– باستخدام برمجية العروض التقديمية، صمّم عرضاً تقديمياً من عشر شرائح عن أهم أصناف اللوزيات الموجودة في الأردن.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: السجل القصصي (١-٨)
- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: قائمة رصد (١-٩)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

– كتاب الإنتاج النباتي – المستوى الأول.

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- سلام أيوب، الدليل الفني لتطعيم الأشجار المثمرة، المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٦م.
- إبراهيم خيرى عتريس إبراهيم، أمراض وآفات أشجار الفاكهة وطرق المقاومة، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٦م.

- Barakat E. Abu-Irmaileh Weed control by soil solarisation in newly established fruit trees. Dirasat research journal Academic Research, University of Jordan, Vol. 21B, No. 5.2005

#### للطالب

- خليل جرن، دليل المرشد الزراعي في تربية وتقليم الأشجار المثمرة، مديرية الإرشاد الزراعي، عمان، ٢٠٠٧م.



اللوز



(الكرز الحلو)




البرقوق



الدرّاق



المشمش



النكاين

الشكل (١-٦): بعض أصناف اللوزيات.

٢٨

#### مطالعة ذاتية

- ١- اللوز الحلو: لا يوجد أصناف محلية معروفة ومحددة من اللوز الحلو باستثناء صنفى العوجا، والمخملى اللذين تقطف ثمارهما، وتباع خضراء في الربيع، أما الأصناف العالمية والشائعة محلياً فتشمل ناناريل (Nonpareil)، ومشن (Mission)، ونيبلس الترا (Nepplus Ultra)، وبيرلس (Peerless)، وغيرها.
- ٢- المشمش: من أصناف المشمش المحلية: الحموي، والكلاي، والمستكاوي، أما الأصناف العالمية، والشائعة محلياً فتشمل بيرفكشن (Perfection)، وتلتون (Tilton)، وبلنهام (Blenheim)، وغيرها.
- ٣- البرقوق: تنتمي أصناف البرقوق الموجودة في الأردن إلى إحدى المجموعتين: الأوروبية، أو اليابانية، وتعد أصناف المجموعة الأخيرة الأكثر انتشاراً في الأردن، وهي على النحو الآتي: أ - أصناف المجموعة اليابانية التي تشمل كلاً من: ستاروزا (Santa Rosa)، وفرموزا (Formosa)، ووكسون (Wickson)، وكلسي (Kelsey)، وبيربانك (Burbank)، وجولدن جابان (Golden Japan)، ومثلي (Methley)، وسويت هيرت (Sweet Heart).
- ب - أصناف المجموعة الأوروبية التي تشمل كلاً من الآتية: ستانلي (Stanley)، وبرسدنت (President).
- ٤- الدرّاق: أصناف الدرّاق في الأردن عديدة جداً، ويعود ذلك إلى تنوع مصادر استيراد الأشجار من أوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية، ومن سوريا، ولبنان، وأهم هذه الأصناف: مي كرس (May Crest)، وبرام روز (Prime Rose)، وستار كرس (Star Crest)، ورد هيفن (Red Haven)، وأوجست صن (August Sun)، وأوريل (Aurelle)، وأوتم ليدي (Autumn Lady). وبالإضافة إلى أصناف الدرّاق المذكورة هنالك مجموعة من الأصناف تمتاز بقلة احتياجاتها إلى ساعات البرودة في أثناء الشتاء، لكسر طور السكون، ومناسبتها لمناطق الأغوار، ونضجها المبكر، ومن هذه الأصناف: فلوريدا صن (Florida Sun)، وفلوريدا برنس (Florida Prince)، وفلوريدا كينغ (Florida King)، وفلوريدا بل (Florida belle)، وإيرلي جراند (Early Grande)، وديزرت جولد (Desert Gold).

٢٩

## النتائج الخاصة

- يستقصي أبرز المشكلات التي تواجه اختيار أصناف اللوزيات المختلفة وزراعتها.
- يقترح حلولاً لمعالجة أبرز المشكلات التي تواجه اختيار أصناف اللوزيات المختلفة وزراعتها.
- يوضح المقصود بعملية النضج .
- يصف عملية نضج ثمار اللوزيات .

## المفاهيم والمصطلحات

النضج

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## حل المشكلات / والاستقصاء

- يقسم الطلاب إلى مجموعات بما يتناسب مع عددهم في الغرفة الصفية.
- قبل البدء بتكليف الطلبة تنفيذ خطوات الاستقصاء لا بدّ من تهيئتهم وإشعارهم بوجود مشكلة، وذلك بطرح السؤال الاستقصائي الآتي: ما أبرز المشكلات التي تواجه اختيار أصناف اللوزيات المختلفة وزراعتها؟
- رصد إجابات الطلبة.
- تكليف المجموعات اتباع خطوات الاستقصاء الآتية:
  - الخطوة الأولى: تحديد المشكلة، وذلك بالإجابة عن السؤال السابق.
  - الخطوة الثانية: تكليف المجموعات التوصل إلى أسباب المشكلة بالبحث في المصادر المتاحة ( كتب، مواقع إنترنت، وغيرها ).
  - الخطوة الثالثة: تكليف المجموعات اقتراح حلول عملية لمعالجة المشكلة بالبحث في المصادر المتاحة ( كتب، مواقع إنترنت، وغيرها ) عن حلول عملية لمعالجة أبرز المشكلات التي تواجه اختيار أصناف اللوزيات المختلفة وزراعتها (احتياجاتها إلى ساعات البرودة في أثناء الشتاء لكسر طور السكون، وظاهرة عدم التوافق بين الأصول والطعوم في بعض أشجار اللوزيات).
  - الخطوة الرابعة: اختيار الحل الأمثل من وجهة نظر أفراد المجموعة، وتبرير إجاباتهم.
- بعد الانتهاء من تنفيذ خطوات الاستقصاء تعرض المجموعات ما تتوصل إليه من نتائج لمناقشتها.
- التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة
  - التمهيد للحصة بتنفيذ المعلم جلسة مناقشة عامة عن عملية نضج ثمار اللوزيات، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ماذا تُسمى عملية حدوث تغيرات فسيولوجية وكيميائية داخل الثمرة التي اكتمل نموها؟ ما المقصود بنضج الثمرة؟ هل تنضج

وبعض هذه الأصناف مزروع في وادي الأردن.

٥- الكرز: تشمل أصناف الكرز ما يأتي:

أ - الكرز الحلو: بنج (Bing)، وفان (Van)، ونابليون (Napoleon)، ولامبرت (Lambert).

ب - الكرز الحامض: منتمرنسي (Montmorency)، وإيرلي رتشموند (Early Richmond)، وإنجلش موريللو (English Moreello).

## حل المشكلات

قرّر المزارع سالم زراعة بستان لوزيات مختلفة في منطقة الأغوار، بسبب العائد الاقتصادي لها في السوق المحلي، ولكنه لم يستطع اختيارها. كيف تساعد سالم على اختيار هذه الأصناف؟ وما معايير هذا الاختيار؟

## النضج والجنبي

تختلف مواعيد نضج ثمار اللوزيات باختلاف أنواعها وأصنافها، فبعضها مبكر النضج؛ كالشمش، وبعض أصناف الدراق، وبعضها متوسط النضج؛ كالبرقوق والكرز، ومنها ما هو متأخر النضج، كاللوز وبعض أصناف الدراق. وتنضج اللوزيات في الفترة الواقعة بين شهري أيار وتشيرين الأول، باستثناء اللوز الذي ينضج بين شهري آب وتشيرين الثاني.

## ١- علامات نضج اللوزيات باستثناء اللوز

١. تراجع صلابة الثمار حتى تصبح طرية.

٢. تغيير لون قشرة الثمرة من الأخضر إلى الأصفر، أو الأحمر، أو البرتقالي.

٣. وصول الثمار إلى حجمها الطبيعي.

٤. زيادة نسبة السكر في الثمار، وتراجع نسبة الحموضة.

٥. تغيير لون لب الثمرة.

٦. الكثافة النوعية للثمرة، مثل الكرز.

## ٢- علامات نضج اللوز

٣٠

ثمار اللوزيات باختلاف أنواعها وأصنافها في الموعد نفسه؟ ما الموعد المناسب لنضج ثمار اللوزيات؟ ما الموعد المناسب لنضج ثمار اللوز؟ ما علامات نضج اللوزيات؟ ما علامات نضج ثمار اللوز؟



## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

- بمساعدة أفراد مجموعتك، ابحث عن المشكلات والمعوقات التسويقية التي تواجه قطاع محاصيل الفاكهة في الأردن، واقترح حلولاً لها يمكن تطبيقها على المستويين العام والخاص.

## استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم: التقييم المعتمد على الأداء
- أداة التقييم: سلم تقدير لفظي (١-١٠)
- استراتيجية التقييم: التقييم المعتمد على الأداء
- أداة التقييم: قائمة رصد (١-١١)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

- عواد حسين، ماجدة بهجت، الخصائص العامة للحاصلات البستانية بعد الحصاد وعلاقتها بالتكنولوجيات المستخدمة في التداول، بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية ستامفورد آنكتكت - الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٧م.

### للطالب

١. انشقاق الغلاف الخارجي المحيط بالبذرة؛ مما يسهل عملية فصل البذرة عن الغلاف عند القطف، أو بعده.
  ٢. سهولة فصل الثمار عن الدواير الثمرية التي تحملها؛ بسبب تكوين طبقة عازلة من الخلايا بين الثمرة والساق التي تحملها.
  ٣. انخفاض نسبة الرطوبة في الثمرة على نحو عام، وفي البذرة على نحو خاص، إذ تبلغ الرطوبة فيها (٤-٥)٪.
- ومما يجدر ذكره أن ثمار الشجرة الواحدة لا تنضج في آن واحد، مما يتطلب جني المحصول على دفعات، والذي يحدد درجة النضج المناسبة هو الغرض من استعمال الثمار، فإذا كان الغرض للتخزين، أو التصدير إلى مناطق بعيدة، فإنها تقطف قبل تمام نضجها، أما إذا كان الغرض هو تزويد السوق المحلية، أو من أجل التصنيع، فمن الأفضل ترك الثمار لتنضج على الأشجار.
- طرق القطف والجني: تقطف الثمار باليد، أو بالطرق الميكانيكية، مثل الهزازات، وقد تستعمل المواد الكيميائية التي تسرع نضج الثمار، وتسهل فصلها عن الأغصان، مثل مادة أثيريل التي تستعمل في أشجار الكرز بتركيز (٢٥٠-٥٠٠) جزء في المليون قبل (٧-١٤) يوماً من موعد القطف. وفي أثناء عملية القطف يجب العناية بالثمار، لأن أي رضوخ أو جروح تتعرض لها الثمرة قد تؤدي إلى تلفها، ويستحسن قطف ثمار الدراق من غير عنقها؛ لتجنب ما قد يسببه العنق من جروح للثمار المجاورة أثناء عملية التعبئة، أما ثمار البرقوق والكرز المعدة للاستهلاك الطازج فتقطف مع أعناقها.
- الفرز والتدرج والتعبئة: تفرز الثمار المصابة أو الزائدة النضج في أثناء عملية القطف أو بعدها، ثم تدرج، وتصنف حسب حجمها، وتعبأ في أوعية خاصة جيدة التهوية من الكرتون، أو الخشب، أو البوليسترين، ويجب أن تكون الأوعية قليلة العمق، حتى لا تضغط الثمار بعضها على بعض، وتلف.

٣١

### تكامل مهجي

مستعيناً بكتاب الإنتاج النباتي، المستوى الثاني، الوحدة الخامسة، راجع موضوع تداول الثمار، وتخزينها بعد القطف.

### زيارة ميدانية

نفذ زيارة بإشراف معلمك إلى إحدى محطات تجهيز ثمار اللوزيات، واكتب تقريراً يتضمن أهداف هذه المحطة، وفعاليتها.

### التقييم

- ١- صف طبيعة حمل الأزهار في أنواع اللوزيات (الدراق، المشمش).
- ٢- لماذا يصح باستخدام أصل لوز بذري لتطعيم اللوزيات عليه في الأردن؟
- ٣- اذكر صنفين من أصناف الدراق التي ثبت نجاح تكثيرهما بالعقل الساقية في الأردن.
- ٤- ضع برنامجاً لتسميد أشجار اللوزيات في الأردن.

٣٢

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يتعرّف مفاهيم: الفرز، والتدريج، والتصنيف.
- يصف عمليتي قطف ثمار اللوزيات وجنيها.
- يتعرّف عمليات الفرز والتدريج والتعبئة لثمار اللوزيات.

## المفاهيم والمصطلحات

فرز الثمار، التدريج، التصنيف

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة

- التمهيد للحصة بتنفيذ المعلم جلسة مناقشة عامة تتعلق بعمليتي قطف وجني ثمار اللوزيات. ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما طرق قطف ثمار اللوزيات وجنيها؟
- ما اسم المواد الكيميائية التي تسرع نضج الثمار وتسهّل فصلها عن الأغصان؟
- ما التركيز المستخدم من مادة أثريل التي تسرع نضج ثمار أشجار الكرز؟
- لماذا يجب معاملة الثمار بكل عناية في أثناء عملية القطف؟
- لماذا تقطف ثمار الدراق من غير عنقها؟
- لماذا تقطف ثمار البرقوق والكرز المعدة للاستهلاك الطازج بأعناقها؟
- مناقشة إجابة الطلبة عن الأسئلة وتدوين الصحيح منها على السبورة.

التعلم التعاوني/العمل الجماعي

- لتعرّف عمليات الفرز والتدريج والتعبئة لثمار اللوزيات ينفذ المعلم زيارة إلى إحدى محطات تجهيز ثمار اللوزيات، ثم يكلف الطلبة ضمن المجموعات القيام بما يأتي:
- المجموعة الأولى: تعدّ تقريراً يتضمن ما يأتي: المقصود بعملية الفرز، أهداف عملية الفرز، ما تشمله عملية الفرز، كيفية إجرائها.
- المجموعة الثانية: تعدّ تقريراً يتضمن ما يأتي: المقصود بعملية التدريج، أهدافها، كيفية إجرائها.
- المجموعة الثالثة: تعدّ تقريراً يتضمن ما يأتي: المقصود بعملية التعبئة، أهدافها، الشروط الواجب توافرها في صناديق التعبئة: أنواع صناديق التعبئة، كيفية إجرائها.
- المجموعة الرابعة: تعدّ تقريراً يتضمن كيفية نقع الثمار وغسلها وتلوينها وتجفيفها وتلميعها.
- مناقشة التقارير للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

الملاحق ملحقات أدوات التقويم (١-١٢)، (١-١٣).

١. انشقاق الغلاف الخارجي المحيط بالبذرة؛ مما يسهّل عملية فصل البذرة عن الغلاف عند القطف، أو بعده.

٢. سهولة فصل الثمار عن الدوابر الثمرية التي تحملها؛ بسبب تكوين طبقة عازلة من الخلايا بين الثمرة والساق التي تحملها.

٣. انخفاض نسبة الرطوبة في الثمرة على نحو عام، وفي البذرة على نحو خاص، إذ تبلغ الرطوبة فيها (٤-٥)٪.

ومما يجدر ذكره أنّ ثمار الشجرة الواحدة لا تنضج في آن واحد، ممّا يتطلب جني المحصول على دفعات، والذي يحدد درجة النضج المناسبة هو الغرض من استعمال الثمار، فإذا كان الغرض للتخزين، أو التصدير إلى مناطق بعيدة، فإنها تقطف قبل تمام نضجها، أمّا إذا كان الغرض هو تزويد السوق المحلية، أو من أجل التصنيع، فمن الأفضل ترك الثمار لتنضج على الأشجار.

طرق القطف والجني: تقطف الثمار باليد، أو بالطرق الميكانيكية، مثل الهزازات، وقد تستعمل المواد الكيميائية التي تسرع نضج الثمار، وتسهّل فصلها عن الأغصان، مثل مادة أثريل التي تستعمل في أشجار الكرز بتركيز (٢٥٠-٥٠٠) جزء في المليون قبل (٧-١٤) يوماً من موعد القطف. وفي أثناء عملية القطف يجب العناية بالثمار، لأنّ أيّ رضوخ أو جروح تعرض لها الثمرة قد تؤدي إلى تلفها، ويستحسن قطف ثمار الدراق من غير عنقها؛ لتجنب ما قد يسببه العنق من جروح للثمار المجاورة أثناء عملية التعبئة، أمّا ثمار البرقوق والكرز المعدة للاستهلاك الطازج فتقطف مع أعناقها.

الفرز والتدريج والتعبئة: تفرز الثمار المصابة أو الزائدة النضج في أثناء عملية القطف أو بعدها، ثمّ تدرّج، وتصنّف حسب حجمها، وتعبأ في أوعية خاصة جيدة التهوية من الكرتون، أو الخشب، أو البوليسترين، ويجب أن تكون الأوعية قليلة العمق، حتى لا تضغط الثمار بعضها على بعض، وتلف.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

- عرض فيلم توضيحي يبين عمليتي قطف ثمار اللوزيات وجنيها.
- عرض فيلم توضيحي يبين عمليات فرز ثمار اللوزيات وتدريبها وتعبئتها.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: سجل وصف سير التعلم (١-١٢)
- استراتيجية التقويم: الملاحظة
- أداة التقويم: السجل القصصي (١-١٣)

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

#### مصادر التعلم

##### للمعلم

- ملك أبو زينة وآخرون، دليل المواصفات القياسية الأردنية للفاكهة الطازجة، وزارة الزراعة، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.
- محمد البدور، مسنات الحيارى، تقدير خسائر فاقد ما بعد الحصاد لبعض محاصيل الخضار والفواكه، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.
- رابنداران طاغور، بديع حقي (مترجم)، جني الثمار، دار العلم للملايين، بيروت، ٢٠٠٠م.

##### للطالب

#### تكامل منهجي

مستعينا بكتاب الإنتاج النباتي، المستوى الثاني، الوحدة الخامسة، راجع موضوع تداول الثمار، وتخزينها بعد القطف.

#### زيارة ميدانية

نفذ زيارة بإشراف معلمك إلى إحدى محطات تجهيز ثمار اللوزيات، واكتب تقريراً يتضمن أهداف هذه المحطة، وفعاليتها.

#### التقويم

- ١- صف طبيعة حمل الأزهار في أنواع اللوزيات (الدراق، المشمش).
- ٢- لماذا ينصح باستخدام أصل لوز بدري لتطعيم اللوزيات عليه في الأردن؟
- ٣- اذكر صنفين من أصناف الدراق التي ثبت نجاح تكثيرهما بالعقل الساقية في الأردن.
- ٤- ضع برنامجاً لتسميد أشجار اللوزيات في الأردن.

### أخطاء شائعة



## النتائج الخاصة

- يصف نباتات اللوزيات نباتيًا .
- يميّز نباتات اللوزيات نباتيًا .

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعليم عن طريق النشاط/ زيارة ميدانية

- تقسيم الطلاب إلى مجموعات وتهيئة البيئة الصفية المناسبة لعمل المجموعات لكي يقوم الطلاب بتطبيق إجراءات (خطوات) التمرين (١-١)، كما يأتي:
- المجموعة الأولى: يُطلب إليها تفحص أشجار الدراق والنكتارين، وملاحظة ما يأتي: الحجم النهائي للشجرة، شكل الشجرة، لون قلف الأشجار، الأوراق، الأزهار، الثمار.
- تكليف طلبة المجموعة رسم الأجزاء النباتية لأشجار الدراق والنكتارين التي تفحصوها، وتدوين ملحوظاتهم في دفتر التدريب العملي.
- المجموعة الثانية: يُطلب إليها تفحص أشجار اللوز، وملاحظة ما يأتي:
- الحجم النهائي للشجرة، شكل الشجرة، لون قلف الأشجار، الأوراق، الأزهار، الثمار.
- تكليف طلبة المجموعة رسم الأجزاء النباتية لأشجار اللوز التي تفحصوها، وتدوين ملحوظاتهم في دفتر التدريب العملي.
- المجموعة الثالثة: يُطلب إليها تفحص أشجار المشمش، وملاحظة ما يأتي:
- الحجم النهائي للشجرة، شكل الشجرة، لون قلف الأشجار، الأوراق، الأزهار، الثمار.
- تكليف طلبة المجموعة رسم الأجزاء النباتية لأشجار المشمش التي تفحصوها، وتدوين ملحوظاتهم في دفتر التدريب العملي.
- المجموعة الرابعة: يُطلب إليها تفحص أشجار البرقوق، وملاحظة ما يأتي:
- الحجم النهائي للشجرة، شكل الشجرة، لون قلف الأشجار، الأوراق، الأزهار، الثمار.
- تكليف طلبة المجموعة رسم الأجزاء النباتية لأشجار البرقوق التي تفحصوها، وتدوين ملحوظاتهم في دفتر التدريب العملي.
- المجموعة الخامسة: يُطلب إليها تفحص أشجار الكرز، وملاحظة ما يأتي:
- الحجم النهائي للشجرة، شكل الشجرة، لون قلف الأشجار، الأوراق، الأزهار، الثمار.

## تمييز نباتات اللوزيات

التمرين  
(١-١)

## التأجرات

يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:

- تصف نباتات اللوزيات نباتيًا.
- يميّز نباتات اللوزيات نباتيًا.

## المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

● سكين. ● عدسة مكبرة يدوية. ● بستان فاكهة مزروع بنباتات اللوز. ● الدراق. ● النكتارين. ● المشمش. ● البرقوق. ● الكرز.

## الرسم التوضيحية

## خطوات العمل والنقاط الحاكمة

أولاً: تفحص أشجار الدراق والنكتارين، ولاحظ ما يأتي:

- ١- الحجم النهائي للشجرة: متوسط.
- ٢- شكل الشجرة: قائم، وأما النمو فيميل إلى الاتجاه الجانبي العلوي.
- ٣- لون قلف الأشجار: بني.
- ٤- الأوراق: طويلة، ورفيعة، ورمحية، ومجمدة، ويوجد ثلاثة براعم عند كل عقدة على الفروع، البرعمان الجانبيان زهريان، والأوسط خضري.
- ٥- الأزهار: ذات أعناق قصيرة، ولون البتلات زهري محمر.
- ٦- الثمار: حسلة، شكلها كروي أو بيضاوي، وسطحها الخارجي مغطى بزغب باستثناء النكتارين فهو أملس، والنواة صلبة جدًا، والجزءان الوسطي والخارجي لحميان.



٣٣

- تكليف طلبة المجموعة رسم الأجزاء النباتية لأشجار الكرز التي تفحصوها، وتدوين ملحوظاتهم في دفتر التدريب العملي.
- عرض عمل المجموعات، ومقارنته، واستخلاص الإجابات الصحيحة وتعميمها على المجموعات عن طريق المناقشة والحوار.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٤)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- حسين العروسي، المملكة النباتية، مكتبة الإسكندرية، ١٩٩٩ م.
- حسين محمد العروسي، النبات العام، مكتبة المعارف، ٢٠٠٠ م
- محمود محمد جبر وآخرون، أساسيات علم النبات العام: الشكل الظاهري، والتركييب التشريحي، تقسيم المملكة النباتية، وظائف أعضاء النبات، ط ١، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠١ م.

#### للطالب

- حسين العروسي، الأطلس النباتي، مكتبة الإسكندرية، ٢٠٠١ م

ثانياً: تفحص أشجار اللوز، ولاحظ ما يأتي:

- ١- الحجم النهائي للشجرة: كبير نسبياً.
- ٢- شكل الشجرة: قائم، وفروعه ذات زوايا حادة إلى الأعلى.
- ٣- لون قلف الأشجار رمادي.
- ٤- الأوراق: طويلة، ورفيعة، وغير مجعدة، ومتبادلة الوضع على الساق، وهي من النوع البسيط، وفي آباطها براعم بسيطة أيضاً.
- ٥- الأزهار: أعناقها قصيرة، ولون البتلات أبيض (بعضها ذو لون زهري)، وتوجد أحياناً على دوائر ثمرية.
- ٦- الثمار: حسلية، تتألف من ثلاثة أجزاء، الداخلي منها صلب، ماعدا أصناف الفرك، والجزءان الخارجي والوسطي يتحولان إلى الصلابة والشقق عند النضج.



ثانياً: تفحص أشجار المشمش، ولاحظ ما يأتي:

- ١- الحجم النهائي للشجرة: كبير.
  - ٢- شكل الشجرة: يميل إلى التفرع الجانبي.
  - ٣- لون قلف الأشجار: أحمر داكن (قرميدي)
  - ٤- الأوراق: قلبية الشكل، وذات عنق طويل.
  - ٥- الأزهار: أعناقها قصيرة، ولون البتلات أبيض (بعضها ذو لون وردي).
  - ٦- الثمار: شكلها كروي، أو بيضاوي.
- رابعاً: تفحص أشجار البرقوق، ولاحظ ما يأتي:
- ١- الحجم النهائي للشجرة: متوسط.
  - ٢- شكل الشجرة: يميل إلى الانتشار الجانبي.

٣٤

٣- لون قلف الأشجار: بني.

- ٤- الأوراق: طويلة، ورفيعة، والسطح السفلي للنصل مغطى بالرغيب.
  - ٥- الأزهار: تحمل في مجاميع، وكل برعم زهري يعطي زهرتين أو ثلاثاً، ولون البتلات أبيض، ويمكن أن تتكون الأزهار على دوائر.
  - ٦- الثمار: ملساء، شكلها كروي، أو بيضاوي.
- خامساً: تفحص أشجار الكرز، ولاحظ ما يأتي:
- ١- الحجم النهائي للشجرة: كبير.
  - ٢- شكل الشجرة: قائم، وفروعه ذات زوايا حادة إلى الأعلى.
  - ٣- لون قلف الأشجار: أحمر.
  - ٤- الأوراق: رعيه أو بيضاوية، ذات طرف مدبب، وعنق طويل.
  - ٥- الأزهار: كروية، وصغيرة، وملساء، ولامعة.



### التقويم

- ١- ارسم في دفترك رسماً توضيحياً يبين الأجزاء النباتية لأشجار اللوزيات التي تفحصتها، ودون ملحوظاتك في دفتر التدريب العملي.
- ٢- صف أوراق اللوزيات.
- ٣- صف براعم اللوزيات.
- ٤- كيف تميّز فروع اللوزيات القديمة من الحديثة؟
- ٥- ارسم مقطعاً عرضياً في ثمرة اللوزيات، واكتب أسماء الأجزاء على الرسم.
- ٦- ما المقصود بثمرة حسلية؟

٣٥

## النتائج الخاصة

- يحدد علامات نضج ثمار اللوزيات.
- يحدد الموعد المناسب لقطف ثمار اللوزيات.
- يختار طريقة قطف ثمار اللوزيات يدوياً بطريقة صحيحة.
- يقطف ثمار اللوزيات.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- يطبق الطلاب إجراءات (خطوات) التمرين (١-٢) باستخدام المواد والأدوات والتجهيزات بإشراف المعلم، متبعين الخطوات نفسها التي قام بها المعلم، ثم يتابعهم المعلم ويرشدهم ويقوم أداءهم لحين الوصول إلى تحقيق النتائج المطلوب.

## التعلم التعاوني / تدريب زميل

- تستخدم هذه الاستراتيجية لتدريب الطلبة ذوي التحصيل المنخفض من قبل الطلبة الذين أتقنوا المهارات في التمرين (١-٢)، إذ يقوم المعلم بمتابعة الطلبة، وملاحظة مدى تقدمهم، ويوجههم ويقومهم لحين تحقيق النتائج المطلوب.

## إدارة الصف / المشغل

- متابعة الطلبة في أثناء العمل وتوجيههم.
- تقويم الطلبة باستخدام أداة التقويم في الملحق.
- يعدّ المعلم عرضاً تقديمياً مسبقاً يتعلق بموضوعات الدرس، ثم يعرضه في أثناء مناقشات المجموعات.
- توزيع الأدوار على أفراد المجموعة الواحدة، كأن يدون أحدهم الملاحظات، وطالب ثان ينظمها بطريقة مناسبة للعرض، وثالث ميقاتي، ورابع يعرض نتائج العمل على المجموعات الأخرى، وهكذا.
- تسهيل وصول الطلبة إلى مصادر المعلومات، وتوضيح كيفية استخدامها، وتوجيههم إلى كيفية عرض النتائج التي يتوصلون إليها.

## قطف ثمار اللوزيات

التمرين  
(٢-١)

## التنصّات

- يتوقّع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادراً على أن:
- تحدد علامات نضج ثمار اللوزيات.
- تحدد الموعد المناسب لقطف ثمار اللوزيات.
- تختار طريقة قطف ثمار اللوزيات يدوياً بطريقة صحيحة.

## المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

\* مقصّ تقليم. \* سكين حادة. \* أوعية جمع الثمار. \* أشجار لوزيات.

## الرسوم التوضيحية



## خطوات العمل والنقاط الحاكمة

- ١- حدّد علامات نضج ثمار اللوزيات بما يأتي:  
حجم الثمار ولونها، لون البذور داخل الثمار، سهولة فصل الثمار، درجة صلابة الثمار، شكل الثمار، الطعم والنكهة، نسبة النشا، نسبة المواد الصلبة الذائبة، نسبة الحموضة.
- ٢- اقطف ثمار اللوزيات باليد، ويفضل لفّ ثمرة اللوزيات يمينا ويسارا، وسحبها برفق إلى أسفل؛ خوفاً من كسر الدوائر.

## التقويم

- ١- كيف تحدد موعد جني ثمار اللوزيات؟
- ٢- ما العلامة التي تدل على صلاحية ثمار اللوز الأخضر للقطف؟

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

– يكلف بعض الطلبة إجراء عملية قطف ثمار الدراق، والنكتارين، والمشمش، يدويًا بطريقة صحيحة باستعمال ما يلزم من مواد متوافرة.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-١٥)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

للمعلم

للطالب

- Horticulture Principles and practices. Pearson Prentice Hall. 2005
- Normen F.C. and Justin K.M. and Steven G.S Modern Fruit Science. Horticultural Puplications. 3906 NW 31 Place Gainesville. 2005. international trading companies: UN
- Poincelor. RP. Horticulture .Principles and Practical Applications. Engle, Wood Cliffs: Printice-Hall .Inc. 2000

### تمارين الممارسة

- نفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، أو ضمن مجموعات صغيرة في المشغل، أو الحقل، أو حسب توجيهات المعلم:
- عنوان التمرين: أجر عملية قطف ثمار الدراق، والنكتارين، والمشمش يدويًا بطريقة صحيحة، مستعملًا ما يلزم من مواد متوافرة.
- اكتب خطوات العمل التي تتبعها في تنفيذ كل تمرين عملي.
- قيم تنفيذك لكل خطوة من خطوات العمل التي أتبعها، وفق قائمة شطب محددة واضحة كما يأتي:

الرقم	خطوات العمل	نعم	لا
١			
٢			

احتفظ بتقويمك الذاتي في ملفك الخاص

### أخطاء شائعة

## النتائج الخاصة

- يوضح مفهوم كلٍّ من: التفاحيات، الدابرة الثمرية، البراعم الثمرية المختلطة، التمايز الزهري، المعاومة.
- يتعرّف الأنواع التي تشملها التفاحيات.
- يصف طبائع الإزهار والإثمار في التفاح.
- يحدد أنواع البراعم الثمرية في التفاحيات.
- يميّز بين أصناف التفاح الذاتية الإثمار، وغير الذاتية (خلطية الإثمار).
- يستقصي العوامل المناخية التي تؤثر في نمو التفاح وإنتاجه.
- يحدد الاحتياجات المناخية الملائمة لنمو التفاح وإنتاجه.
- يقترح حلولاً لمعالجة أبرز المشكلات التي تواجه زراعة التفاح في مناطق الأردن.
- يصف التربة الملائمة لنمو التفاح وإنتاجه.

## المفاهيم والمصطلحات

التفاحيات، دابرة ثمرية، البراعم الثمرية المختلطة، التمايز الزهري، المعاومة.

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس وتوظيف خبرات الطلبة السابقة بطرح الأسئلة الآتية: لماذا سميت هذه الفاكهة باسم التفاحيات؟ ما اسم الفصيلة التي تتبع لها التفاحيات؟ ما المهده الأصلي للتفاح البري؟ ما اسم الأنواع التي نشأت منها أشجار أصناف التفاح؟ كيف نشأت أشجار التفاح؟ ما الاسم العلمي للتفاح؟ ماذا تسمى البراعم التي تعطي عند تفتحها نمواً خضرياً بالإضافة إلى الأزهار؟ ما نوع البراعم الثمرية في التفاحيات؟ ما الأنواع التي تشملها التفاحيات؟ مناقشة إجابات الطلبة وتدوينها على السبورة.

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرّف طبائع الإزهار والإثمار في التفاح يعرض المعلم الشكل (١-٧)، ثم يقسم الطلاب إلى خمس مجموعات، كما يأتي:

- المجموعة الأولى: تحدد مكان حمل البراعم الثمرية في التفاح، وتوضح المقصود بحمل البراعم الثمرية قميّاً، وحمل البراعم الثمرية جانبيّاً، الدابرة الثمرية.
- المجموعة الثانية: تصف أزهار التفاح، وتحدد نوع البراعم الثمرية في التفاح.
- المجموعة الثالثة: توضح المقصود بالبراعم الثمرية المختلطة، وتمييز بين البراعم الثمرية المختلطة والبراعم الثمرية البسيطة، التمايز الزهري، وتحدد موعد حلوته.

## التفاحيات

## ثانياً

تتبع هذه المجموعة العائلة الوردية (Rosaceae) وتشمل التفاح، والكمثرى (الإجاص)، والسفرجل.

## التفاح (Apple)

اسمه العلمي (Malus Pumila Mil)

إن المهده الأصلي للتفاح البري يقع على نحو أكيد في الصين، ويحتمل أن تكون منطقة بحر قزوين هي الموطن الأصلي لشجرة التفاح، وأن تكون أشجار أصناف التفاح الزراعية قد نشأت من النوع (Malus Sylvestries)، أو من النوع (Malus Pumila)، أو نتيجة للتهجين بين هذين النوعين وغيرهما من الأنواع البرية، مثل: (Paradisiaca Malus)، (Gallica Malus).

● الإزهار والإثمار: تحمل البراعم الثمرية في التفاح قميّاً على دوابر ثمرية، كما في الشكل (١-٧)، محمولة على أغصان، عمرها سنتان أو أكثر، وتحمل البراعم الثمرية في بعض الأصناف جانبيّاً على نموات عمرها سنة واحدة.

أزهار التفاح كبيرة الحجم، تنتج من براعم زهرية مختلطة تحمل قميّاً على دوابر ثمرية قصيرة نسبياً، وينتج من تفتح البراعم المختلطة نورة مكوّنة من (٥-٦) أزهار، ونمواً خضري قصير ذو عقد وسلاميات.

## مفاهيم

دابرة ثمرية: نمو قصير نسبياً يحمل براعم زهرية، إما جانبيّاً، وإما قميّاً، ويتراوح عمر هذا النمو بين سنة واحدة وبضع سنوات.

## مفاهيم

البراعم الثمرية المختلطة: تعدّ هذه البراعم مختلطة؛ لأنها تعطي عند تفتحها نمواً خضرياً (يشمل الأوراق)، إضافة إلى الأزهار، ومثال ذلك البراعم الثمرية في أشجار التفاحيات.

- المجموعة الرابعة: تدرس كيفية الإثمار في أصناف التفاح، وذلك بالتمييز بين أصناف التفاح الذاتية الإثمار، وغير الذاتية الإثمار (الخلطية)، وتبحث في كيفية إثمار أصناف التفاح غير الذاتية الإثمار، وتحدد الشروط الواجب توافرها في الأصناف الملقحة، وموعد عقد الثمار، وموعد النضج.
- المجموعة الخامسة: تبحث في العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج التفاح، وتفسّر إنتاج التفاح في منطقة الأغوار، وتبيّن درجات الحرارة الملائمة لإنتاج التفاح، وكذلك نوع التربة. وتعرض ما تتوصل إليه وتناقشه مع الطلاب. يعرض منسق كلّ مجموعة ما تتوصل إليها المجموعة في عرض تقديمي. الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى. ● يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح موحد لدى الطلبة جميعهم.



## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

- يوجّه بعض الطلبة إلى البحث في المصادر المتاحة ( كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن أصناف التفاح الذاتية الإثمار، وغير الذاتية (خلطية الإثمار)، وعرض ما يتوصلون إليه ومناقشته مع زملائهم.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-١٦)
- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: قائمة رصد (١-١٧)
- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-١٨)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

### للطالب

- محمد الطراوانة، وهويل السبائلة، إنتاج التفاح، وزارة الزراعة- المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، مشروع الصادرات البستانية ونقل التكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٧م.



الشكل (٧-١): طبيعة الحمل في التفاح.

يبدأ التمايز الزهري (بدء تحوّل البرعم من خضريّ إلى زهريّ) في التفاح مبكراً في الصيف، ويستمر تطور البراعم الزهرية المختلطة ونموّها خلال الصيف والخريف، وتبقى في حالة سكون في الشتاء إلى حين تفتحها في الربيع التالي، فينتج عنه نورة ونموّ خضري. تتصف بعض أصناف التفاح بأنها ذاتية الإثمار، ولكن الغالبية خلطية (غير ذاتية) الإثمار، ولذا فإنها تحتاج إلى التلقيح الخلطي، وتوافر صنفين من أصناف التفاح في البستان الواحد لإنتاج محصول تجاري.

**فكر** تتمر أصناف التفاح غير ذاتية الإثمار، باستخدام الأصناف الملقحة لها، فما الشروط الواجب توافرها في الأصناف الملقحة؟

وبعد الثمار في الربيع، تبدأ بالنمو لتصل إلى مرحلة النضج خلال فصل الصيف، ويمثل أصناف التفاح عموماً إلى المعاومة (Alternate bearing)، أي أنها تحمل في إحدى السنوات حملاً غزيراً، ثم تحمل حملاً خفيفاً في السنة التالية.

### مهارات البحث والاتصال

يمثل أصناف التفاح إلى المعاومة Alternate bearing، ابحث في شبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية عن ظاهرة المعاومة من حيث؛ مفهومها، وأسبابها، وطرق الحد منها، واعرض ما تتوصل إليه عن طريق برمجية العروض التقديمية، وناقشه مع زملائك.

٣٩

**المناخ:** تعدّ درجات الحرارة عاملاً مهمّاً ومحدداً في نجاح زراعة التفاح؛ لأنّ أشجار التفاح تحتاج إلى كميات من البرودة لكسر طور السكون الشتوي، واستئناف النموّ في الربيع، وتتراوح هذه الاحتياجات بين ٣٥٠-١٢٠٠ ساعة برودة، تبعاً للصنف، عندما تنخفض درجات الحرارة إلى ٧,٢°س، أو ما دون ذلك، وهذه تكافئ في مجموعها ما يساوي ٧-٩ أسابيع. ويجب مراعاة هذه المتطلبات من البرودة عند اختيار الأصناف؛ لكي تناسب الموقع، وينصح بعدم اختيار الأصناف التي تزيد احتياجاتها من البرودة على ١٠٠٠ ساعة برودة للزراعة في الأردن، لأنّ الشتاء في بعض السنوات قد لا يكون بارداً إلى الحد الذي يسمح بتوفير هذه الكمية من ساعات البرودة.

ونظراً إلى أهمية التفاح الاقتصادية، وبناء على الطلب المتزايد على هذا المحصول في بقاع العالم المختلفة، فقد طوّرت العديد من البلدان أصنافاً جديدة تمتاز باحتياجات متدنية من البرودة، لا تزيد على ٥٠٠ ساعة برودة؛ ممّا جعل زراعتها في غور الأردن ممكنة، مثل: دورست جولدن (Dorest Golden)، وأنا (Anna).

وحتى تكون ثمار التفاح على درجة عالية من الجودة (الطعم واللون)، فإنه لا بدّ من توافر نهار طويل، وشمس ساطعة خلال فصل النمو، إضافة إلى نهار دافئ تبلغ درجة حرارته (٢٥-٢٨°س)، وليل بارد نسبياً، وانخفاض في الرطوبة الجوية.

ومع أن براعم التفاح تتأخر في تفتحها عن اللوزيات؛ إلاّ أنها تصاب بالضرر عند تعرضها للصقيع المتأخر في الربيع. وتتسبّب الأمطار أو الجفاف في أثناء مدة الإزهار وعقد الثمار في خفض الإنتاجية؛ بسبب تساقط الأزهار والثمار الصغيرة.

### تطبيقات

مستعيماً بموقع دائرة الأرصاد الجوية، احسب عدد ساعات البرودة السنوية (التي تقلّ فيها درجة الحرارة عن ٧,٢°س) في منطقتك، ثم اختر صنفين يصلحان للزراعة الإنتاجية لأشجار التفاح، وناقش ذلك مع زملائك.

**التربة:** تنمو أشجار التفاح في أنواع مختلفة من التربة، بشرط أن تكون جيدة التهوية، وخالية من الملوحة، ويجب ألا يقل عمقها عن ٩٠ سم. ويفضل التفاح الأراضي التي

٤٠

## النتائج الخاصة

- يتعرّف طرق التكاثر.
- يصنف أصول التفاح بناءً على نمو أصناف التفاح المطعمة عليه.
- يتعرّف الأصول المستعملة في تطعيم التفاح.
- يحدد العوامل التي تؤثر في تحديد مسافات الزراعة عند غرس أشاتال التفاح.
- يتعرّف مسافات الزراعة المناسبة للتفاح.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- يقسم المعلم الطلاب إلى أربع مجموعات، ويهيئ البيئة الصفية المناسبة للعمل كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تدرس الشكل (٨-١)، وتبين تأثير الأصول المقزّمة في نمو أصناف التفاح المطعمة عليه، وذلك بتحديد الأصول المقزّمة، وتصف الأصول M27، M9، M26.
- المجموعة الثانية: تدرس الشكل (٨-١)، وتبين تأثير الأصول شبه المقزّمة في نمو أصناف التفاح المطعمة عليه، وذلك بتحديد الأصول شبه المقزّمة، وتصف الأصول: (M7، MM106).
- المجموعة الثالثة: تدرس الشكل (٨-١)، وتبين تأثير الأصول في نمو أصناف التفاح المطعمة عليه، وذلك بتحديد الأصول شبه القوية، وتصف الأصل (MM111).
- المجموعة الرابعة: تدرس الشكل (٨-١)، وتبين تأثير الأصول القوية في نمو أصناف التفاح المطعمة عليه، وذلك بتحديد الأصول القوية، وتصف الأصل البذري.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

## التدريس المباشر / أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بتنفيذ المعلم جلسة مناقشة عامة عن مسافات الزراعة المناسبة لزراعة التفاح، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما العوامل التي تؤثر في تحديد

تتراوح درجة حموضتها (pH) بين (٦-٦,٥)، إلا أنه ينمو في أراضٍ قد تصل درجة الحموضة فيها إلى ٨,٥.


التكاثر: الطريقة الشائعة لتكاثر التفاح في المشاتل هي التطعيم بالعين، أو التركيب بالقلم على أصول التفاح، سواء أكانت أصولاً خضرية أم منتجة بإنبات البذرة بعد تنضيدها. ١. أصول التفاحيات: يُكثّر التفاح بتطعيم الصنف أو الأصناف المطلوبة على أحد الأصول المناسبة، وتقسّم أصناف التفاح من حيث تأثيرها في نمو الصنف المطعم عليها - كما في الشكل (٨-١) - إلى ما يأتي:

أ. أصول مقزّمة، تشمل: M26، M9، M27.

ب. أصول شبه مقزّمة، تشمل: M106، M4، M7.

ج. أصول شبه قوية، تشمل: M25، MM10، MM11.

د. أصول قوية، تشمل: M1، MM104، M16، الأصل البذري (Seedling) وتكثّر أصول التفاح السابقة جميعها بطريقة الإكثار الخضري، مثل: الترقيد، والعقل، وزراعة الأنسجة، ويستثنى من ذلك أصل التفاح البذري الذي كثر بواسطة بذور أصناف تفاح معينة، مثل: (Bittenfelder)، و(Graham).



الشكل (٨-١): تأثير الأصل في نمو أصناف التفاح المطعمة عليه.

والأصول هي من (اليسار إلى اليمين): M9، M26، M7، M4، M11، MM111، MM104، وفي أقصى اليمين الأصل البذري.

٤١

مسافات الزراعة عند غرس أشاتال التفاح؟ كيف تؤثر طبيعة نمو الأصل المستعمل في اختيار مسافات الزراعة المناسبة عند غرس أشاتال التفاح؟

- مناقشة إجابة الطلبة عن الأسئلة وتدوين الصحيح منها على السبورة.



## مراعاة الضروك الفردية

### علاج

### إثراء

- يوجّه بعض الطلبة إلى البحث في المصادر المتاحة ( كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن تأثير الأصل في نمو أصناف التفاح المطعمة عليه، ثم يُعرض ما يتوصلون إليه، ويناقش مع الطلبة.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير لفظي (١-١٩)
- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: سجل وصف سير التعلم (١-٢٠)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

- كتاب الإنتاج النباتي - المستوى الثاني.

## مصادر التعلم

### للمعلم

- مجلة المهندس الزراعي، العدد الخاص بالمؤتمر الزراعي الوطني الثاني، العددان (٦٩-٧٠)، نقابة المهندسين الزراعيين، عمان، الأردن، حزيران، ٢٠٠١م.

- George, A. Cquaah. Horticulture Principles and practices. Pearson Prentice Hall. 2005

### للطالب

- خليل جرن، دليل المزارع السنوي، وزارة الزراعة، عمان، الأردن، ٢٠٠٨م.
- محمد زبن، الموسوعة الزراعية: الفاكهة والأشجار المثمرة، دار الطريق للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٠م.
- طه عبدالله نصر، إكثار أشجار الفاكهة، القواعد العلمية والأساليب العصرية، مكتبة المعارف الحديثة، الإسكندرية، ٢٠٠٣م.

وفي ما يأتي وصف لأهم أصول التفاح:

- الأصل M27: أكثر أصول التفاح تقريباً، إذ يبلغ حجم أشجار الأصناف المطعمة عليه ١٥-٢٠٪ من حجم مثيلاتها المطعمة على أصل بذري، يحتاج إلى دعامات، ويشجع على تبيكيز إثمار الأصناف المطعمة عليه، وهو مناسب لأغراض الزراعة الكثيفة، ويزرع في أراضٍ جيدة الخصوبة، إلا أنه يصاب بالمرض القطني.
- الأصل M9: يبلغ حجم أشجار الأصناف المطعمة ٢٠-٢٥٪ من حجم مثيلاتها المطعمة على أصل بذري، وهو يحتاج إلى دعامات، ويشجع على تبيكيز إثمار الأصناف المطعمة عليه، وهو مناسب لأغراض الزراعة الكثيفة، ولا يصاب بمرض التعفن التاجي، إلا أنه يصاب بحشرة المرنّ القطني.
- الأصل M26: يصل حجم أشجار الأصناف المطعمة عليه إلى ٣٠٪ من حجم مثيلاتها المطعمة على أصل بذري، ويمتاز بأنه يحتاج إلى دعامات، ويشجع على تبيكيز إثمار الأصناف المطعمة عليه، وهو مناسب لأغراض الزراعة الكثيفة، وحساس للرطوبة الزائدة، ومرض التعفن التاجي، وعرضة للإصابة بحشرة مرنّ التفاح القطني.
- الأصل M7: من الأصول شبه المقزمة، يصل حجم أشجار الأصناف المطعمة عليه إلى ٥٠٪ من حجم مثيلاتها المطعمة على أصل بذري، لا يحتاج إلى دعامات؛ لأنّ مجموعته الجذري قادر على تثبيت الأشجار تثبيتاً جيداً في التربة، يتحمل التربة الجافة نسبياً، ولكنّه عرضة للإصابة بالمرض القطني، وحساس لمرض التعفن التاجي.
- الأصل MM106: يصل حجم أشجار الأصناف المطعمة عليه إلى ٦٠٪ من حجم مثيلاتها المطعمة على أصل بذري، ويساعد على تبيكيز إثمار الأصناف المطعمة عليه، ويحتاج إلى دعامات في بداية حياة الشجرة فقط، ويتحمل التربة الجافة نسبياً، وهو مقاوم لحشرة مرنّ التفاح القطني، وحساس لمرض التعفن التاجي.
- الأصل MM111: يصل حجم أشجار الأصناف المطعمة عليه إلى ٨٠٪ من حجم مثيلاتها المطعمة على أصل بذري، يحتاج إلى دعامات في بداية حياة الشجرة فقط، ويتحمل الجفاف في التربة، وهو مقاوم لحشرة مرنّ التفاح القطني، ومتوسط الحساسية لمرض التعفن التاجي.

٤٢

ز. الأصل البذري Seedling: أشجار الأصناف المطعمة عليه جداً ومعثرة،

يحتاج إلى دعامات في بداية حياة الشجرة فقط، وتحتاج الشجرة إلى سنوات

عديدة للدخول في مرحلة الإثمار، ويصاب بحشرة مرنّ التفاح القطني.

مسافات الزراعة: تتأثر مسافات (أبعاد) الزراعة في التفاح بالعوامل الآتية:

١. طريقة الزراعة.

٢. طريقة التربة.

٣. خصوبة التربة وعمقها.

٤. الأصول المستعملة.

٥. طبيعة نمو الصنف: قائم النمو، أو منتشر النمو.

وبناء على طبيعة نمو الأصل المستعمل فإنه يمكن اختيار الأبعاد الآتية:

مسافات الزراعة المناسبة	الأصل الذي طمّنت عليه الأشجار
٣-٢,٥ x ١,٥-٠,٥ م	M27, M9, M26
٥-٤ x ٤-٣ م	MM106
٧-٦ x ٥-٤ م	الأصل البذري والأصول القوية الأخرى

والمثال الآتي يوضح أبعاد الزراعة:

أبعاد الزراعة لأشجار التفاح المطعمة على الأصل M9 هي: ٥-٠,٥ x ١,٥ x ٣-٣,٥م،

وهذا يعني أن المسافة بين الشجرة والتي تليها في الخط الواحد من الأشجار داخل البستان

تتراوح بين ٠,٥ متر إلى ١,٥ متر، في حين تتراوح المسافة بين خطين متجاورين من

الأشجار بين ٢,٥ م إلى ٣ م.

عمليات الخدمة: تشمل عمليات خدمة بساتين التفاح ما يأتي:

١. الحرث والعرق: نظراً إلى اعتماد معظم بساتين التفاحيات في المناطق المرتفعة

من الأردن على مياه الأمطار فإنه لا بدّ من الاستفادة القصوى منها. ويكون

ذلك بحرث البساتين مرتين؛ الأولى في الخريف؛ لتهيئة التربة لاستيعاب مياه

الأمطار؛ والتخلص من الأعشاب التي تنافس الأشجار على الماء والغذاء؛ ولخلط

الأسمدة العضوية، والأخرى مع بداية فصل الربيع، وتسمى الحرثة الربيعية،

٤٣

## النتائج الخاصة

- يصف عمليات الخدمة اللازمة لبساتين التفاح (الحرث، التسميد، الري، التقليم، الخف).
- يتعرف أكثر الآفات شيوعاً في بساتين التفاح.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- تتعرف عمليات الخدمة المقدمة لبساتين التفاحيات يقسم المعلم الطلبة إلى خمس مجموعات عمل، ويحدد المهام والزمن اللازم على النحو الآتي:
- المجموعة الأولى: تكلف دراسة عملية الحرث والعزق لبساتين التفاحيات من حيث مواعيدها، وعددها، وكيفية إجرائها.
- المجموعة الثانية: تكلف دراسة عملية التسميد لمحاصيل التفاحيات، ثم تجيب عن الأسئلة الآتية: كيف تضاف الأسمدة العضوية إلى الأشجار المثمرة في المناطق المروية أو البعلية؟ كم يبلغ معدل الأسمدة العضوية (طن/دونم) التي يجب إضافتها؟ ما الموعد المناسب لإضافة الأسمدة الكيميائية (النيتروجينية) في الأراضي البعلية؟ كم يبلغ معدل الأسمدة الكيميائية (النيتروجينية) التي يجب إضافتها في الأراضي البعلية؟ كم عدد دفعات الأسمدة الكيميائية (النيتروجينية) التي يجب إضافتها في الأراضي البعلية؟ كم عدد دفعات الأسمدة الكيميائية (النيتروجينية) التي يجب إضافتها في الأراضي المروية؟ ما الموعد المناسب لإضافة الأسمدة الكيميائية (النيتروجينية) في الأراضي المروية؟ يجب عدم التأخر أو الإسراف في إضافة السماد النيتروجيني.
- المجموعة الثالثة: تكلف دراسة الجدول (١-٥) الذي يبين كميات الأسمدة الكيميائية (كغم/دونم) المقترحة لمحاصيل التفاحيات، ثم تحدد كميات الأسمدة الكيميائية (نيتروجين) (N)، فسفور (P)، بوتاس (K)، التي يجب إضافتها لكل من محصولي التفاح والكمثرى.
- المجموعة الثالثة: تكلف دراسة الجدول (١-٦) الذي يبين كميات مياه الري اللازمة خلال موسم النمو لري بساتين التفاحيات، ثم تحدد كميات مياه الري اللازمة لري بساتين التفاحيات خلال موسم النمو.

وتهدف هذه الحرثة إلى التخلص من الأعشاب وخلط الأسمدة الكيميائية. أما في المناطق التي تعتمد على الري، فيلزم حرثه خلال فصل الصيف؛ للتخلص من الأعشاب الصيفية.

٢. التسميد: تضاف الأسمدة العضوية للأشجار المثمرة في المناطق المروية أو البعلية بمعدل طن- إلى طنين لكل دونم، وتخلط بالتربة مع الحرثة الأولى. أما الأسمدة الكيميائية، وبخاصة النيتروجينية، فتضاف دفعة واحدة في الأراضي المطرية (البعلية) خلال شهر شباط، بمعدل (١-٣) كغم قبل الحرثة الثانية في فصل الربيع. أما في الأراضي المروية فتضاف تلك الكمية على دفعتين، الأولى في شباط-آذار، والثانية في أيار-حزيران. ويجب عدم التأخير أو الإسراف في إضافة السماد النيتروجيني؛ لأن ذلك يؤثر في جودة الثمار من حيث زيادة ليوثتها، وضعف لونها، وتأخر نضجها، وقصر مدة تخزينها، إضافة إلى استمرار نمو الفروع الخضرية، مما يعرضها لأضرار الصقيع المبكر؛ لأنها تكون حينئذ غضة.

الجدول (١-٥): كميات الأسمدة الكيميائية (كغم/دونم) المقترحة لمحاصيل التفاحيات.

المحصول	نيتروجين (N)	فسفور (P)	العصر الغذائي
تفاح	٢٠-٢٤	١٢	بوتاس (K)
كمثرى	١٨-٢٤	١٢	

● ملحوظة: الكميات المقترحة في ما سبق هي لأشجار التفاحيات التي وصلت إلى مرحلة الإثمار الاقتصادي، وهي أرقام تقريبية يمكن اللجوء إليها في حالة عدم توافر معلومات أو نتائج تحليل لعينات الأوراق والتربة. أما في حالة توافر نتائج تحليل عينات الأوراق والتربة فيجب اعتماد تلك النتائج ومراعاتها، وإعداد برنامج التسميد بناءً على ذلك.

٣. الري: الري التكميلي (خلال الصيف) عامل أساسي لنجاح زراعة التفاح في الأردن، وخاصة في السنوات التي تقل فيها الأمطار، إذ إن تعرض الأشجار لجفاف التربة خلال الصيف يؤدي إلى تساقط الثمار، وصغر حجمها، ورداءة جودتها، وقصر نمواتها الخضرية، وضعف أزهارها في الموسم.

٤٤

- المجموعة الرابعة: تكلف دراسة عملية التقليم الإثماري لأشجار التفاح المربأة على نحو هرمي من حيث كيفية إجرائها.
- المجموعة الخامسة: تكلف دراسة عملية خف الثمار من حيث الطرق المستخدمة، وتحديد الطريقة الأكثر استخداماً، والموعد المناسب لإجرائها. يستمع المعلم إلى آراء المجموعات الأخرى، ثم يقدم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح موحد لدى الطلبة جميعهم.

## التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة

- التمهيد للحصة بتنفيذ المعلم جلسة مناقشة عامة عن أبرز الآفات شيوعاً في بساتين التفاح، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما أكثر الأمراض شيوعاً في بساتين التفاح؟ ما أكثر الحشرات التي تهاجم أشجار التفاح؟ مناقشة إجابة الطلبة، وتدوين الصحيح منها على السبورة.

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

– يُكلف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن كيفية تأثير طبيعة نمو الأصل المستعمل في اختيار مسافات الزراعة عند غرس أشغال التفاح، ثم يعرض ما يتوصلون إليه ويناقش مع الطلبة.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: قلم وورقة
- أداة التقويم: اختبار (١-٢١)
- استراتيجية التقويم: الملاحظة
- أداة التقويم: السجل القصصي (١-٢٢)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

– كتاب الإنتاج النباتي – المستوى الثاني.

## مصادر التعلم

للمعلم

للطالب

الجدول (٦-١): كميات مياه الري اللازمة خلال موسم النمو لري بساتين التفاحيات.

الحصول	كميات مياه الري م <sup>٣</sup> / دورم
تفاح	٦٠٠-٤٥٠
كمثرى	٦٠٠-٤٥٠

٤. التقليم: تلخّص عملية التقليم الإثمالي لأشجار التفاح المرباة على نحو هرمي

في الخطوات الآتية:

أ. إزالة النموات الموجودة على ساق الشجرة تحت مستوى التقاء الفروع الرئيسة بالساق، أو عند قاعدة الساق.

ب. إزالة النموات المصابة بالحشرات والأمراض.

ج. إزالة النموات المتضررة ميكانيكياً، كالنموات المكسورة بفعل الرياح، أو الحمل الغزير، أو بفعل الآليات.

د. تقصير قمة كل من الفروع الرئيسة الثلاثة، والقائد الوسطي إلى أقرب فرع جانبي للقمة، على أن يكون هذا الفرع الجانبي إلى الخارج في الفروع الرئيسة الثلاثة، وتهدف عملية التقصير هذه إلى إبقاء الشجرة ضمن الارتفاع المطلوب.

هـ. إزالة النموات التي تؤدي إلى تشابك الأجزاء الداخلية للشجرة، وهذه النموات تشمل الطرود المائية والفروع التي تنمو على السطح الداخلي للفروع الرئيسة باتجاه القائد الوسطي، أو تلك التي تنمو على القائد الوسطي باتجاه الفروع الرئيسة مباشرة.

و. إزالة بعض النموات القديمة المحمولة على الفروع الرئيسة، أو القائد الوسطي، وبخاصة تلك التي تحمل دواب ثمرية هامة.

ز. تقصير بعض النموات الجانبية على الفروع الرئيسة والقائد الوسطي؛ بهدف المحافظة على الشكل الهرمي للشجرة، والحد من تظليل النموات العلوية لما تحتها. وهذا التقليم هو المفضل في التفاح، إذ إن التقليم الشديد أو الجائر يضعف الأشجار، ويزيد من نموها الخضري، أما التقليم الخفيف جداً فيؤدي إلى ضعف النمو الخضري، وزيادة عدد الثمار ذات الحجم الصغيرة.

٤٥

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يتعرّف أهم أصناف التفاح الموجودة في الأردن.
- يصف عمليتي نضج ثمار التفاح وجنيها.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرّف أصناف التفاح يعرض المعلم الشكل (١-٩) ثم يكلف الطلبة ضمن العمل في مجموعات القيام بما يأتي:
- المجموعة الأولى: تكلف دراسة صنف التفاح (جولدن ديلشس)، و(ديلشس) من حيث: حجم الأشجار، حجم الثمار، لون الثمار، موعد نضج الثمار، صلاحيتها للتخزين، الطفرات الناتجة من كل صنف.
- المجموعة الثانية: تكلف دراسة صنف التفاح (جراني سميث)، و(رويال جالا) من حيث: حجم الأشجار، حجم الثمار، ولونها، موعد نضجها، صلاحيتها للتخزين.
- المجموعة الثالثة: تكلف دراسة صنف التفاح (فوج) من حيث: حجم الأشجار، والثمار، ولونها، وموعد نضجها، وصلاحيتها للتخزين.
- المجموعة الرابعة: تكلف دراسة صنف التفاح (أنا) و(دورست جولدن) من حيث نمو الأشجار، حجم الثمار، ولونها، وموعد نضجها، والمناطق التي تنجح زراعتها فيها، وصلاحية الثمار للتخزين.
- المجموعة الخامسة: تكلف كتابة تقرير عن أصناف التفاحيات الشائعة في منطقتها مستعينة بالمراجع وأدلة الشركات (الكتالوجات)، ثم تعرض ما تتوصل إليه، وتناقشه مع الطلبة.
- بعد الانتهاء من العمل يعرض منسق كلّ مجموعة ما تتوصل إليه المجموعة من نتائج، ثم يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

## التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة

- التمهيدي للحصة بتنفيذ المعلم جلسة لمناقشة عمليتي نضج ثمار التفاح وجنيها، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ماذا تُسمّى عملية حدوث تغيرات فسيولوجية وكيميائية داخل الثمرة التي اكتمل نموها؟ ما المقصود بنضج الثمرة؟ ما علامات

- ٥. خفّ الثمار: تتصف كثير من أصناف التفاح بالمعومة (تبادل الحمل)، وفي هذه الحالة لا بدّ من خفّ الثمار بإحدى الطرق المعروفة، وهي اليدوية أو الميكانيكية، أو الكيميائية، والأخيرة هي الأكثر استخداماً، وترشّ الأشجار بمنظّم النموّ NAA، بتركيز يتراوح بين ١٠-٢٠ جزءاً في المليون، بعد ١٥-٢٠ يوماً من التفتح الكامل للأزهار.
- ٦. الآفات: تتعرض أشجار التفاح في مراحل نموها المختلفة للإصابة بالعديد من الآفات، ومنها: دودة ثمار التفاح، ومنّ التفاح القطني، وحفّار ساق التفاح، والبياض الدقيقي، وجرب التفاح.

- ١. الأصناف: كما في الشكل (١-٩): ينتشر العديد من أصناف التفاح العالمية في الأردن، منها: جولدن ديلشس Golden Delicious: أشجاره متوسطة الحجم، ويمتاز بإنتاجيته العالية، أمّا ثماره فهي متوسطة إلى كبيرة الحجم، لونها أصفر لامع، والجزء اللحمي منها أبيض، مذاقها حلو، وله نكهة مميزة، وينضج في شهر أيلول، ويصلح للتخزين والشمّن، وقد نتجت منه طفرات عدّة، منها: "ليز جولدن" Lysgold، و"سموثي" Smoothee، و"أوزارك جولدن" Ozark gold.
- ٢. ديلشس Delicious: أشجاره قوية، وقائمة، إنتاجيته جيدة، وثماره متوسطة إلى كبيرة الحجم، لونها أحمر لامع، والجزء اللحمي منها أبيض اللون، عصيري، حلو المذاق، ويمتاز ثماره بوجود تنوعات مميزة عند قمة الثمرة، ينضج في أيلول-تشرين، ويصلح للتخزين. وقد نتجت منه طفرات عدّة، منها: Ace، Top، Red Chief، Red Starkrimson، Red King.
- ٣. جراني سميث Granny Smith: أشجاره متوسطة النمو، إنتاجيته جيدة، وثمرته متوسطة إلى كبيرة الحجم، لونها أخضر، والجزء اللحمي منها صلب عصيري يجبل إلى الحموضة، ينضج في تشرين الأول، ويصلح للتخزين.
- ٤. رويال جالا Royal Gala: أشجاره متوسطة النمو، وإنتاجيته جيدة، وثمرته متوسطة الحجم، موشحة باللون الأحمر على خلفية صفراء، والجزء اللحمي منها صلب، وينضج في آب.
- ٥. فوجي Fuji: أشجاره قوية، شبه قائمة النمو، إنتاجيته جيدة، وثمرته صغيرة إلى متوسطة الحجم، لونها يتراوح بين الأخضر، والأصفر، الموشح بالأحمر، والجزء اللحمي منها

نضج ثمار التفاح؟ مناقشة إجابة الطلبة، وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.



### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

- تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها)
- عن أكثر الآفات شيوعاً في بساتين التفاح، ثم عرض النتائج على زملائهم.
- باستخدام برمجية العروض التقديمية، يكلف بعض الطلبة تصميم عرض تقديمي من خمس شرائح لبيان أهم أصناف التفاح الموجودة في الأردن.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٢٣)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

- كتاب الإنتاج النباتي - المستوى الأول.

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- Hartman, H., Kester, D., davies, F. and Geneve, R. Plant propagation : principles and practices, 7th edition . 2002

#### للطالب

- إبراهيم خيرى، عتريس إبراهيم، أمراض وآفات أشجار الفاكهة وطرق المقاومة، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٦م.


صلب، عصيري، شديد الحلاوة، يُنضج في تشرين الأول، ويصلح للتخزين.  
٦. آنا Anna: يناسب المناطق ذات الشتاء الدافئ، مثل منطقة وادي الأردن، تتراوح احتياجاته من البرودة بين ٣٠٠-٣٥٠ ساعة برودة، وتنضج ثماره مبكراً، حجمها متوسط إلى كبيرة، طويلة، وصفراء، وموشحة باللون الأحمر، وشجرته قوية النمو، تميل إلى الحمل المبكر والغزير.



(جراني سميث)



(جولدن)



(روبال جالا)



(فوجي)



آنا



دورست جولدن

الشكل (١-٩): بعض أصناف التفاح.

٤٧

### مهارات البحث والاتصال

اكتب تقريراً عن أصناف التفاح الشائعة في منطقتك مستعيناً بالمراجع وأدلة الشركات المستوردة (الكتالوجات)، واعرض ما توصل إليه عن طريق برمجية العروض التقديمية، وناقشه مع زملائك.

#### النضج والحسي: تشمل علامات نضج ثمار التفاح ما يأتي:

١. وصول الثمار إلى الحجم واللون المناسبين، فالأصناف الخضراء يصبح لونها أصفر فاتح (كريمي)، أما الأصناف الحمراء فتتغير إلى اللون الأحمر الداكن.
٢. زيادة ليونة الثمرة التي تقاس باستخدام جهاز قياس الصلابة.
٣. احتساب عمر الثمرة من وقت العقد إلى اكتمال النضج.
٤. احتساب نسبة المواد الصلبة الذائبة باستخدام جهاز مقياس انكسار الضوء (الرافراكتوميتر).

٤٨

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يصف طبائع الإزهار والإثمار في الكمثرى.
- يقارن بين طبائع الإزهار والإثمار في كل من الكمثرى والتفاح.
- يحدد الاحتياجات المناخية الملائمة لنمو وإنتاج الكمثرى.
- يصف التربة الملائمة لنمو وإنتاج الكمثرى.
- يتعرف طرق تكثير الكمثرى.
- يتعرف مسافات الزراعة المناسبة للكمثرى.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس باستشارة خيرات الطلبة السابقة وطرح الأسئلة الآتية: ما الموطن الأصلي للكمثرى؟ ما اسم النوع الذي تتبع أشجار معظم أصناف الكمثرى التجارية له؟ كيف نتجت أصناف الكمثرى التجارية؟ ما الاسم العلمي للكمثرى؟ مناقشة إجابات الطلبة وتدوين الصحيح منها على السبورة.
- لتعرف طبائع الإزهار والإثمار في الكمثرى يعرض المعلم الشكل (١-١٠)، ثم يطرح بعض الأسئلة للمناقشة، مثل:
  - ما مكان حمل البراعم الثمرية في الكمثرى؟ ما المقصود بحمل البراعم الثمرية قميًا، وحمل البراعم الثمرية جانبيًا؟ وكيف نحدد نوع البراعم الثمرية فيها؟
  - كيف تفسر سبب احتياج معظم أصناف الكمثرى إلى تلقيح خلطي؟
  - قارن بين أصناف التفاح والكمثرى من حيث الميل إلى المعاومة، وبين أثر ذلك في عملية خف الثمار.

## التعلم التعاوني/ العمل الجماعي

- يقدم المعلم عرضًا تقديميًا لتوضيح احتياجات الكمثرى المناخية، ثم يقسم الطلاب إلى ثلاث مجموعات، ويهيئ البيئة الصفية المناسبة للعمل، كما يأتي:
  - المجموعة الأولى: تحدد العوامل المناخية التي تعدد عاملاً مهماً ومحددًا في نجاح زراعة الكمثرى، وتحدد ساعات البرودة اللازمة لأشجار الكمثرى لكسر طور السكون الشتوي واستئناف النمو في الربيع.
  - المجموعة الثانية: تحسب عدد ساعات البرودة السنوية التي تقل فيها درجة الحرارة عن (٧,٢°س) في منطقتها، ثم تختار صنفين يصلحان للزراعة الإنتاجية، ثم تعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية،

## الكمثرى: pear

اسمها العلمي (Pyrus Communis L)

يعتقد بأن المنطقة الشمالية والمنحدرات الشمالية من إيران والمنحدرات الشمالية الغربية من جبال الهملايا وجبال القوقاز، هي الموطن الأصلي للكمثرى. وتتبع معظم أصناف الكمثرى التجارية النوع (Pyrus Communis L)، وقليل منها يتبع النوع (Seratina Pyrus) وتنتج بعضها من التهجين بين هذين النوعين وغيرهما من الأنواع.

● الإزهار والإثمار: تحمل البراعم الثمرية قميًا على دواير ثمرية، كما في التفاح، ويمكن أن تحمل جانبيًا على نموات الموسم السابق في بعض الأصناف، ويعطي البرعم الزهري الواحد بين ٥-٨ أزهار زهرية اللون، كما في الشكل (١-١٠). ومعظم أصناف الكمثرى عديمة التوافق الذاتي، لذلك فهي تحتاج إلى تلقيح خلطي؛ مما يستلزم زراعة صنفين متوافقين من أصناف الكمثرى، مثل أصناف بارلت Bartlett، ووترنيلز Win-ter Nelis. وتختلف الكمثرى عن التفاح في أن أصنافها لا تميل إلى المعاومة، مثل التفاح، ولذا فإن خف الثمار في كثير من الأحيان غير ضروري، ما لم يكن عقد الثمار غزيرًا.



الشكل (١-١٠): طبيعة الحمل في الكمثرى.

● المناخ: تمتاز أشجار الكمثرى باحتياجاتها الحرارية العالية، وبخاصة الأصناف المتأخر نضجها، وتفتح أزهارها في أوائل الربيع قبل أن تفتح أزهار التفاح، مما يجعلها أكثر عرضة للصقيع، وتحمل أشجارها الجفاف أكثر من التفاح، وبخاصة المطعمة على أصل بذري، وتبلغ احتياجاتها من ساعات البرودة ٢٠٠-١٢٠٠، وذلك حسب الصنف، لكسر طور السكون الشتوي.

٤٩

وتناقشه مع الطلبة.

- المجموعة الثالثة: تفسر تأثير أزهار الكمثرى بالصقيع أكثر من أزهار التفاح، وتحمل أشجار الكمثرى، وبخاصة المطعمة على أصل بذري الجفاف أكثر من التفاح، ثم يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي. ● الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى. ● يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.



## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

- تكليف بعض الطلبة استخدام برمجية العروض التقديمية، تصميم عرض تقديمي عن طبائع الإزهار والإثمار في الكمثرى.
- يوجه بعض الطلبة إلى البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن حلول لمعالجة عدم التوافق بين أصل السفرجل وبعض أصناف الكمثرى، ثم يعرض نتائج البحث على زملائهم.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: قائمة رصد (١-٢٤)
- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير لفظي (١-٢٥)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- George, A. Cquaah. Horticulture Principles and practices. Pearson Prentice Hall. 2005

- سلام أيوب، الدليل الفني لتطعيم الأشجار المثمرة، المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٦م.

#### للطالب

- التربة: تحتاج أشجار الكمثرى إلى أراضٍ عميقة وخصبة، جيدة الصرف والتهوية، وعدمية القلوية أو قليتها، ويمكنها تحمل الأراضي الكلسية.
- التكثير: يمكن تطعيم أصناف الكمثرى على أي من الأصول الآتية، مع مراعاة وجود حالات من عدم التوافق بين بعض هذه الأصول وبعض أصناف الكمثرى.
  1. أصل كمثرى بذري: تؤخذ البذور من أصناف معينة من الكمثرى، مثل صنف (Winter Nelis)، أو صنف (Kirschen Saller) لإنتاج هذا الأصل. والأشجار المطعمة على هذا الأصل قوية ومعمرة إلا أنها تبلغ سن الإثمار في وقت متأخر نسبياً.
  2. أصل هجين (OHF 333): نتج هذا الأصل من التلقيح الخلطي بين الصنفين (Home x Farmingdale Old)، وهو يعد من الأصول شبه المقزّمة، ويمتاز بتوافقه مع أصناف الكمثرى جميعها، ومقاومته للفحة النارية، ومرض تدهور الكمثرى، وتحمله وجود الكلس.
  3. أصل زعرور: يعد من الأصول المقزّمة، ويتحمل نسبة عالية من الكلس في التربة.
  4. أصل سفرجل: يعد هذا الأصل من الأصول المقزّمة نسبياً، وبخاصة عند مقارنته بالأصل البذري، وتبلغ الأشجار المطعمة عليه سن الإثمار في وقت مبكر، إلا أنه حساس لوجود الكلس في التربة، وتتجلى هذه الحساسية بظهور نقص عنصر الحديد على أشجار الأصناف المطعمة عليه، وهناك حالات عدم توافق بين هذا الأصل وبعض أصناف الكمثرى، مثل: صنف ويليامز (Williams) أو بارتلت، وبوسك (Bosc)، ووتر نيلز (Winter Nelis).

### فكر

كيف نحل مشكلة عدم التوافق بين أصل السفرجل وأصناف الكمثرى بارتلت وبوسك (Bosc)، ووتر نيلز (Winter Nelis)؟

في هذه الحالة، يجب إجراء التركيب المزدوج، وذلك بتطعيم أصل السفرجل بالكمثرى المسماة أولد هوم، أو هاردي، ثم تطعيم هذين الأخيرين بصنف الكمثرى المطلوب.

➤ مسافات الزراعة: تختلف مسافات الزراعة حسب الأصل المستخدم، إذ تقصر عند استخدام أصل سفرجل، أو أصل (OHF)، لتصل إلى (٤x٤ م) بالطريقة المربعة،

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يصف عمليات الخدمة اللازمة لبساتين الكمثرى.
- يتعرف أكثر الآفات شيوعاً في بساتين الكمثرى.
- يتعرف أهم أصناف الكمثرى الموجودة في الأردن.
- يصف عمليتي نضج ثمار الكمثرى وجنيها.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بتنفيذ المعلم جلسة مناقشة عامة عن عمليات خدمة بساتين الكمثرى. ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: هل تشابه عمليات خدمة بساتين الكمثرى وخدمة بساتين التفاح؟ هل يوجد اختلاف في عمليات خدمة بساتين الكمثرى وخدمة بساتين التفاح؟ لماذا لا تجرى لثمار الكمثرى عمليات الخف؟ مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للحصة بتنفيذ المعلم جلسة مناقشة عامة عن أبرز الآفات شيوعاً في بساتين الكمثرى، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما أكثر الأمراض شيوعاً في بساتين الكمثرى؟ ما أكثر الحشرات التي تهاجم أشجار الكمثرى؟ مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## التعلم التعاوني/ العمل الجماعي

- لتعرف أصناف الكمثرى، يعرض المعلم الشكل (١-١١)، ثم يكلف الطلبة ضمن المجموعات ما يأتي:

- المجموعة الأولى: تدرس صنف (ولياميز)، أو (بارتلت) من حيث: طبيعة نموّ الشجرة، حجم الثمار، لونها عند النضج، موعد نضجها، الحاجه إلى ملقح، توافق هذين الصنفين مع أصل السفرجل.
- المجموعة الثانية: تدرس صنف (كونفرانس) من حيث: حجم الشجرة، حجم الثمار، لون الثمار عند النضج، موعد نضجها، توافق هذا الصنف مع أصل السفرجل.
- المجموعة الثالثة: تدرس صنف كوشيا من حيث: طبيعة نموّ الشجرة، حجم الثمار، لون الثمار عند النضج، موعد النضج، الحاجة إلى ملقح.
- المجموعة الرابعة: تكلف تنفيذ قضية المناقشة الآتية: لو زارك أحد المزارعين وأخبرك عن رغبته في زراعة بستان كمثرى يشمل صنفاً واحداً فقط، فبماذا تنصحه؟

وتزداد لتصبح (٥-٦ م x ٦-٧ م) بالطريقة المستطيلة عند استخدام أصول الكمثرى البذرية.

١. عمليات الخدمة: تشابه عمليات خدمة بساتين الكمثرى والتفاح، إلا أن الكمثرى لا تجرى لثمارها عمليات خفّ.

٢. الآفات: تتعرض أشجار الكمثرى في مراحل نموها المختلفة للإصابة بالعديد من الآفات، منها: المنّ، وحفّار الساق، وبسبب الكمثرى، ودودة الثمار، وثاقبة البراعم، واللفحة النارية، وتدهور الكمثرى، والجرب.

٣. الأصناف: كما في الشكل (١-١١): للكمثرى أصناف عديدة، أهمها:

١. وليامز، أو بارتلت (Williams أو Bartlett): الشجرة قائمة نسبياً، ثمارها متوسطة إلى كبيرة الحجم، وسطحها الخارجي غير منتظم، لونها عند النضج أصفر عليه وجنة حمراء، والجزء اللّحمي من الثمرة صلب، حلو المذاق، عصري، وله طعم مميز، ويصلح للاستهلاك الطازج والتعليب، ينضج في شهر آب، ويحتاج إلى ملقح، ولا يتوافق مع أصل السفرجل.

٢. كونفرانس (Conference): شجرته متوسطة النمو، ويتوافق مع أصل السفرجل، وثمرته متوسطة إلى كبيرة الحجم، لونها أصفر مع بقع بنية تشبه الصدا، مما يجعلها غير مرغوبة في أسواق الشرق الأوسط، تنضج ثمارها في شهر آب-أيلول، وتحتاج إلى ملقح.

٣. صنف كوشيا (Coscia): شجرته قائمة النمو، وثمرته متوسطة الحجم، ولونها أصفر، تنضج في شهر تموز، ويتمتع هذا الصنف بقدر معين من الخصوبة الذاتية.

٥١

- المجموعة الخامسة: تكلف الإجابة عن السؤال الآتي: لو أعطيت قطعة أرض في منطقة معينة تحتوي أشجار صنوبر برية، وزعروراً، وبلوطاً، فأَيّ هذه الأنواع يمكن الاستفادة منها في إنشاء بستان كمثرى في تلك القطعة؟

## التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للحصة بتنفيذ المعلم جلسة مناقشة عامة عن عمليتي نضج ثمار الكمثرى وجنيها، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ماذا تُسمّى عملية حدوث تغييرات فسيولوجية وكيميائية داخل الثمرة التي اكتمل نموها؟ ما المقصود بنضج الثمرة؟ متى تقطف ثمار الكمثرى؟ لماذا تقطف ثمار الكمثرى بعد وصولها إلى مرحلة النضج مع أنها تكون صلبة قاسية؟ أين يستكمل نضج ثمار الكمثرى؟ حدّد درجة الحرارة، والنسبة المئوية والرطوبة اللازم توافرها في المخازن في أثناء الإنضاج؟ ما درجة الحرارة والرطوبة النسبية التي تُحفظ بها ثمار الكمثرى المقطوفة بعد وصولها إلى مرحلة النضج وقبل استكمال إنضاجها؟ كم شهراً يمكن تخزين ثمار الكمثرى المقطوفة بعد وصولها إلى مرحلة النضج وقبل استكمال إنضاجها؟ مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

- تكليف الطلبة، تصميم عرض تقديمي من عشر شرائح عن أكثر الآفات شيوعاً في بساتين الكمثرى باستخدام برمجية العروض التقديمية.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: سجل وصف سير التعلم (١-٢٦)
- استراتيجية التقويم: الملاحظة
- أداة التقويم: السجل القصصي (١-٢٧)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

- كتاب الإنتاج النباتي - المستوى الأول.

## مصادر التعلم

### للمعلم

- خليل جرن، دليل المرشد الزراعي في تربية وتقليم الأشجار المثمرة، مديرية الإرشاد الزراعي، عمان، ٢٠٠٧م.

### للطالب

- عواد حسين، ماجدة بهجت، الخصائص العامة للحاصلات البستانية بعد الحصاد وعلاقتها بالتكنولوجيا المستخدمة في التداول بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية ستامفورد آنكتكت - الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٧م.



كوشيا

كونفرانس



بارتل

الشكل (١-١١): بعض أصناف الكمثرى.

### قضية للمناقشة

لو زارك أحد المزارعين وأخبرك عن رغبتة في زراعة بساتن كمثرى بشمل صنفاً واحداً فقط، فما رأيك في ذلك؟ ناقش ذلك مع زملائك.

لو أعطيت قطعة أرض تحتوي أشجار صنوبر بري، وزعرور، وبُلوط، فأَي هذه الأنواع يمكن الاستفادة منه في إنشاء بساتن كمثرى في تلك القطعة؟

فكر

٥٢

النضج والجني: تقطف ثمار الكمثرى وهي صلبة قاسية، بعد وصولها إلى مرحلة النضج، ثم يستكمل نضجها في مخازن درجة حرارتها (٢٠-٢١°)، ورطوبة ٨٥٪/مدة (١٠-١٢) يوماً، ويجب مراعاة عدم ارتفاع الحرارة في أثناء مدة النضج؛ حتى لا يؤثر ذلك في مظهر الثمار ونكهتها. ويمكن تخزين ثمار الكمثرى المقطوفة بعد وصولها إلى مرحلة النضج، وقبل أن يستكمل نضجها، وفي هذه الحالة تحفظ في وسط درجة حرارته (-١°)، ورطوبته (٩٠-٩٥٪) مدة تتراوح بين (٣-٤) أشهر، وبعد ذلك يمكن إنضاج الثمار كما ذكر سابقاً.

٥٣

## النتائج الخاصة

- يصف الإزهار والإثمار في السفرجل.
- يحدد الاحتياجات المناخية لأشجار السفرجل.
- يصف التربة الملائمة لنمو وإنتاج السفرجل.
- يتعرف طرق تكثير السفرجل.
- يتعرف مسافات الزراعة المناسبة للسفرجل
- يصف عمليات الخدمة اللازمة لبساتين السفرجل
- يتعرف أكثر الآفات شيوعاً في بساتين السفرجل.
- يتعرف أهم أصناف السفرجل الموجودة في الأردن.
- يصف عمليتي نضج ثمار السفرجل وجنيها.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس باستشارة خبرات الطلبة السابقة وطرح الأسئلة الآتية: ما الفصيلة التي يتبع لها السفرجل؟ ما اسم الجنس الذي تتبع أصناف السفرجل له؟ ما اسم النوع الذي تتبع أصناف السفرجل له؟ ما الاسم العلمي للسفرجل؟ مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرف طبائع الإزهار والإثمار في السفرجل يعرض المعلم الشكل (١-١٢)، ثم يقسم الطلاب إلى أربع مجموعات، كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تحدد مكان حمل البراعم الثمرية في السفرجل وتوضح المقصود بحمل البراعم الثمرية قميًا في نهاية طرود ثمرية قصيرة أو طويلة عمرها سنة واحدة.
- المجموعة الثانية: تصف أزهار التفاح وتحدد نوع البراعم الثمرية في السفرجل.
- المجموعة الثالثة: تقارن بين البراعم الثمرية في السفرجل وكل من التفاح والكمثرى.
- المجموعة الرابعة: تعقد مقارنة بين طبائع الحمل والإزهار في كل من السفرجل والتفاح، وطبائع الحمل والإزهار في كل من السفرجل والكمثرى، وتعرض ما تتوصل إليه وتناقشه مع الطلبة. يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

## التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بتنفيذ المعلم جلسة مناقشة عامة عن كل من الاحتياجات المناخية الملائمة لأشجار السفرجل، والتربة الملائمة لنموه وإنتاجه، وطرق تكثيره، وعمليات الخدمة اللازمة له، والآفات التي تصيبه. ويمكن توجيه الأسئلة الآتية:

ملحق أدوات التقويم (١-٢٨)، (١-٢٩).

## الملاحق

## السفرجل: Quince

اسمه العلمي (*Cydonia Oblonga Mill*)

يتبع السفرجل الفصيلة الوردية والجنس (*Cydonia*) الذي يشمل نوعاً واحداً هو السفرجل. الإزهار والإثمار، كما في الشكل (١-١٢): تحمل البراعم الثمرية في السفرجل قميًا في نهاية طرود ثمرية قصيرة، أو طويلة، عمرها سنة واحدة، ويعطي البرعم زهرة واحدة كبيرة نسيبًا، لونها يميل إلى الزهري، ويحمل عددًا من الأوراق، ويعود هذا إلى كون البرعم الثمري في السفرجل من النوع المختلط. والبراعم الثمرية في السفرجل أصغر منها في كل من التفاح والكمثرى، وأزهار السفرجل الذاتية التلقيح.

## نشاط (١-٣)

اعقد مقارنة بين التفاح، والكمثرى، والسفرجل، من حيث طبائع الحمل والإزهار، واعرض ما تتوصل إليه، وناقشه مع زملائك.




(١-١٢): الإزهار والإثمار.

المناخ: تقل احتياجات أشجار السفرجل من البرودة في أثناء الشتاء إذا ما قورنت بمجموعة أصناف التفاح والكمثرى، وهي قادرة على الإنتاج حتى في المناطق ذات الشتاء الدافئ، وتعد أشجار السفرجل أكثر حساسية للبرد من أشجار التفاح والكمثرى، أما أزهاره فهي أقل عرضة لضرر الصقيع المتأخر؛ لأنها تحمل طريقتًا على النموات الحديثة، ويتأخر ظهورها نسبيًا.

٥٤

ب. باين أبل (Pineapple): من أصناف المجموعة التفاحية، ثماره كبيرة، ولونها أصفر فاتح، والجزء اللحمي منها أبيض اللون وطري، ونكهته مميزة تشبه نكهة الأناناس.



شامبيون

باين أبل الشكل (١-١٣): الأصناف في السفرجل.

النضج والجني: تقطف ثمار السفرجل متأخرة في فصل الخريف، بعد أن يتغير لون قشرة الثمرة من الأخضر إلى الأصفر، وتظهر الرائحة المميزة للثمار.

٥٦

- قارن بين احتياجات أصناف السفرجل إلى البرودة ومجموعة أصناف التفاح والكمثرى؟ فسر إنتاج السفرجل في المناطق ذات الشتاء الدافئ. تعد أشجار السفرجل أكثر حساسية للبرد من أشجار التفاح والكمثرى، أما أزهار السفرجل فهي أقل عرضة لضرر الصقيع المتأخر مقارنة بإزهار التفاح والكمثرى، فسر ذلك. حدد احتياجات أشجار السفرجل من البرودة في أثناء الشتاء. ما خصائص التربة الملائمة لنمو



## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: القلم والورقة
- أداة التقويم: اختبار (١-٢٨)
- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٢٩)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

- ملك أبو زينة وآخرون، دليل المواصفات القياسية الأردنية للفاكهة الطازجة، وزارة الزراعة، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.
- محمد البدور، مسنات الحيارى، تقدير خسائر فاقد ما بعد الحصاد لبعض محاصيل الخضار والفواكه، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.
- رابنداران طاغور، بديع حقي (مترجم)، جني الثمار، دار العلم للملايين، بيروت، ٢٠٠٠م.

### للطالب

- ١- التربة: ينمو السفرجل في أنواع عديدة من الأراضي، إلا أنه حساس جداً للملوحة والتربة الكلسية، وتظهر عليه أعراض نقص الحديد في الأراضي الكلسية، وتحمل أشجار السفرجل الأراضي الرطبة نسبياً.
- ٢- التكاثر: لا يوجد تنوع كبير في الأصول التي يمكن تطعيم السفرجل عليها، وغالباً ما تطعم أصناف السفرجل التجارية على أصل سفرجل يكثر خضرياً بوساطة العقل الساقية، أو السرطانات، أو الترقيد، الهرمي، ويعد أصل (Malling A) أكثر الأصول استعمالاً في المشتال.
- ٣- مسافات الزراعة: مسافات الزراعة في بساتين السفرجل ٣×٣ م، أو ٤×٤ م، أو ٤×٤ م (بحيث تكون المسافة بين الشجرة الواحدة وجاراتها في الخط الواحد ٤ م، والمسافة بين خطين متجاورين بين ٤-٥ م).
- ٤- عمليات الخدمة: تُجرى عمليات خدمة بساتين السفرجل كما ذكر في بساتين الكمثرى و التفاح. ويجب مراعاة خفّ الثمار يدوياً لتحسين حجمها، وذلك بعد أسبوع إلى أسبوعين من عقدتها.
- ٥- الآفات: تتعرض أشجار السفرجل في مراحل نموها المختلفة للإصابة بالعديد من الآفات، منها: حفّار ساق التفاح، ودودة ثمار التفاح، واللّفحة النارية.
- ٦- الأصناف: كما في الشكل (١-١٣): تقسم أصناف السفرجل بناء على شكل الثمرة إلى مجموعتين رئيسيتين، هما:
  ١. مجموعة الأصناف الكمثرية الشكل: أي أن ثمار أصناف هذه المجموعة تأخذ شكل الكمثرى، وتمتاز بطراوة جزئها اللحمي، وقلة عدد الخلايا الحجرية التي تتخلله.
  ٢. مجموعة الأصناف التفاحية الشكل: أي أن ثمار أصناف هذه المجموعة تأخذ شكل التفاحة، وتمتاز بجفاف الجزء اللحمي وصلابته، ولها نكهة أقوى من نكهة أصناف المجموعة الأولى.
 وفي ما يأتي وصف لأهم أصناف السفرجل:
  - أ. شامبيون (Champion): من أصناف المجموعة الكمثرية، ثماره كبيرة منتظمة الشكل، ولونها ليموني أصفر، ولها طعم جيد، وأشجاره ذات حجم متوسط؛ مما يشجع الأشجار على دخول مرحلة الإثمار في وقت مبكر.

٥٥

## التقويم

- ١ - وضع المقصود بكلّ مما يأتي:
  - أ - دائرة ثمرية.
  - ب - ثمار زهري.
  - ج - برعم مختلط.
- ٢ - وضع العوامل التي تؤثر في تحديد مسافات الزراعة عند غرس أشجار التفاح.
- ٣ - قارن بين أصلي التفاح: M9، وMM106، من حيث:
  - أ - تقزيمهما للطعم.
  - ب - الإصابة بمرض التعفن التاجي.
  - ج - الإصابة بحشرة المنّ القطني.
  - د - مسافات الزراعة المناسبة.
- ٤ - لا ضرورة لحفّ ثمار الكمثرى، في حين يجب خفّ ثمار التفاح. ناقش هذا القول.
- ٥ - ماذا نقصد بالتركيب المزدوج؟ ولم نلجأ إليه لتركيب الكمثرى أحياناً؟
- ٦ - اذكر ثلاثة أصول يمكن استخدامها لتركيب الكمثرى عليها.
- ٧ - كيف يمكنك تكثير السفرجل؟
- ٨ - علّل ما يأتي:
  - أ - مع أن نسبة احتياجات التفاح الشديد للبرودة كبيرة جداً إلا أننا نرى اليوم بساتين تفاح منتجة في منطقة الأغوار.
  - ب - أزهار السفرجل أقل تأثراً من أزهار التفاح أو الكمثرى بانخفاض درجات الحرارة.
  - ٩ - عند زيارتك لبستان تفاح مثمر، لاحظت أن إنتاجه قليل جداً، فما الفرضيات التي تضعها لتفسير ذلك؟ وما الحلول التي تقترحها؟
  - ١٠ - قارن بين التفاح والسفرجل، من حيث:
    - أ - طبيعة الإزهار والإثمار.
    - ب - الاحتياجات السنوية للبرودة.

٥٧

السفرجل وإنتاجه؟ ما مسافات الزراعة اللازم توفيرها في بساتين السفرجل؟ ما تأثير الملوحة والتربة الكلسية في أشجار السفرجل؟ لماذا لا يتحمل السفرجل التربة الكلسية؟ ما العنصر الذي تظهر أعراض نقصه في الأراضي الكلسية؟ ما أكثر الأصول استعمالاً في تطعيم أصناف السفرجل التجارية؟ ما طرق إكثار أصل السفرجل خضرياً؟

- مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## النتائج الخاصة

- يجهز النبات للتكثير بالترقيد الهرمي.
- يجري عملية الترقيد الهرمي.
- تصف نباتات التفاحيات نباتياً.
- يحدد طبائع الإزهار والإثمار.
- يميز التفاحيات نباتياً.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- يطبق الطلبة إجراءات (خطوات) التمرين (٣-١) باستخدام المواد والأدوات والتجهيزات بإشراف المعلم، متبعين الخطوات نفسها التي قام بها المعلم، ثم يتابعهم المعلم ويوجههم ويقوم أداءهم.

## التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل؛ كي يقوموا بتنفيذ خطوات التمرين (٤-١)، كما يأتي:
- تفحص أشجار التفاح وملاحظة ما يأتي:
- الأوراق: ما هيئة الأوراق على الساق؟ بسيطة أم مركبة؟ صف شكلها، وحافاتهما، وقمتها، ماذا يوجد على سطحها السفلي؟
- الدواير الثمرية: حجم الدواير، البرعم الطرفي في الدائرة أو الفرع.
- النورة: نوعها، عدد الزهيرات فيها. الزهرة: نوعها، عدد السبلات والبتلان. الثمرة: شكلها، لونها، نوع الثمرة. تكليف طلبة المجموعة عمل مقطع عرضي لثمار التفاح وتعرف أجزائها.
- رسم الأجزاء النباتية لأشجار التفاح التي تفحصوها، وتدوين ملحوظاتهم في دفتر التدريب العملي.

## تكثير التفاحيات بالترقيد الهرمي

التمرين  
(٣-١)

## التشاحات

- يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادراً على أن:
- تجهز النبات من أجل تكثيره بالترقيد الهرمي.
- تجري عملية الترقيد الهرمي.
- تفصل النباتات الجديدة عن الأمهات، وترعها.

## المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

\* أمهات تفاح أو كمثرى، \* مجرفة، \* منشار، \* مقص تقليم.

## الرسوم التوضيحية



(١)



(٢)

الشكل (١): الترقيد الهرمي

## خطوات العمل والنقاط الحاكمة

- ١- اقطع ساق الشجرة الأم على ارتفاع (١٥-٢٠ سم) في أواخر فصل الشتاء، انظر الشكل (١).
- ٢- كوّم تراباً رطباً حول ما تبقى من ساق الأم، انظر الشكل (١).
- ٣- استمر في تكويم التراب الرطب كلما طالت الفروع النامية حول ساق الأم، انظر الشكل (٢).
- ٤- حافظ على رطوبة التربة حول الساق.
- ٥- أفضل الترقيد عن الأمهات في فصل الشتاء التالي بعد أن تكون قد كوّنت جذوراً.

## التقويم

- ١- بماذا يمتاز الترقيد الهرمي عن غيره من أنواع الترقيد الأخرى؟
- ٢- لماذا يجب الاستمرار في تكويم التراب الرطب كلما طالت الفروع النامية حول ساق الأم؟
- ٣- متى تفصل النباتات الجديدة عن الأم؟

٥٨

## ٢- الكمثرى:



الشكل (٢): دائرة كمثرى.

- أ - الأوراق: ما ترتيب الأوراق على الساق؟ وهل هي بسيطة أم مركبة؟ وما شكلها، وحافاتهما؟ بماذا تختلف عن أوراق التفاح؟
- ب- الدواير الثمرية: كما في الشكل (٢)، تشبه دواير التفاح.
- ج- النورة: غير محدودة النمو (راسمية)، أي أن الأزهار القاعدية تفتح أولاً، ما عدد زهيرات النورة الواحدة؟
- د - الزهرة: تركيب الزهرة يشبه تركيب زهرة التفاح.
- هـ- الثمرة: لاحظ اختلاف شكلها، ولونها، حسب الصنف، وأنها ثمرة كاذبة غير حقيقية.

## ٣- السفرجل:



الشكل (٣): برعم سفرجل.

- أ - الأوراق: تفحص وضعها، وشكلها، وملمسها، وحافاتهما، بماذا تختلف عن أوراق التفاح والكمثرى؟ قارن بين كمية الزغب الموجود على السطح السفلي للأوراق في كل من السفرجل والتفاح.
  - ب- البراعم، كما في الشكل (٣): البرعم الطرفي يتفتح عنه نمو خضري طوله يتراوح بين ١٠-١٥ سم، وينتهي بزهرة واحدة.
  - ج- الزهرة: تشبه أزهار التفاح والكمثرى من حيث التركيب.
  - د - الثمرة: شكلها مستدير بيضاوي، وهي ثمرة كاذبة غير حقيقية، قارن بين حجمها وحجم ثمار التفاح والكمثرى.
- ثانياً: اعمل مقطعاً عرضياً في ثمار كل من التفاح والكمثرى، والسفرجل، وتعرف أجزائها.

٦٠



### مراعاة الضروقات الفردية

#### علاج

#### إثراء

- تكليف مجموعة من الطلبة ما يأتي:
- تكثير نباتات محددة بطريقة الترقيد الهرمي، وبالاستعانة بما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوفرة.
- عمل مقطع عرضي في ثمار كل من التفاح والكمثرى والسفرجل، وتعرّف أجزائها.
- رسم الأجزاء النباتية التي تعرفوها لأشجار التفاح، وتدوين أسمائها.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٣٠)
- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٣١)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- حسين العروسي، المملكة النباتية، مكتبة الإسكندرية، ١٩٩٩ م.
- حسين محمد العروسي، النبات العام، مكتبة المعارف، ٢٠٠٠ م
- محمود محمد جبر وآخرون، أساسيات علم النبات العام: الشكل الظاهري، والتركييب التشريحي، تقسيم المملكة النباتية، وظائف أعضاء النبات، ط ١، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠١ م.

#### للطالب

- حسين العروسي، الأطلس النباتي، مكتبة الإسكندرية، ٢٠٠١ م

التمارين (١-٤)	التساؤلات
	يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن: - تصف نباتات التفاحيات نباتيًا. - تحدد طبائع الإزهار والثمار. - تميز التفاحيات نباتيًا.
	المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات * أشجار. * تفاح. * كمثرى. * سفرجل. * سكين.
الرسوم التوضيحية	خطوات العمل والنقاط الحاكمة
	أولاً: تفحص أجزاء النبات الموجودة أمامك، ولاحظ ما يأتي: ١- التفاح: أ - الأوراق: ما نظام توزيع الأوراق على الساق؟ وهل هي بسيطة أم مركبة؟ وما شكلها، وكيف تكون حافاتها؟ هل هي مستدقة القمة؟ انظر السطح السفلي للأوراق، ماذا يوجد عليه؟ ب- الدوايسر الثمرية، كما في الشكل (١)، قصيرة، والبرعم الطرفي في الدائرة أو الفرع المثمر مختلط. ج- النورة: محدودة النمو (سيميئة)، أي أن الزهرة الوسطى تفتح أولاً، ما عدد الزهيرات فيها؟ د - الزهرة: خنثى، وتتكون من خمس سبلات وخمس بتلات، وعدد كبير من الأسدية، ومبيض واحد. هـ- الثمرة: لاحظ اختلاف شكلها، ولونها، حسب الصنف، وأنها ثمرة كاذبة غير حقيقية.
الشكل (١): دائرة تفاح.	

#### التقويم

- ١- ارسم في دفترك رسماً توضيحياً بين الأجزاء النباتية لأشجار التفاح، والكمثرى، والسفرجل التي تفحصتها، وسجل الأجزاء على الرسم.
- ٢- لماذا تسمى ثمرة التفاحيات ثمرة كاذبة؟
- ٣- ما نوع كل من الزهرة والثمرة في الكمثرى؟
- ٤- ما الفرق بين السفرجل والتفاح، من حيث طبيعة حمل الثمار؟

يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:  
- تقلم أشجار التفاحيات تقليمًا إثمريًا

المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

أشجار. \* تفاح. \* كمثرى. \* سفرجل. \* سكين.

الرسوم التوضيحية

خطوات العمل والنقاط الحاسمة

أولًا: قلم نباتات التفاح، والكمثرى، كما في الشكل (١)، تقليمًا خفيفًا، على النحو الآتي:  
١- أزل الفروع الجافة والمكسورة.  
٢- أزل الفروع المتشابكة؛ لتكوين دوائر ثمرية جديدة.  
٣- تخلص من الدوائر الثمرية الكبيرة، وذلك بإزالة الفروع التي تحملها، انظر الشكل (١).  
٤- أزل السرطانات التي تنمو قريبًا من سطح التربة.  
٥- أزل الأفرخ المائية، أما إذا كان موقعها مناسبًا فقصرها.



الشكل (١)

تمرين (٥-١): تقليم التفاحيات تقليمًا إثمريًا  
تمرين (٦-١): جني ثمار التفاحيات

النتائج الخاصة

- يقلم نباتات التفاحيات إثمريًا.
- يحدد علامات نضج ثمار التفاحيات.
- يجني ثمار التفاحيات.

المفاهيم والمصطلحات

السلامة المهنية

استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل، ثم ينفذ الطلبة (خطوات) التمرين (٥-١) كما يأتي:

- المجموعة الأولى: تقلم نباتات التفاح تقليمًا إثمريًا كما يأتي:  
■ إزالة الفروع الجافة والمكسورة.

- إزالة الفروع المتشابكة لتكوين دوائر ثمرية جديدة.
- التخلص من الدوائر الثمرية الكبيرة، وذلك بإزالة الفروع التي تحملها.
- إزالة السرطانات التي تنمو قريبًا من سطح التربة.

- المجموعة الثانية: تقلم نباتات الكمثرى تقليمًا إثمريًا كما يأتي:  
■ إزالة الفروع الجافة والمكسورة.

- إزالة الفروع المتشابكة لتكوين دوائر ثمرية جديدة.
- التخلص من الدوائر الثمرية الكبيرة، وذلك بإزالة الفروع التي تحملها.
- إزالة السرطانات التي تنمو قريبًا من سطح التربة.

- المجموعة الثالثة: تقلم نباتات السفرجل تقليمًا إثمريًا كما يأتي:  
■ إزالة الفروع المريضة والجافة والمكسورة.

- تجري عملية الخف لبعض الأغصان؛ للتحكم في عدد الثمار الناتجة.
- تقصر الفروع الأخرى (تقليم تقصير) لتشجيع التفرع الجانبي.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.

التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- ينفذ الطلبة خطوات التمرين (٦-١) بإشراف المعلم مستخدمين المواد والأدوات اللازمة وفق الخطوات المبينة في التمرين.

جني ثمار التفاحيات

يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:  
- تحدد علامات نضج ثمار التفاحيات.  
- تجني ثمار التفاحيات.

المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

\* مقص. \* أكياس جمع الثمار. \* صناديق التعبئة. \* أشجار تفاح. \* كمثرى. \* سفرجل.


الرسوم التوضيحية

خطوات العمل والنقاط الحاسمة

أولًا: جني ثمار التفاح والكمثرى كما يأتي:

١- حدد مواعيد النضج باستخدام معايير النضج.  
٢- ضع كيس جمع الثمار على صدرك، بحيث يكون الجزء الحامل وراء الرقبة.  
٣- أمسك الثمرة براحة اليد، ثم لفها بيمينًا، ويسارًا، مرة واحدة مع الشد الجانبي، وتجنب سحبها أو شدّها إلى الأسفل، واحذر إحداث أيّ ضرر للدوائر، انظر الشكل (١).

٤- ضع الثمار بعد قطفها في صناديق، ومكان ظليل حفظًا عليها من أشعة الشمس المباشرة، انظر الشكل (٢).



الشكل (١): جني ثمار التفاح.



الشكل (٢): تعبئة الثمار في الصناديق.

إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الضرووق الفردية

#### علاج

#### إثراء

- تكليف بعض الطلبة ما يأتي: تقليم كل من التفاح، والسفرجل، والكمثرى، تقليماً إثمارياً بوساطة الأدوات والتجهيزات المتوفرة.
- قطف ثمار التفاح، والسفرجل، والكمثرى، يدوياً بطريقة صحيحة، باستخدام مايلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوفرة.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٣٢)
- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٣٣)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

- كتاب الإنتاج النباتي - المستوى الثاني.

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- فهمي شتات وآخرون، أشجار الفاكهة، ط ٢، جامعة القدس المفتوحة، عمان الأردن، ٢٠٠٦ م.

- Eagle Wood Cliffs، plant Science، Growth Dvelopment، Utilization of Cultivated Plant New Jersey: Printice-Hall Inc. 1991

#### للطالب

- فهمي شتات، بساتين التفاحيات واللوزيات والعب والزيتون، وزارة الزراعة، عمان، ١٩٩٥ م.



الشكل (٢)

- ثانياً: قلم نباتات السفرجل كما يأتي:
- ١- أزل الفروع المريضة، والجافة، والمكسورة.
  - ٢- أجر عملية الحنف لبعض الأغصان؛ للتحكم في عدد الثمار الناتجة، كما في الشكل (٢).
  - ٣- قصر الفروع الأخرى (تقليم تقصير)؛ لتشجيع التفرع الجانبي.

#### التقويم

- ١- اذكر الأسس التي تعتمدها في تقليم التفاح.
- ٢- لماذا تقصر بعض فروع السفرجل؟

٦٣



الشكل (٣): فرز الثمار

- ٥- افرز الثمار المصابة أو المعطوبة أو المشوهة، ولا تضعها في الصندوق، انظر الشكل (٣).
  - ٦- عتني الثمار بحيث تكون حافة الصناديق أعلى من مستوى الثمار، كما في الشكل (٤).
- ثانياً: جني ثمار السفرجل:  
اقطف ثمار السفرجل عندما تنضج باستخدام المقص.



الشكل (٤): تعبئة الثمار في الصناديق

#### التقويم

- ١- ما معايير نضج ثمار كل من التفاح، والكمثرى، والسفرجل؟
- ٢- علّل:
  - أ - يجب عدم ضغط ثمار التفاح في صناديق التعبئة.
  - ب- تفرز الثمار المصابة، والمعطوبة، والمشوهة، ولا توضع في الصناديق.
  - ٣- ما أهمية استخدام كيس جمع الثمار؟

٦٥

## النتائج الخاصة

- يتعرّف الأنواع التي تشملها الحمضيات.
- يفسر سبب تسمية الحمضيات بهذا الاسم.
- يصف طبائع الإزهار والإثمار في الحمضيات.
- يوضح مفهومي النورة الورقية، والنورة غير الورقية.
- يقارن بين النورات الورقية والنورات غير الورقية في الحمضيات.
- يتعرّف عمليتي التلقيح والإخصاب في الحمضيات.

## المفاهيم والمصطلحات

النورات الورقية، النورات غير الورقية

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بتوظيف خبرات الطلبة السابقة وطرح الأسئلة الآتية:

- لماذا سميت هذه الفاكهة بالحمضيات؟
- ما الأنواع التي تشملها الحمضيات؟ ما اسم الفصيلة التي تنتمي إليها؟
- ما اسم جنس الحمضيات؟
- هل الحمضيات دائمة الخضرة أم متساقطة الأوراق؟ أين تنتشر زراعة الحمضيات في الأردن؟
- ما نوع النورات الزهرية في الحمضيات؟ أين تحمل الأزهار في أشجار الحمضيات؟ كيف تميز بين النورات الورقية وغير الورقية في الحمضيات؟
- استعن بالشكل (١-١٤) للإجابة عمّا سبق.
- مناقشة إجابات الطلبة، وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرّف طبائع الإزهار والإثمار في الحمضيات، يعرض المعلم الشكل (١-١٤)، ثم يقسم الطلبة إلى أربع مجموعات كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تدرس الشكل (١-١٤): وتجب عن الأسئلة الآتية:
  - ما نوع النورات الزهرية في الحمضيات؟ أين تحمل الأزهار على أشجار الحمضيات؟ أين تظهر براعم الحمضيات الزهرية؟
- المجموعة الثانية: تدرس الشكل (١-١٤)، وتجب عن الأسئلة الآتية:
  - ما المقصود بالنورات الورقية والنورات غير الورقية في الحمضيات؟ كيف تميز بين النورات الورقية والنورات غير الورقية في الحمضيات؟

التفكير الناقد

- التمهيد للموضوع بتذكير الطلبة بمفهوم التلقيح والإخصاب، ثم توجيه الأسئلة الآتية: هل التلقيح والإخصاب ضروريان لتكوين ثمار الحمضيات؟ بماذا

## ثالثاً الحمضيات

تنتمي الحمضيات إلى الفصيلة السذبية Rutaceae، و جنس الحمضيات Citrus، أشجارها وشجيراتهم دائمة الخضرة، وتنتشر زراعتها في الأغوار؛ وذلك لدفء الجو شتاءً؛ وتوافر مياه الري. ويحسن التمييز بين اسم الجنس (Citrus) (لاحظ الكلمة تبدأ بحرف كبير وتحتها خط) ومحمول الحمضيات (citrus)، لاحظ أن الكلمة تبدأ بحرف صغير وليس تحتها خط؛ لأنّ محصول الحمضيات كلمة عامة تشمل أنواعاً كثيرة تنتمي إلى الجنس (Citrus)، مثل: البرتقال (C. sinensis)، والليمون (C. limon)، والجريب فروت (C. paradisi)، والماندارين (C. reticulata)، والبولي (C. grandis). ويرجع تسمية هذه الفاكهة بالحمضيات إلى طعمها الحمضي الذي يعزى أساساً إلى حمض الستريك.

## الإزهار والإثمار

كما في الشكل (١-١٤): تُحمل الأزهار على أشجار الحمضيات في نورات عنقودية (Short Raceme) إما مفردة، وإما في مجموعات، جانبياً وقيماً على النموات الحديثة (Growth Flush) في الموسم السابق، وعلى النموات الموسمية. وتكون العناقيد الزهرية إما مصحوبة بأوراق (أزهار دفع النمو الأخير)، وإما من دون أوراق (أزهار النموات الموسمية)، وتظهر براعم الحمضيات الزهرية في آباط الأوراق على فروع الدورة السابقة للنمو بعد توقفها عن النمو، وتفتح هذه البراعم الزهرية عن نمّ زهري فقط (زهرة أو أكثر) مكونة ما يعرف بالنورة غير الورقية (Leafless inflorescence)، أو أن البرعم الجانبي في إبط الورقة على نمّ الدورة السابقة يتفتح عن نمّ خضري قصير جداً، ويحمل في آباط أوراقه نورة تُعرف باسم النورة الورقية (Leafy inflorescence).

## مفاهيم

النورة غير الورقية: تفتح البراعم الزهرية عن نمّ زهري فقط (زهرة أو أكثر)، مكونة ما يعرف بالنورة غير الورقية (النورة غير مصحوبة بأوراق).

## مفاهيم

النورة الورقية: تفتح البرعم الجانبي في إبط الورقة على نمّ الدورة السابقة عن نمّ خضري قصير جداً، ويحمل في آباط أوراقه نورة تُعرف باسم النورة الورقية (النورة مصحوبة بأوراق).

تختلف الحمضيات بعضها عن بعض في التلقيح والإخصاب؟ ما الخصائص التي تميز أنواع الحمضيات بعضها عن بعض في التلقيح والإخصاب؟ كيف تميز أنواع الحمضيات بعضها عن بعض في التلقيح والإخصاب؟

- توجيه الطلبة إلى دراسة التلقيح والإخصاب في الحمضيات، وذلك بالبحث في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، أو النشرات الزراعية عن أنواع الحمضيات التي تحتوي ثمارها على بذور، والأنواع التي لا تحتاج إلى تلقيح وإخصاب لتكوين الثمار، لاستنتاج الخصائص التي تميز أنواع الحمضيات بعضها عن بعض.

- إتاحة الفرصة للطلبة لتمييز التلقيح والإخصاب في أنواع الحمضيات المختلفة اعتماداً على الخصائص العامة المشتركة التي لاحظوها في أثناء دراستهم، ومناقشتهم في مضمونها، ثم استنتاج كيفية تمييز التلقيح والإخصاب والإثمار.

### مراعاة الضرووق الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف بعض الطلبة الرجوع إلى أحد كتب البستنة الشجرية المتوافرة في مكتبة المدرسة والبحث عن عمليتي التلقيح والإخصاب في الحمضيات، ثم عرض النتائج.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٣٤)
- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: قائمة رصد (١-٣٥)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

– كتاب الإنتاج النباتي – المستوى الثاني.

### مصادر التعلم

#### للمعلم

– مجلة المهندس الزراعي ، العدد الخاص بالمؤتمر الزراعي الوطني الثاني العددان (٦٩-٧٠)، نقابة المهندسين الزراعيين، عمان، الأردن ، حزيران، ٢٠٠١م.

George, A. Cquaah. Horticulture Principles and practices. Pearson Prentice Hall. 2005

#### للطالب

– خليل جرن، دليل المزارع السنوي، وزارة الزراعة، عمان، الأردن، ٢٠٠٨م.  
– محمد زين، الموسوعة الزراعية: الفاكهة والأشجار المثمرة، دار الطريق للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٠م.



الشكل (١٤-١): النورات في الحمضيات.

#### نشاط (٤-١)

انظر إلى الشكل (١٤-١)، وقارن بين كل من النورات الورقية والنورات غير الورقية في الحمضيات، واعرض ما تتوصل إليه عن طريق برمجية العروض التقديمية، وناقشه مع زملائك.

#### فكر

عند تفحصك فروع الحمضيات، هل يمكنك تعرّف البراعم الزهرية قبل تفتحها؟

يصعب معرفة البراعم الزهرية قبل تفتحها في الحمضيات، سواء أكانت النورة ورقية أم غير ورقية؛ لأن الأزهار تحمل على النموات الحديثة. ويمكن رؤية الأزهار في البراعم قبل تفتحها بأسبوعين على الأكثر، إذ تتكون البراعم الزهرية بعد توقف نشاط النمو الحديث، والنموات الحديثة تحمل عادة جانبيًا على الفروع التي عمرها سنة واحدة أو سنتان على الأكثر. يبدأ النموايز الزهري في الحمضيات في أواخر كانون الثاني وحتى أواخر شباط، ويستمر البرعم الزهري في تطوره ونموه أسابيع عدّة، ثم تفتح الأزهار بعدها في شهر آذار. التلقيح والإخصاب ضروريان لأنواع الحمضيات التي تحتوي ثمارها على بذور، كالمندلينا والكلمنتينا، والبرتقال البلدي، ويكون تلقيحها ذاتيًا. وهناك بعض الأنواع لا تحتاج إلى تلقيح وإخصاب لتكوين الثمار، كما في برتقال (أبو سرة)، وبرتقال الفلنسيا، لأن الثمار تعقد بكرًا. وثمره الحمضيات مستديرة من نوع خاص تعرف باسم العنبة، تتكون من ثلاثة أجزاء، هي من الخارج إلى الداخل كما يأتي:

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى



## النتائج الخاصة

- يصف ثمار الحمضيات.
- يحدد الاحتياجات المناخية لأشجار الحمضيات.
- يصف التربة الملائمة لنمو وإنتاج الحمضيات.
- يتعرف طرق تكثير الحمضيات.

## المفاهيم والمصطلحات

ثمرة عنب، التطعيم، البذور متعددة الأجنة، التركيب، العقل الساقية، الترقيد.

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي


- لتعرف ثمرة الحمضيات يعرض المعلم الشكل (١-١٥)، ثم يقسم الطلاب إلى مجموعات، ويهيئ البيئة الصفية المناسبة للعمل، كما يأتي:
- المجموعة الأولى تدرس الشكل (١-١٥)، وتصف القشرة الخارجية لثمرة الحمضيات.
- المجموعة الثانية تدرس الشكل (١-١٥)، وتصف الجزء الوسطي لثمرة الحمضيات.
- المجموعة الثالثة تدرس الشكل (١-١٥)، وتصف الجزء الداخلي لثمرة الحمضيات.
- يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي. ● الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.
- التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس: ينفذ المعلم جلسة لمناقشة الاحتياجات المناخية الملائمة لنمو أشجار الحمضيات، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: كيف تقسم أشجار التفاح حسب المناخ الملائم لنموها وإثمارها؟ ما أنسب درجات حرارة لنموها؟ ما أثر ارتفاع درجات الحرارة إلى (٣٨°س)، أو انخفاضها عن (٣°س) في نموها؟ ما أثر انخفاض الرطوبة الجوية في نمو أشجار الحمضيات؟ هل تؤثر الرياح الشديدة والساخنة في الأزهار والثمار؟ ما المناخ الملائم لنمو أشجار الحمضيات وإثمارها؟ مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس: ينفذ المعلم جلسة لمناقشة موضوع التربة الملائمة لنمو الحمضيات وإنتاجها، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما نوع التربة المثلى لأنواع الحمضيات؟ ما خصائص التربة المثلى لأنواع الحمضيات؟ ما مدى توافر التربة المثلى لأنواع الحمضيات في الأردن؟ كيف يمكن حل مشكلة محدودة توافر التربة المثلى لأنواع

- ① القشرة الخارجية (Exocarp): جلدية الملمس، وتختلف في سمكها من نوع إلى آخر، وتحتوي خلايا زيتية.
- ② الجزء الوسطي (Mesocarp): نسيج إسفنجي أبيض يحتوي المواد البكتينية.
- ③ الجزء الداخلي (Endocarp): عصيري ويحتوي أكياس العصير المغلفة بأغشية رقيقة تعرف باسم الأندوكارب، ويبين الشكل (١-١٥) مقطعاً عرضياً في ثمار الحمضيات.



(١-١٥): مقطع عرضي في ثمار الحمضيات.

## ٢ المناخ

تجود زراعة الحمضيات في المناطق المدارية الدافئة شتاءً، وأنسب درجات حرارة لنموها يتراوح بين (٢٥-٣٠°س)، ويقل معدل النمو بارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها، إلى أن يتوقف تماماً عند ٣٨°س ارتفاعاً، أو ١٣°س انخفاضاً، وتتضرر الأشجار إذا ما وصلت درجة الحرارة إلى صفر سلسيوس. أما الرطوبة الجوية فيؤدي انخفاضها إلى الإضرار بنمو أشجار الحمضيات وأزهارها، وبخاصة إذا صادف ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك تضرر الرياح الشديدة والساخنة بالأزهار والثمار، وتؤدي إلى سقوطها.

## مهارات البحث والاتصال

يختلف مدى تأثير درجات الحرارة في أشجار الحمضيات باختلاف الأصناف، ابحث في شبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية عن ذلك، واعرض ما تتوصل إليه عن طريق برمجية العروض التقديمية، وناقشه مع زملائك.

الحمضيات في الأردن؟ لماذا تنجح زراعة الحمضيات في مدى واسع من أنواع التربة؟ ما أفضل رقم حموضة للتربة (PH) يلائم الحمضيات؟ ما أثر الأراضي الشديدة الحموضة والأراضي القلوية في أشجار الحمضيات؟ مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرف طرق تكثير الحمضيات يعرض المعلم أكثر الطرق شيوعاً، ثم يتقسم الطلاب إلى مجموعات ويهيئ البيئة الصفية المناسبة للعمل، كما يأتي:

- المجموعة الأولى: تدرس تكثير الحمضيات بوساطة التطعيم بالعين على أصول بذرية، وتجب عن الأسئلة الآتية: لماذا تعد هذه الطريقة الأكثر انتشاراً؟ ما أصل الحمضيات الأكثر استخداماً في الأردن؟ ما مزاياه؟ ما عيوبه؟ كيف عالجت وزارة الزراعة قابلية إصابة الأصل الأكثر استخداماً في الأردن بمرض التدهور السريع؟
- المجموعة الثانية: تدرس تكثير الحمضيات بوساطة البذور المتعددة الأجنة، وتجب عن الأسئلة الآتية: لماذا يعدّ التكثير بوساطة البذور المتعددة الأجنة من طرق التكثير الخصري؟ ما المقصود بالبذور المتعددة الأجنة؟ كيف تنتج البذور المتعددة الأجنة؟ لماذا لا تحتاج هذه الطريقة إلى تطعيم؟



## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف الطلبة ما يأتي:

- البحث في المصادر المتاحة ( كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن مدى تأثير درجات الحرارة في أشجار الحمضيات باختلاف الأصناف، ثم عرض ما تتوصل إليه ومناقشته مع الطلبة.
- إعداد تقرير يتضمن أثر درجة الحموضة في قدرة عناصر التربة على الامتصاص في بساتين الحمضيات، ثم عرض ما يتوصلون إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٣٦)
- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير لفظي (١-٣٧)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

– كتاب الإنتاج النباتي – المستوى الثاني.

## مصادر التعلم

### للمعلم

### للطالب

- جلال المحتسب، دليل إكثار وتطعيم أشجار الحمضيات، المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٦م.
- سلام أيوب، الدليل الفني لتطعيم الأشجار المثمرة، المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٦م.

## التربة

تنجح زراعة الحمضيات في مدى واسع من أنواع التربة من (الرمالية إلى الطينية)، وذلك يعود إلى توافر الأضواء الملائمة، مثل أصل الليمون الحشن، والليمون البنزهر اللذين تنجح زراعتهما في الأراضي الخفيفة، وأصل السونكي في الأراضي الرملية، وأصل الخشخاش في الأراضي الثقيلة. وأجود أنواع التربة لزراعة الحمضيات هي التربة التي تتصف بأنها متوسطة القوام، العميقة الخصبة، ذات الصرف الجيد، الخالية من الأملاح الضارة. وإن أفضل رقم حموضة للتربة (pH) يلائم الحمضيات هو ما بين (٥-٦)، إذ يكون نمو الجذور ضعيفاً في الأراضي الشديدة الحموضة، أما في الأراضي القلوية فتنبت كثير من عناصر التربة فيها، مما يمنع امتصاصها، فتظهر أعراض نقصها على النباتات، مما يُوجب معالجة هذه الحالة.

### نشاط (١-٥)

اكتب تقريراً تبين فيه أثر درجة الحموضة في جاهزية عناصر التربة للامتصاص في بساتين الحمضيات، ابحث في شبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية عن ذلك، واعرض ما تتوصل إليه، وناقشه مع زملائك.

### طرق التكاثر

يمكن تكثير الحمضيات بطرق عديدة، أهمها:

- **التطعيم بالعنق على أصول بذرية:** هي أكثر الطرق انتشاراً، ويعد أصل الخشخاش الأكثر استخداماً في الأردن، إذ ينمو جيداً في الأراضي الثقيلة والقلوية. وتستطيع جذوره تحمل الغمر في الماء أكثر من أصول الحمضيات الأخرى، إضافة إلى أنه يعدّ أصلاً مقاوماً للجفاف، بسبب تعمق جذوره وانتشارها، وهو أيضاً أصل مقاوم لمرض التصمغ، إلا أنه قابل للإصابة بمرض التدهور السريع. وقد أدخلت وزارة الزراعة العديد من الأصول المقاومة لمرض التدهور السريع، مثل: فولكامارينا، وماندرين الكيلو باتر، وتروير سترانج، غير أن استخدام هذه الأصول لم يلق الاهتمام المطلوب كخشخاش.
- **البذور المتعددة الأجنة:** يعدّ التكاثر بهذه الطريقة من طرق التكاثر الخضري، نظراً إلى أن معظم أصناف الحمضيات تنتج بذوراً متعددة الأجنة، أي أن البذرة الواحدة تحتوي أكثر من جنين (جنين جنسي وأجنة خضرية)، والأجنة الخضرية في البذرة الواحدة تنتج من النسيج الأمي، ولذلك تعطي أشتالاً مشابهة، وهي بذلك لا تحتاج إلى تطعيم.

٦٩

- المجموعة الثالثة: تنفذ النشاط (١-٦)، وتفحص بذرة ليمون أو كلمنتينا، وتحاول فصل الأجنة بعضها عن بعض، ثم تعدّها وتقارن بينها من حيث الحجم.
- المجموعة الرابعة: تدرس تكثير الحمضيات بوساطة التركيب بالقلم، وتجب عن الأسئلة الآتية: ما المقصود بالتكاثر بوساطة التركيب بالقلم؟ لماذا لا تتبّع طريقة التركيب بالقلم تجارياً في تكثير الحمضيات؟
- المجموعة الخامسة: تدرس تكثير الحمضيات بوساطة العقل الساقية المتخشبة، وتجب عن الأسئلة الآتية: ما المقصود بالتكاثر بوساطة العقل الساقية المتخشبة؟ ما أنواع الحمضيات التي يمكن تكثيرها بالعقل الساقية المتخشبة؟
- المجموعة السادسة: تدرس تكثير الحمضيات بوساطة الترقيد الهوائي، وتجب عن الأسئلة الآتية: ما المقصود بالتكاثر بوساطة الترقيد الهوائي؟ ما أنواع الحمضيات التي يمكن تكثيرها بوساطة الترقيد الهوائي؟
- يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح موحد لدى الطلبة جميعهم.

## النتائج الخاصة

- يتعرّف مسافات الزراعة المناسبة للحمضيات.
- يصف عمليات الخدمة اللازمة لبساتين الحمضيات.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة

- التمهيد للحصة: ينفذ المعلم جلسة مناقشة مسافات الزراعة وعمليات الخدمة اللازمة لأشجار الحمضيات، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما العامل الذي يحدد مسافات الزراعة في بساتين الحمضيات؟ ما الأبعاد المناسبة لزراعة غراس الحمضيات؟ ما عمليات الخدمة التي تحتاج إليها أشجار الحمضيات؟ كم مرة تحرث الأرض المزروعة بالحمضيات في السنة؟ لماذا يجب أن يكون الحرث بين صفوف الأشجار أعمق منه بالقرب منها؟ لماذا يستحسن إبقاء الأرض نظيفة تماماً من الحشائش طوال السنة؟ ما الأمور التي يجب مراعاتها عند إجراء عمليات الحرث في بساتين الحمضيات؟
- مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرّف عملية الريّ في بساتين الحمضيات، يقدم المعلم عرضاً توضيحياً يتضمن العوامل التي تعتمد عليها كمية مياه الريّ، والمدة بين الريّة والأخرى، ثم يهيئ البيئة الصفية للعمل، ويقسم الطلبة إلى ثلاث مجموعات، ويكلف أفراد كل مجموعة ما يأتي:
- المجموعة الأولى: تبين كيفية تأثير نوع التربة، وكمية المياه المتساقطة، ومقدار فقدان الماء بالتبخّر والتنع في كمية مياه الريّ، والمدة بين الريّة والأخرى في بساتين الحمضيات.
- المجموعة الثانية: تحسب كمية مياه الريّ اللازمة (في المرة الواحدة) لريّ (٣٠) دونماً مزروعة بالحمضيات.
- المجموعة الثالثة: تبحث في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، أو النشرات الزراعية عن طرق الريّ الآتية: الريّ السطحي، الريّ بالتنقيط، الريّ بالرشاشات، من حيث: كمية الأعشاب النامية، كمية الماء المستهلك، الجهد المبذول في الريّ، جودة الثمار، الكلفة التشغيلية، ثم تعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية، وتناقشه مع الطلبة.

## الملاحق

ملحق أدوات التقويم (١-٣٨)، (١-٣٩).

## نشاط (١-٦)

تفحص بذرة ليمون أو كلمنتينا، وحاول أن تفصل الأجنة بعضها عن بعض، ثم عدّ بذورها، وقارن بينها من حيث الحجم.

- التركيب بالقلم: طريقة غير متبعة تجارياً في تكثير الحمضيات؛ لأنها مكلفة.
- العقل الساقية المتخشبة: يمكن اتباعها في تكثير بعض أنواع الحمضيات، مثل بعض أصناف الليمون.
- الترقيد الهوائي: يمكن اتباعها في تكثير بعض أنواع الحمضيات، مثل الماندرين.

## مسافات الزراعة

تزرع عادة زراعة غراس الحمضيات وفق الأبعاد الآتية: ٦م×٦م، كما في البرتقال، والماندرين، أو ٧م×٧م، كما في الجريب فروت، أو ٥م×٥م، كما في الكلمنتينا، أما اليوسفي المطعم على أصل الخشخاش فيمكن زراعته بأبعاد ٣م×٣م.

## عمليات الخدمة

تحتاج أشجار الحمضيات إلى عمليات الخدمة الآتية:

- الحرث والعزق: تحرث الأرض المزروعة بالحمضيات مرتين أو أكثر في السنة، نظراً إلى انتشار الأعشاب فيها، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وكثرة مياه الريّ، ويكون الحرث بين صفوف الأشجار على عمق أكبر منه عند الحرث بالقرب منها، إذ يكون سطحياً تحمّ الأشجار؛ للمحافظة على جذورها من التقطيع. ويستحسن إبقاء الأرض نظيفة تماماً من الحشائش طوال السنة، خاصة في المناطق الجافة، كما في غور الأردن (علّل ذلك)، إذ تستخدم المبيدات العشبية المتخصصة، أما في الأراضي المنحدرة فيفضل ترك الأعشاب؛ لتقليل انجراف التربة.
- ويجب مراعاة ما يأتي عند إجراء عمليات الحرث في بساتين الحمضيات:
  ١. ألا يكون الحرث بعمق واحد باستمرار حتى لا تتكون طبقة صماء تحمّ سطح التربة.
  ٢. تجنّب الحرث في أثناء موسم النموّ والإزهار تجنّباً لتقطيع الجذور الصغيرة التي تمتص الماء والعناصر الغذائية، وخوفاً من تساقط الأزهار والثمار الصغيرة.

- تنظيم الطلبة النتائج التي توصلوا إليها، وعرضها، ومناقشتها للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

- تكليف بعض الطلبة ما يأتي: البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن حلول معالجة أبرز المشكلات التي تواجه زراعة أنواع الحمضيات في مناطق الأردن المختلفة، ثم عرض النتائج على الطلبة.
- تصميم عرض تقديمي من خمس شرائح عن عمليات الخدمة اللازمة لبساتين الحمضيات باستخدام برمجية العروض التقديمية.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: سجل وصف سير التعلم (١-٣٨)
- استراتيجية التقويم: قلم وورقة
- أداة التقويم: اختبار قصير (١-٣٩)

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

- كتاب الإنتاج النباتي - المستوى الأول.

#### مصادر التعلم

##### للمعلم

- Hartman, H., Kester, D., davies, F. and Geneve, R. Plant propagation : principles and practices, 7th edition . 2002

##### للطالب

- طه عبدالله نصر، إكثار أشجار الفاكهة / القواعد العلمية والأساليب العصرية، مكتبة المعارف الحديثة، الإسكندرية، ٢٠٠٣ م.

الري: تعتمد كمية مياه الري، والمدة بين الري والأخرى على عوامل منها؛ نوع التربة، وكمية المياه المساقطة، ومقدار فقدان الماء بالتبخر والتساقط. وعموماً، تحتاج أشجار الحمضيات إلى ما معدله (١٠٠ ملم) كل ثلاثة أسابيع، وهذا يعني ضرورة المحافظة على تربة البستان رطبة إلى عمق لا يقل عن المتر. ويمكن تعطيش أشجار الليمون مدة ستة أسابيع قبل الإزهار، وبعدها يمكن ري البستان لدفع الأشجار إلى الإزهار. إن الإهمال في ري بساتين الحمضيات سواء بالمبالغة فيه، أو حرمان الأشجار منه يسبب سقوط الأزهار والثمار الصغيرة.

#### تطبيقات

احسب كمية مياه الري اللازمة (في المرة الواحدة) لري ٣٠ دونماً مزروعة بالحمضيات

#### قضية للبحث

ابحث في شبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية عن طرق ري بساتين الحمضيات الآتية: الري السطحي، الري بالتنقيط، الري بالرشاشات، من حيث؛

- ١- كمية الأعشاب النامية.
- ٢- كمية الماء المستهلك.
- ٣- الجهد المبذول في الري.
- ٤- جودة الثمار.
- ٥- الكلفة التشغيلية.

واعرض ما تتوصل إليه، وناقشه مع زملائك.

التسميد: يعتمد التسميد على نوع التربة، والمناخ، ونوع الحمضيات وأصنافها، والأصول المستخدمة، ويمكن البدء بتسميد بستان الحمضيات في السنوات العشرة الأولى من إنشائه بالسماد المركب، كما هو مبين في الجدول (١-٧).

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يتعرّف عمليات تسميد أشجار الحمضيات.
- يتعرّف أكثر الآفات شيوعاً في بساتين الحمضيات.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرّف عملية التسميد في بساتين الحمضيات يعرض المعلم الجدول (٧-١) الذي يبين برنامج تسميد أشجار الحمضيات بالسماذ المركب، ثم يهيئ البيئة الصفية للعمل، ويقسم الطلبة إلى خمس مجموعات، ويكلف أفراد كل مجموعة ما يأتي:
  - المجموعة الأولى: تحدد العوامل التي يعتمد عليها التسميد في بساتين الحمضيات.
  - المجموعة الثانية: تبين تأثير نوع التربة والمناخ ونوع الحمضيات وأصنافها والأصول المستخدمة في التسميد في بساتين الحمضيات.
  - المجموعة الثالثة: تدرس برنامج تسميد أشجار الحمضيات بالسماذ المركب خلال السنوات العشر الأولى من إنشائه، وتحدد النسب المثوية للعناصر السماذية في هذا السماذ المركب.
  - المجموعة الرابعة: تدرس برنامج تسميد أشجار الحمضيات بالعناصر النادرة، وذلك بتحديد العناصر النادرة التي تحتاج إليها أشجار الحمضيات، طريقة إضافتها، والموعد المناسب لإضافتها.
  - المجموعة الخامسة: تدرس برنامج تسميد أشجار الحمضيات بالسماذ البلدي المختمر، وذلك بتحديد الموعد المناسب لإضافته، والكمية اللازمة لكل شجرة، ثم ينظم الطلبة النتائج التي يتوصلون إليها، ويعرضونها ويناقشونها للتوصل إلى فهم صحيح موحد لدى الطلبة جميعهم.
- التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة
- التمهيد للحصة: ينفذ المعلم جلسة لمناقشة تقليم أشجار الحمضيات، وأبرز الآفات شيوعاً في بساتين الحمضيات، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: هل تحتاج أشجار الحمضيات إلى تقليم شديد أم متوسط أم خفيف؟ وكيف يكون ذلك؟ ما الأمور التي يتطلبها التقليم الإثماري لأشجار الحمضيات. ما أكثر الأمراض شيوعاً في بساتين الحمضيات؟ ما أكثر الحشرات التي تهاجم أشجار الحمضيات؟ مناقشة إجابة الطلبة عن الأسئلة، وتدوين الإجابات على السبورة.

الجدول (٧-١): برنامج تسميد أشجار الحمضيات بالسماذ المركب.

السنة	كمية السماذ (غ/شجرة)	عدد الدفعات التي توزع عليها كمية السماذ
الأولى	١٥٠	٥
الثانية	٤٥٠	٤
الثالثة	٩٠٠	٤
الرابعة	١٨٠٠	٣
الخامسة	٢٠٥٠	٣
السادسة	٢٢٧٥	٣
السابعة	٢٥٠٠	٣
الثامنة	٢٧٢٥	٣
التاسعة	٢٩٥٠	٣
العاشر	٣١٥٠	٣

● النسب المثوية للعناصر السماذية في هذا السماذ المركب كما يأتي:

N <sub>2</sub>	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	MgO	MnO	CuO	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
٨	٢	٨	٢	٠,٥	٠,٢٥	٠,١

وتحتاج الأشجار إلى التسميد بالعناصر النادرة، خاصة في غور الأردن، إذ تعاني بعض البساتين من نقص الحديد والزنك والمنغنيز، ويمكن إضافتها عن طريق التسميد الورقي، إذ ترش الأشجار بالكميات المطلوبة بعد جمع المحصول، أو قبل بدء موسم النمو الجديد. ويضاف السماذ البلدي المختمر إلى التربة بعد الانتهاء من جمع المحصول.

٥. **التقليم:** هل تحتاج أشجار الحمضيات إلى تقليم شديد أم متوسط أم خفيف؟ وكيف يكون ذلك؟ إنها تحتاج إلى تقليم خفيف؛ لأنّ مخزونها من المواد الكربوهيدراتية قليل، وأن التقليم الشديد يؤخر الإنتاج ويقلله، ويضعف النمو.

ويتطلب التقليم الإثماري لأشجار الحمضيات ما يأتي:

١. إزالة السرطانات والفروع الجافة والميتة والمصابة والمكسورة.
٢. إزالة الطرود المائية التي تنمو على الساق، أو في أماكن غير مناسبة على الفروع الرئيسة للشجرة.
٣. تقصير الطرود المائية النامية إلى الخارج.

### مراعاة الضروك الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن أهم أصناف الحمضيات الموجودة في الأردن، وعرض النتائج على زملائهم.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: الملاحظة
- أداة التقويم: السجل القصصي (١-٤٠)

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

#### مصادر التعلم

#### للمعلم

- George, A. Cquaah. Horticulture Principles and prtices. Pearson Prentice Hall. 2005
- طه الشيخ حسن، خصوبة التربة وتغذية أشجار الفاكهة: المقننات السمادية لمختلف أنواع الفاكهة، دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، دمشق، ٢٠٠٣م.

#### للطالب

- سلام أيوب، الدليل الفني لتطعيم الأشجار المثمرة، المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٦م.
- عبد القادر قاسم، رائدة العوامل، آفات الحمضيات وطرق مكافحتها، شركة المواد الزراعية مقدادي، عمان الأردن، ١٩٩٩م.

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

- ٤ . تقليم خفّ، لإزالة الفروع الضعيفة، كما في أشجار بعض أصناف المندلينا.
- ٥ . تقصير الفروع الطويلة والضعيفة إلى تفرعات جانبية، كما في أشجار الليمون، ويُجرى التقليم بعد الانتهاء من جمع الثمار.

#### ٧ الآفات

- تعرض أشجار الحمضيات للإصابة بأمراض وحشرات عدّة، من أهمها:
- ① الأمراض الفطرية: مثل التصدّع، وعفن الثمار الأخضر.
  - ② الأمراض البكتيرية: مثل سيترس كانكر.
  - ③ الأمراض الفيروسية: مثل التدهور السريع، وكسوكورتس، والبسوروسيس.
  - ④ الديدان الثعبانية (النيماطودا).
  - ⑤ الحشرات: أهمها صانعات الأنفاق، والحشرات القشرية، والمنّ، والحلم الفضي، والبقّ الدقيقي، والتريس، وذبابه الفاكهة.

#### ٨ الأصناف

- للحمضيات أصناف عديدة يصعب حصرها، وبناء على ما ذكره سامسون (١٩٨٠)، (Samson) يمكن تقسيم أصناف الحمضيات من حيث:
- ① موعد النضج إذ تنقسم إلى أصناف مبكرة، ومتوسطة، ومتأخرة.
  - ② شكل الثمار.
  - ③ لون الثمار.
  - ④ الطعم وصفات أخرى.
- وفي ما يأتي الأصناف المحلية للحمضيات:
- ① مجموعة البرتقال الحلو، كما في الشكل (١-١٦)، تشمل أصنافاً عديدة، منها:
    ١. البرتقال الياقوتي (الشموطي): ثمرته كبيرة، وشكلها بيضاوي مستطيل، أو مائل للاستطالة، القشرة لونها برتقالي زاهٍ تظهر عليها الغدد الزيتية، وملمسها محبّب أو خشن، سميكة بعض الشيء، مما يجعلها تتحمل النقل، وطعم اللب والعصير لذيق، والفصوص في الثمرة كبيرة، والبذور قليلة أو معدومة.
    ٢. البرتقال أبو سرّة: ثمرته متوسطة إلى كبيرة الحجم، شكلها كروي إلى بيضاوي

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى



## النتائج الخاصة

- يتعرف أهم أصناف الحمضيات الموجودة في الأردن.
- يصف عمليتي نضج ثمار الحمضيات وجنيها.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر/ العرض التوضيحي

- لتعرف أصناف اللوزيات يعرض المعلم الأشكال (١٦-١)، و(١٧-١)، و(١٨-١)، و(١٩-١)، و(٢٠-١)، ثم يكلف الطلبة ضمن المجموعات ما يأتي:
- المجموعة الأولى: تتفحص ثمار أصناف البرتقال؛ أبو سرّة، اليافاوي، والفلنشيا، ثم تقارن بينها من حيث الحجم، ولون القشرة، وكمية العصير، وطعمه وكمية البذور وتعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية، وتناقشه مع الطلبة.
- المجموعة الثانية: تتفحص ثمار أصناف الماندرين؛ الكلمنتينا، والمندلينا، ثم تقارن بينها من حيث الحجم، ولون القشرة، وكمية العصير، وطعمه وكمية البذور، وتعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية، وتناقشه مع الطلبة.
- المجموعة الثالثة: تتفحص ثمار أصناف الليمون؛ وليمون الأضاليا، والليمون المعروف باسم Eureka، ثم تقارن بينها من حيث الحجم، ولون القشرة، وكمية العصير، وطعمه وكمية البذور، وتعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية، وتناقشه مع الطلبة.
- المجموعة الرابعة: تتفحص ثمار أصناف الجريب فروت؛ جريب فروت مارش، من حيث الحجم، ولون القشرة، وكمية العصير، وطعمه وكمية البذور، وتعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية، وتناقشه مع الطلبة.
- المجموعة الخامسة: تتفحص ثمار أصناف مجموعة الشادوك أو بيوميلو؛ من حيث الحجم، ولون القشرة، وكمية العصير، وطعمه، وكمية البذور، ثم تعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية، وتناقشه مع الطلبة.
- تنظيم الطلبة النتائج التي توصلوا إليها، وعرضها ومناقشتها؛ للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

## التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للحصة: يتفقد المعلم جلسة لمناقشة عملية نضج ثمار الحمضيات، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ماذا تسمى عملية حدوث تغيرات فسيولوجية وكيميائية داخل الثمرة التي اكتمل نموها؟ ما المقصود بنضج الثمرة؟ كيف نعرف وصول

## الملاحق

ملحق أدوات التقويم (١-٤١)، (١-٤٢).

مقلوب، وطرفها بارز يشبه السرة، ولا تحتوي بذوراً، وهي عصيرية نسبياً، وطعمها لذيد، ولا تصلح في الصناعات الغذائية، وأما القشرة فلونها برتقالي غامق، متوسطة السمك.

٣. البرتقال الفرانسواي: يشبه في شكله ثمرة برتقال الفلنشيا، قشرته مبيبة، وسميكة، ولونها برتقالي فاتح، وحجمها متوسط، أما لبها فهو غامق تشوبه حمرة خفيفة، ويحتوي بذوراً.

٤. برتقال فالنسيا: ثمرته متوسطة إلى كبيرة الحجم، مستطيلة إلى كروية الشكل، عديمة البذور، أو قليلتها، قشرة الثمرة لونها برتقالي حقيقي عند النضج، وهي متوسطة إلى سميكة، وجلدية ملساء، عصيرها غزير وذو نكهة جيدة، يميل إلى الحموضة، ويصلح هذا الصنف في الصناعات الغذائية بدرجة ممتازة، وهو يعد من الأصناف المتأخرة، بل إنه آخر ما ينضج من الحمضيات.



الشكل (١٦-١): بعض أصناف مجموعة البرتقال الحلوي. الشموطي، أبو سرّة، الفلنشيا.

## نشاط (٧-١)

تفحص ثمار أصناف البرتقال (أبو سرّة، اليافاوي، والفلنشيا)، ثم قارن بينها من حيث الحجم، ولون القشرة، وكمية العصير، وطعمه وكمية البذور، وأعرض ما تتوصل إليه، وناقشه مع زملائك.

● مجموعة الماندرين والماندرين المهجن والتانجيلوز والتانجور، كما في الشكل (١٧-١): تشمل هذه المجموعة أصنافاً محلية، منها:

١. الكلمنتينا: الثمار متعددة الحجم، وتراوح بين المتوسطة إلى الصغيرة، أشكالها

٧٤

● مجموعة الشادوك، أو بيوميلو، كما في الشكل (٢٠-١): الثمرة كبيرة الحجم إلى حد ما، وشبه كروية، مفلطحة أو كروية كثرة، والقشرة صفراء ملساء أو خشنة، متوسطة إلى سميكة، واللّب أبيض مصفرّ، والأكياس العصيرية كبيرة، وطعمه العصير فيها حامضي قليل الحلاوة.



الشكل (١٨-١): مجموعة الليمون. الشكل (١٩-١): مجموعة الجريب فروت.



الشكل (٢٠-١): مجموعة الشادوك أو بيوميلو.

## ٩ النضج

يجب قطف ثمار الحمضيات حين تصل إلى مرحلة النضج الاستهلاكي، ويمكن معرفة وصول الثمار إلى مرحلة النضج الاستهلاكي بالعلامات الآتية:

● بدء تحول اللون الأخضر إلى الأخضر الفاتح، ثم اللون المميز لأنواع الحمضيات، وهو اللون الأصفر في الليمون، واللون البرتقالي في البرتقال.

● وصول نسبة المواد الصلبة الذائبة إلى الحموضة بنسبة ١٠:١٦-١٠

● نسبة العصير في الثمرة لا تقل عن ٥٠٪.

٧٦

ثمار الحمضيات إلى مرحلة النضج الاستهلاكي؟ كيف تقطف الثمار يدوياً؟ ما الأدوات المستخدمة في قطف الثمار؟ ما المشكلات التي قد تنشأ عن سوء القطف؟

- مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

- تكليف الطلبة ما يأتي:

- كتابة تقرير يبين فيه كيفية تحديد صلاحية ثمار الحمضيات للقطف بواسطة حساب نسبة الماء الخالي من حامض الستريك في عصير الثمرة، ثم البحث في الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، أو النشرات الزراعية عن ذلك، ثم عرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية.
- البحث في الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، أو النشرات الزراعية عن المشكلات التي قد تنشأ عن وجود تمزق في غلاف الثمرة الناتج من سوء القطف، ثم عرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية.

## استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم: التقييم المعتمد على الأداء
- أداة التقييم: سلم تقدير (١-٤١)
- استراتيجية التقييم: التقييم المعتمد على الأداء
- أداة التقييم: سلم تقدير لفظي (١-٤٢)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

- تقليل فاقد ما بعد الحصاد لمنتجات الخضار، الفواكه، المحاصيل الجذرية: الرابطة الإقليمية لمؤسسات التسويق الزراعي الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، عمان، ٢٠٠٤م.
- دليل العبوات و تعبئة الخضار و الفواكه الطازج، الرابطة الإقليمية لمؤسسات التسويق الزراعي الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، عمان، ١٩٩٩م.
- رابندارات طاغور، بديع حقي (مترجم)، جني الثمار، دار العلم للملايين، بيروت، ٢٠٠٠م.
- عواد حسين، ماجدة بهجت، الخصائص العامة للحاصلات البستانية بعد الحصاد وعلاقتها بالتكنولوجيا المستخدمة في التداول بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية ستامفورد آنكتكت - الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٧م.

### للطالب

مفلطحة قليلاً إلى كروية تشبه الكمثرى. وطرف الثمرة من جهة الميسم منضغط، وقشرة الثمرة متوسطة السمك، يسهل فصلها وتقشيرها، ملمسها ناعم، ولونها برتقالي داكن إلى برتقالي حممر، ولحم الثمرة عصيري حلو، وفيه بذور أقل من المندليتا. ٢. المندليتا: الثمار متعددة الحجم، تتراوح من المتوسطة إلى الصغيرة، أشكالها مفلطحة تشبه إلى حد كبير -وبخاصة ناحية اتصال الثمرة بالساق- ثمرة الكلمنتينا، إلا أن ثمرة المندليتا من جهة الميسم أكثر انضغاطاً، والقشرة رقيقة سهلة الانفصال عن الفصوص، لونها برتقالي فاتح إلى مصفر، والبذور فيها عديدة، وطعم الثمرة حامضي.



الشكل (١-١٧): بعض أصناف مجموعة الماندرين.

مجموعة الليمون كما في الشكل (١-١٨): تشمل هذه المجموعة أصنافاً، منها:

١. ليمون الأضاليا، ومنه الليمون المعروف باسم Eureka، ثمرة متوسطة الحجم إلى صغيرة، إهليجية الشكل، وتميل إلى الاستطالة، وقد تكون بيضاوية، برقية صغيرة من جهة اتصال الثمرة بالفرع وبحلقة صغيرة، بذورها إما معدومة، وإما قليلة، وتميل الثمرة إلى اللون الأصفر عند النضج. أما القشرة فهي متوسطة السمك، والثمرة عصيرية وحامضية، والإثمار يكون على مدار السنة.
- مجموعة الجريب فروت، كما في الشكل (١-١٩): تشمل هذه المجموعة أصنافاً، منها:
  - جريب فروت مارش: ثمرة متوسطة الحجم، منبسطة إلى كروية الشكل، بذورها قليلة، عصيرية، والقشرة لونها أصفر فاتح، واللّب لونه أصفر مخضر قليلاً.

٢٥

## مهارات البحث والاتصال

اكتب تقريراً تبيّن فيه كيفية تحديد صلاحية ثمار الحمضيات للقطف بواسطة حساب نسبة الماء الخالي من حامض الستريك في عصير الثمرة، مستعيناً بشبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية، واعرض ما تتوصل إليه عن طريق برمجية العروض التقديمية، وناقشه مع زملائك.

تُقطف الثمار بمقصات خاصة تعرف بمقصات القطف، وعند قطف الثمرة تمسك براحة اليد، ثم تفصل عن الفرع بواسطة مقص القطف؛ لأنّ سحب الثمرة من غير قصها من عند العنق يمزق الثمرة من جهة العنق، خاصة في المندليتا، والكلمنتينا. وفي حالة البرتقال تسحب الثمرة وتحرّك يمينا ويساراً، ثم تشدّ إلى أسفل، إلا أنه في الحالات جميعها يفضل فصل الثمار باستخدام مقص القطف.

## التقييم

- ١ - ما الاسم العلمي لكل من:
  - أ - البرتقال.
  - ب- الليمون.
  - ج- الجريب فروت.
  - د- الماندرين.
  - هـ - اليوملي.
- ٢ - تسبب رياح الخماسين أضراراً بالغة بالحمضيات، اذكر هذه الأضرار.
- ٣ - بين الأمور التي يجب مراعاتها عند إجراء كل من العمليات الزراعية الآتية في بستان الحمضيات:
  - أ - الريّ ب- العزق ج- التقليم
- ٤ - كيف تحكّم على وصول الحمضيات إلى مرحلة النضج الاستهلاكي؟
- ٥ - يرغب مزارع حمضيات في إنشاء بستان حمضيات، إلا أن تربة أرضه ثقيلة، فماذا تقترح عليه لحل هذه المشكلة؟
- ٦ - علّل ما يأتي:
  - أ - خلّو ثمار بعض أصناف البرتقال من البذور.
  - ب - عدم احتياج الحمضيات إلى تقليم جانبي.
  - ج - بعض الأشكال الناتجة من بذور الحمضيات تكون مشابهة للنبات الأم.
  - د - استخدام أصل فولكامارينا لتطعيم الحمضيات عليه.

٧٧

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يختار الفروع المناسبة لأخذ العقل الساقية شبه المتخشبة منها.
- يجهز العقل الساقية شبه المتخشبة.
- يعامل العقل بهرمونات التجذير المناسبة.
- يغرّس العقل الساقية شبه المتخشبة لتجذيرها.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- تقسيم الطلاب إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (٧-١) كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تختار الفروع المناسبة لأخذ العقل الساقية شبه المتخشبة منها بحيث يكون عمرها أقل من سنة.
- المجموعة الثانية: تجهز العقل الساقية شبه المتخشبة، وذلك بقص الفرع إلى عقل تتراوح بين (٨-١٥ سم)، بحيث يحتوي كلٌّ منها على (٢-٣) عقد على الأقل، وتزيل الأوراق القريبة من القاعدة، وتبقى (٢-٣) ورفات في الجزء العلوي.
- المجموعة الثالثة: تعامل العقل بهرمونات التجذير المناسبة بغمس قواعدها في الهرمون الخاص بالتجذير، وتخلص من الكمية الزائدة منه بهز قاعدة العقلة.
- المجموعة الرابعة: تغرّس العقل الساقية شبه المتخشبة في وسط زراعي ملائم للتجذير، باستخدام الرّي الرذاذي، أو في وسط يحتوي نسبة رطوبة عالية، بعيداً عن أشعة الشمس.
- بعد تنفيذ المهام تعرض كل مجموعة ما تتوصل إليه، وتناقشة مع المجموعة الأخرى.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.
- يجيب المعلم عن تساؤلات الطلبة في أثناء العمل.
- تكليف مقرر كل مجموعة إرجاع الأدوات والمواد إلى مكانها.

## تكاثر الحمضيات بالعقل الساقية شبه المتخشبة

## التشاجات

التمرين  
(٧-١)

- يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادراً على أن:
- تختار الفروع المناسبة لأخذ العقل الساقية شبه المتخشبة منها.
  - تجهز العقل الساقية شبه المتخشبة.
  - تعامل العقل بهرمونات التجذير المناسبة.
  - تغرّس العقل الساقية شبه المتخشبة لتجذيرها.

## المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

- فروع من نباتات (أصول الحمضيات). \* بيموس. \* هرمون تجذير. \* وسط زراعي للتجذير.
- مقص تقليم. \* جهاز ري رذاذي.

## الرسوم التوضيحية

## خطوات العمل والنقاط الحاكمة



الشكل (١): عقلة شبه متخشبة.

- ١- حدّد الفرع الذي تريد أخذ العقل منه، على أن يكون عمره أقل من سنة.
- ٢- قصّ الفرع إلى عقل طولها من (٨-١٥ سم)، بحيث يحتوي كلٌّ منها على عقدتين، أو ثلاث عقد على الأقل، انظر الشكل (١).
- ٣- أزل الأوراق القريبة من القاعدة، وأبقِ ورفتين، أو ثلاث ورفات في الجزء العلوي.
- ٤- اغمس قواعد العقل في الهرمون الخاص بالتجذير، وتخلص من الكمية الزائدة منه، بهز قاعدة العقلة.
- ٥- اغرس العقل في وسط زراعي ملائم للتجذير، تحت الرّي الرذاذي، أو في وسط يحتوي نسبة رطوبة عالية، وبعيداً عن أشعة الشمس.
- ٦- انقل الأشتال بعد تكوين الجذور إلى مكان، لتقسيتها قبل زراعتها في المكان الدائم.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الفروق الفردية

علاج

إثراء

- ١- ما الموعد المناسب لأخذ العقل الساقية شبه المتخشبة؟ علّل ذلك.
- ٢- ما أهمية إجراء عملية التقسية للأشتال قبل نقلها إلى الحقل؟
- ٣- عدد العوامل التي ترى أنها أساسية في نجاح التكثير بالعقل الساقية شبه المتخشبة.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٤٣)

٧٩

### أخطاء شائعة

التكامل الأفقي

التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

للمعلم

- عواد حسين، ماجدة بهجت، الخصائص العامة للحاصلات البستانية بعد الحصاد وعلاقتها بالتكنولوجيا المستخدمة في التداول بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية ستامفورد آنكتكت - الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٧م.

للطالب



- يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:
- تصف الحمضيات نباتيًا.
  - تميز الحمضيات نباتيًا.
  - تحدد طبائع الحمل والإزهار في الحمضيات.

المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

\* فروع مزهرة أو مشمرة من الليمون، والبرتقال، والجريب فروت، والكلمنتينا. \* سكين.

الرسوم التوضيحية

خطوات العمل والنقاط الحاكمة



١- تفحص فروع حمضيات مزهرة، ولاحظ ما يأتي:  
أ- عنق الورقة، كما في الشكل (١): تكوّن بعض الأنواع أجنحة على أعناق الأوراق، ففي أيّ الأنواع توجد هذه الأجنحة؟ قارن بين حجمها.

ب- وضع الأوراق: ماذا نسعى نظام ترتيب الأوراق على الفروع؟ لاحظ وجود عقد عند اتصال الورق، ولاحظ المسافة بين كلّ عقدتين، ماذا نسعى؟

ج- الأزهار: توجد وحدها في آباط الأوراق، أو في نورات راسيمية قصيرة (نورة غير ورقية)، كما في الشكل (٢)، لاحظ النورات المحمولة على النموات الحديثة (نورة ورقية)، كما في الشكل (٣).

٢- تفحص فروعًا حديثة التكوين، وأخرى أكبر سنًا، في أيّ منها تجد أشواكًا صغيرة؟ انظر الشكل (٤).

٣- اعمل مقطعًا عرضيًا في كلّ من الفرع الحديث والفرع الأكبر سنًا، ستجد أن أحدهما ذو زوايا، أما الآخر فهو دائري.



الشكل (١): الأوراق في الحمضيات.

- يتابع المعلم عمل المجموعات ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.

- يجيب المعلم عن تساؤلات الطلبة في أثناء العمل.

- يعرض المعلم الإجابة الصحيحة.

التعلم عن طريق النشاط/ التدريب

- تقسيم الطلاب إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل

لتنفيذ خطوات التمرين (٨-١)، كما يأتي:

● المجموعة الأولى: تحدد الأفراخ المائية.

● المجموعة الثانية: تزيل الأفراخ المائية المتجهة إلى أعلى أو إلى

داخل الشجرة بوضع متعارض.

● المجموعة الثالثة: تختار الأفراخ المائية ذات الموقع الجيدة ثم

تقصرها.

● المجموعة الرابعة: تزيل السرطانات النامية أسفل منطقة

التطعيم.

- تدوير المجموعات وإجراء خطوات التمرين بمتابعة المعلم.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## الموضوع

تمرين (٨-١): تمييز نباتات الحمضيات

تمرين (٩-١): تقليم الحمضيات تقليمًا إثماريًا

### النتائج الخاصة

- يصف الحمضيات نباتيًا.
- يميز الحمضيات نباتيًا.
- يحدد طبائع الحمل والإزهار في الحمضيات.
- يقلم الحمضيات تقليمًا إثماريًا.

### المفاهيم والمصطلحات

### السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التعلم عن طريق النشاط/ التدريب

- تقسيم الطلاب إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ

خطوات التمرين (٨-١)، كما يأتي:

● المجموعة الأولى: تتفحص فروع حمضيات مزهرة، وتلاحظ ما يأتي:

■ عنق الورقة، وتكوّن أجنحة على أعناق الأوراق (في بعض الأنواع).

■ في أيّ الأنواع توجد هذه الأجنحة؟

■ حجمها، ووضع الأوراق، ماذا يسمّى وضع الأوراق على الفروع؟

هل توجد عقد عند اتصال الورق؟ هل هنالك مسافة بين كل عقدتين؟

ماذا تُسمّى؟

■ الأزهار: توجد مفردها في آباط الأوراق أو في نورات راسيمية قصيرة

(نورة لا ورقية)، ملاحظة النورات المحمولة على النموات الحديثة (نورة

ورقية)، ترسم الأجزاء التي تفحصتها، وتكتب أسماء الأجزاء على الرسم.

● المجموعة الثانية: تتفحص فروعًا حديثة التكوين وأخرى أكبر سنًا.

في أيّ منها توجد أشواك صغيرة؟ وترسم في دفترها الأجزاء التي تفحصتها،

وتكتب أسماء الأجزاء على الرسم.

● المجموعة الثالثة: تعمل قطعًا عرضيًا في كلّ من الفرع الحديث والفرع

الأكبر سنًا، ستجد أن أحدها ذو زوايا، أما الآخر فهو دائري، وترسم في

دفترها الأجزاء التي تفحصتها، وتكتب أسماء الأجزاء على الرسم.

● المجموعة الرابعة: تعمل مقطعًا عرضيًا في ثمرة، وتتفحص الأجزاء من

الخارج إلى الداخل، وترسم في دفترها الأجزاء التي تفحصتها، وتكتب

أسماء الأجزاء على الرسم.

- بعد تنفيذ المهام يعرض مقرر المجموعات نتائج العمل، وتجري مقارنة بينها،

وتُستخلص الإجابة الصحيحة عن طريق المناقشة والحوار.



### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

- تكليف الطلبة ما يأتي:

- رسم الأجزاء النباتية لأشجار الحمضيات التي تفحصوها، وكتابة أسماء الأجزاء على الرسم.
- تقلم أشجار الحمضيات الموجودة في بستان المدرسة تقليماً إثمارياً، باستخدام ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.

#### إثراء

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٤٤)
- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٤٥)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- ملك أبو زينة وآخرون، دليل المواصفات القياسية الأردنية للفاكهة الطازجة، وزارة الزراعة، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.
- محمد البدور، مسنات الحيارى، تقدير خسائر فاقد ما بعد الحصاد لبعض محاصيل الخضار والفواكه، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.

#### للطالب

٤- اعمل مقطعاً عرضياً في ثمرة، وافحص الأجزاء من الخارج إلى الداخل.



الشكل (٣): نورة حمضيات ورقية.



الشكل (٢): نورة حمضيات غير ورقية.



الشكل (٤): فرع حمضيات.

#### التقويم

- ١- ارسم في دفترك الأجزاء التي تفحصتها، وكتب أسماء الأجزاء على الرسم.
- ٢- كيف تميز فرع حمضيات حديث من فرع آخر قديم؟
- ٣- في أي أنواع الحمضيات تظهر الأجنحة واضحة على أعناق الأوراق؟

٨١

### التقويم الإثماري للحمضيات

التمرين  
(١-٩)

#### التناجات

يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:

- تقلم الحمضيات تقليماً إثمارياً.

المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

• مقص تقليم. • منشار تقليم. • سلم. • بستان حمضيات.

#### الرسوم التوضيحية



#### خطوات العمل والنقاط الحاکمة

- ١- حدد الأفرع الماتية.
- ٢- أزل الأفرع الماتية المنجهة إلى أعلى، أو إلى داخل الشجرة، بوضع متعارض.
- ٣- اختر الأفرع الماتية ذات المواقع الجيدة، ثم قصها.
- ٤- أزل السرطانات النامية أسفل منطقة التطعيم.
- ٥- أزل الفروع الجافة والمكسورة.
- ٦- تخلص من الفروع الكبيرة الضعيفة الإثمار.

#### التقويم

- ١- لماذا يجب إزالة السرطانات النامية أسفل منطقة التطعيم؟
- ٢- حدد الفروع التي يجب إزالتها من شجرة حمضيات.
- ٣- علّل: تقلم الحمضيات تقليماً خفيفاً.

٨٢

- يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:
- تروي بستان حمضيات.
  - تسمد بستان حمضيات.
  - تعزق بستان حمضيات.

المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

\* بستان حمضيات. \* مصدر ماء. \* سلفات الأمونيوم. \* منقاش. \* مجرفة. \* ميزان.

الرسوم التوضيحية	خطوات العمل والنقاط الحاكمة
 <p>الشكل (١): تكويم التراب حول سيقان أشجار الحمضيات.</p>	<p>أولاً: الري:</p> <p>١- بالأحواض: كويم التراب حول الساق؛ منعاً لدخول الماء إليه، وتجنباً لنقل فطريات مرض التصمغ من الأشجار المصابة إلى السليمة، كما في الشكل (١).</p> <p>٢- بالخطوط: تحث الأرض بين صفوف الأشجار، بحيث ينساب الماء بين الخطوط من دون ملامسة المياه للجذع، كما في الشكل (٢).</p> <p>ثانياً: التسميد:</p> <p>١- اتر كيلو غراماً واحداً من سلفات الأمونيوم حول الشجرة على دفعتين.</p> <p>٢- اخلط السماد الكيميائي بالتربة جيداً.</p> <p>ثالثاً: الحرث، والعزق، ومكافحة الأعشاب، كما في الشكل (٣).</p>
 <p>الشكل (٢): ربي أشجار الحمضيات بالخطوط (الأحواض).</p>	<p>١- احث الأرض بين صفوف الأشجار حرثاً سطحياً غير عميق.</p> <p>٢- أزل الأعشاب من حول جذوع الشجرة بواسطة المنقاش.</p>

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## الموضوع

تمرين (١٠-١): خدمة بستان الحمضيات

تمرين (١١-١): جني الحمضيات

## النتائج الخاصة

- يروي بستان حمضيات.
- يسمد بستان حمضيات.
- يعزق بستان حمضيات
- يحدد الثمار الصالحة للجني.
- يجني ثمار الحمضيات.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- تقسيم الطلاب إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (١٠-١)، كما يأتي:

- المجموعة الأولى: تروي بستان حمضيات بالأحواض، وذلك بتكويم التراب حول الساق منعاً لدخول الماء إليه، تحث الأرض بين صفوف الأشجار على شكل خطوط بحيث ينساب الماء بينها من دون ملامسة المياه للجذع.
- المجموعة الثانية: تسمد بستان حمضيات بمقدار (١) كغ من سلفات الأمونيوم حول الشجرة على دفعتين، وتخلط السماد الكيميائي بالتربة جيداً.
- المجموعة الثالثة: تعزق بستان حمضيات، تحث الأرض بين صفوف الأشجار حرثاً سطحياً غير عميق، تزيل الأعشاب حول جذوع الشجرة بواسطة المنقاش.

- بعد تنفيذ المهام يعرض مقرر المجموعات العمل، وتُجرى مقارنة بينها، وتستخلص الإجابة الصحيحة عن طريق المناقشة والحوار.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.
- يجيب المعلم عن تساؤلات الطلبة في أثناء العمل.
- تكليف مقرر كل مجموعة إرجاع الأدوات والمواد إلى مكانها.

التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- ينفذ الطلاب خطوات التمرين (١١-١) باستخدام المواد والأدوات والتجهيزات بإشراف المعلم متبعين الخطوات نفسها التي قام بها المعلم.
- متابعتهم وإرشادهم وتوجيههم وتقييم أدائهم.

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

- ريّ بستان الحمضيات سطحياً بطريقتي الخطوط والأحواض، وباستخدام ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.
- تسميد بستان الحمضيات بالأسمدة الكيميائية، باستخدام ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.
- عزق بستان الحمضيات، باستعمال ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.
- جني ثمار الحمضيات باستعمال ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.

#### إثراء

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٤٦)
- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٤٧)


### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

#### للطالب



الشكل (٣): مواقع الحرث والعرق في بستان الحمضيات.

#### التقويم

- ١- علّل: يجب ريّ الأشجار بعد عمليات العرق والتسميد.
- ٢- ما الإجراء الذي نقوم به لمنع انتقال فطريات التصدّع إلى أشجار الحمضيات الأخرى؟
- ٣- لماذا يجب أن يكون حرث بساتين الحمضيات سطحياً.
- ٤- حدّد مواعيد إضافة دفعات الأسمدة النيتروجينية إلى بساتين الحمضيات.

#### تطبيقات

- ١- اروي بستان الحمضيات ريّاً سطحياً بطريقتي الخطوط والأحواض، مستخدماً ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.
- ٢- سمّد بستان الحمضيات بالأسمدة الكيميائية، مستخدماً ما يلزم من مواد، وأدوات، وتجهيزات متوافرة.
- ٣- اعزق بستان الحمضيات، مستخدماً ما يلزم من مواد، وأدوات، وتجهيزات متوافرة.

### جني الحمضيات

النتائج	التقويم
<p>يتوقّع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تحدّد الثمار الصالحة للجني.</li> <li>- تجني ثمار الحمضيات.</li> </ul>	<p>التمرين (١١-١)</p>
<p>المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات</p> <p>* بستان حمضيات. * مقصّ جني الحمضيات. * صندوق جمع الثمار. * سلّم.</p>	
<p>خطوات العمل والنقاط الحاكمة</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١- حدّد علامات نضج الثمار حسب المعايير المميزة للصنف.</li> <li>٢- أمسك الثمرة بإحدى اليدين، والمقص الخاص بالقطف باليد الأخرى.</li> <li>٣- اقلّف ثمار الحمضيات بواسطة مقص القطف الخاص.</li> </ol>	<p>الرسوم التوضيحية</p>

#### التقويم

- ١- ما معايير نضج ثمار الحمضيات؟
- ٢- ما الأضرار التي قد تنجم عن شدّ ثمرة حمضيات عند قطفها؟
- ٣- علّل عدم ترك أيّ جزء من العنق عند جني ثمار الحمضيات.

## النتائج الخاصة

- يتعرّف الفصيلة التي ينتمي إليها الموز.
- يصف نبات الموز نباتياً.
- يوضح المقصود بكلّ من: الفصيلة الموزية، الكورمة، الخلفات، الساق الهوائية الكاذبة، السنبله المركبة.
- يتعرّف طبائع الإزهار والإثمار في الموز.

## المفاهيم والمصطلحات

الفصيلة الموزية، الكورمة، الخلفات، الساق الهوائية الكاذبة، السنبله المركبة، وحيد الأزهار، ثمرة عنبه، التمايز الزهري

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس وتوظيف خبرات الطلبة السابقة بطرح الأسئلة الآتية:
  - ما اسم الفصيلة التي ينتمي لها الموز؟ ما اسم الجنس الذي يتبع له الموز؟
  - ما الاسم العلمي للموز؟ هل يُعدّ نبات الموز شجيرة معمّرة أم غير معمّرة؟
  - كم يبلغ ارتفاع نبات الموز؟ ما اسم الساق الحقيقية الأرضية المتحورة لشجرة الموز؟ ممّ تتكون الساق الحقيقية الأرضية المتحورة لشجرة الموز؟
  - ما المقصود بالكورمة؟ ماذا يسمّى النمو الخضري الذي ينتج من البراعم الموجودة على الساق الأرضية (الكورمة)؟ ما الهدف من إنتاج الخلفات؟
  - ما المقصود بالساق الهوائية الكاذبة؟ كيف تتكون الساق الهوائية الكاذبة؟ لماذا يوصف الموز بأنه وحيد الأزهار؟ ما المقصود بوحيد الأزهار؟
- مناقشة إجابة الطلبة عن الأسئلة وتدوين الإجابات على السبورة.

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرّف طبائع الإزهار والإثمار في الموز يعرض المعلم الأشكال (١-٢١) و (١-٢٢) و (١-٢٣)، ثم يقسم الطلاب إلى أربع مجموعات، كما يأتي:
  - المجموعة الأولى: تدرس كيفية ظهور الأزهار في الموز، وتبيّن المقصود بالسنبله المركبة وكيفية تكونها، وأنواع الأزهار الثلاث التي يحملها العنقود الزهري من حيث: نوعها، مميزاتها، موقعها على العنقود الزهري.
  - المجموعة الثانية: تدرس مقطعاً طويلاً ومقطعاً عرضياً في ثمرة الموز لتعرّف تركيب الثمرة، وكيفية تكونها.

## رابعاً / الموز

ينتمي الموز إلى الفصيلة الموزية (*Musaceae*)، ويتبع الجنس موزا (*Musa*)، ونظراً إلى تعدد الأنواع التي تتبع هذا الجنس، مثل نانا (*Nana*) وسابينس (*Sinensis*)، وكورنكيولاتا (*Corniculata*)، فإنه يفضل كتابة الاسم العلمي للموز (*Musa*) مضافاً إليه اسم الصنف، مثلاً (*Musa Spp. Cavendish*) والموز نبات شجري معمر يتراوح ارتفاعه بين ٢-٦ أمتار، ساقه الحقيقية أرضية متحورة تسمى الفلقاسة، أو الرايزوم (الكورمة)، تتكون من عقد وسلاميات قصيرة، تنتج قمتها الأرضية الأوراق بترتيب وتتابع حلزوني، وفي إبط كلّ منها برعم يمكن أن يكون نمواً خضرياً جديداً يسمّى خلفه أو فرعاً، يلتصق بالنبات الأم ويحلّ محلها بعد موتها، وتستخدم هذه الخلفة الجديدة في الإكثار بعد أن تنمو وتصل إلى حجم معين، وتفصل حينئذ عن الأم مكونة بذلك فلقاسة صغيرة، أو رايزوماً صغيراً. أعناق ورق الموز لها أعمدة يلتصق بعضها حول بعض، مكونة الساق الهوائية الكاذبة، ولكلّ ورقة نصلّ كبير، ويوصف نبات الموز بأنه وحيد الإزهار، أي أنه يزهر مرة واحدة خلال دورة حياته، ثم يموت بعدها.

## الإزهار والإثمار

تظهر الأزهار في الموز على نحو عنقودي يعرف بالسنبله المركبة، التي تتكون من حامل الأزهار، وعنقود زهرية بترتيب حلزوني، ويتكوّن كلّ عنقود من ١٢-٢٠ زهرة في صفين، ويفصل كلّ عنقود عن الآخر قنابة حمراء.

بعد أن تنمو الخلفة الجديدة من الرايزوم (الفلقاسة) الأم، وبعد أن تكون عدداً معيناً من الأوراق (عندما يكون عمرها ١٣-١٥) شهراً، فإن برعمها الطرفي يبدأ بالتمايز من برعم خضري إلى برعم زهري، أي أنها تتوقف عن تكوين أوراق جديدة، بعد ذلك يبدأ البرعم الزهري بالنمو إلى أعلى داخل الساق الهوائية الكاذبة مكوناً السنبله المركبة، وبعد نحو (٣) أشهر من تكونها يظهر طرفه من قمة الساق الكاذبة لتبدأ بعدها بالتدلي إلى أسفل بسبب ثقلها.

تتكون كلّ زهرة من متاع وعدد من الأسدية، ويحمل عنقود الموز ثلاثة أنواع من الأزهار، على النحو الآتي:

① أزهار أنثوية في عنقيد، عددها من (٥-١٥) عنقوداً، تقع في الجزء القاعدي من

- المجموعة الثالثة: تدرس أجزاء نبات الموز جميعها لتعرّف كلّ من: العنقود الثمري، الكف، الأصابع.
- المجموعة الرابعة: تدرس التمايز الزهري في الموز من حيث مواعده مقارنة بكلّ من أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق والأشجار الدائمة الخضرة، وتبحث عن سبب توافر ثمار الموز في أسواقنا المحلية في معظم أيام السنة. يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.

- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.

- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح موحد لدى الطلبة جميعهم.

### مراعاة الضرووق الفردية

#### علاج

#### إثراء

- تكليف الطلبة البحث في شبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية عما يأتي:
  - المقصود بكل من: الفصيلة الموزية، والكورمة، والخلفات، والساق الهوائية الكاذبة، والسنبلة المركبة، ووحيد الأزهار، وثمره عنبه، والتمايز الزهري، ثم عرض ما يتوصلون إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية.
  - أضرار الصقيع التي تتعرض لها شجيرات الموز المزروعة في غور الأردن بين الحين والآخر، وطرق حماية الشجيرات منها.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٤٨)

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

- كتاب الإنتاج النباتي - المستوى الثاني.

#### مصادر التعلم

#### للمعلم

- Childers, N., Modern fruit science . U.S. Library of the Congress, ninth edition . 1983 and 2. Eagle Wood, Cliffs., plant Science, Growth, Development Utilization of Cultivated Plant. New Jersey: Printice Hall Inc.1991

#### للطالب

- فهمي شتات، بساتين التفاحيات واللوزيات والعنب والزيتون، وزارة الزراعة، عمان، ١٩٩٥م.
- فهمي شتات وآخرون، أشجار الفاكهة، ط٢، جامعة القدس المفتوحة، عمان الأردن، ٢٠٠٦م.

حامل الأزهار، إذ يكبر المتاع في هذه الأزهار، ليكون بعد ذلك ثمارًا، وتُعرف الأزهار بتجاوزًا بأنها أنثوية مع أنها تحتوي أشدية.


أزهار ثنائية الجنس في وسط العنقود، ولكنها غير كاملة الأعضاء الجنسية، وتُعرف بتجاوزًا بالأزهار المذكرة، مع أن لكل منها متاعًا قصيرًا، وندرًا ما تحوي متوكها حبوب لقاح.

أزهار مذكرة في طرف الأزهار العنقودي يفصل بعضها عن بعض قنابات حمراء، انظر الشكل (٢١-١) الذي يبين عنقود موز كامل التكوين، ولاحظ موقع الأزهار.



الشكل (٢١-١): عنقود موز.

تعرف ثمرة الموز بأنها عنبه تحتوي العديد من البويضات غير المخصبة، أي أنها لا تكوّن بذورًا، وتعقد الثمار بكرًا (من دون إخصاب)، ويبين الشكل (٢٢-١) مقطعًا طوليًا ومقطعًا عرضيًا في ثمرة الموز.



الشكل (٢٢-١): مقطع طولي ومقطع عرضي في ثمرة الموز.

يسمى العنقود الثمري الكف، والثمرة الواحدة الإصبع، ويتكون كل كف من نحو (١٥) إصبعًا، انظر الشكل (٤-٢٣) الذي يبين نبات الموز بأجزائه جميعها.

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى



## النتائج الخاصة

- يتعرّف الاحتياجات المناخية لشجيرات الموز.
- يصف التربة الملائمة لنمو الموز وإنتاجه.
- يتعرّف طرق تكثير الموز.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بتنفيذ المعلم جلسة مناقشة عامة عن الاحتياجات المناخية الملائمة لنمو أشجار الموز وإنتاجها والتربة الملائمة لذلك، ويمكن الاستعانة بالأسئلة الآتية: ما المنطقة المناخية التي تلائم نمو الموز؟ ما أنسب درجات حرارة لنموها؟ ما أثر ارتفاع درجات الحرارة عن درجة (٣٨)س أو انخفاضها أقل من (١٢)س في نمو الموز؟ لماذا لا يتحمل الموز الصقيع؟ ما أثر انخفاض الرطوبة الجوية في نمو شجيرات الموز؟ ما أثر الرياح القوية في الأوراق والساق الهوائية والجذور؟ ما المناخ الملائم لنمو أشجار الموز وإثمارها، وأثر التربة الملائمة في إنتاج الموز؟ ما درجة الملوحة في التربة لإنتاج الموز؟
- مناقشة إجاباتهم وتدوين الصحيحة منها على السبورة .

## التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بعمل مراجعة سريعة للحصة السابقة، ثم ينفذ المعلم جلسة لمناقشة موضوع التربة الملائمة لنمو الموز وإنتاجه، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما نوع التربة المثلى لنمو نبات الموز وإنتاجه؟ ما خصائص التربة المثلى لنمو نبات الموز وإنتاجه؟ ما مدى توافر التربة المثلى لنمو نبات الموز وإنتاجه في الأردن؟ ما درجة حموضة التربة (PH) الملائمة لنمو نبات الموز وإنتاجه؟ مناقشة إجابة الطلبة عن الأسئلة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## التعليم التعاوني/ العمل الجماعي

- تعرّف طرق تكثير الموز خضرياً على نطاق تجاري، يقدم المعلم عرضاً توضيحياً يتضمن طرق تكثير الموز خضرياً على نطاق تجاري، ثم يقسم



الشكل (١-٢٣): نبات الموز بأجزائه جميعها.

## فكر

ما موعد التمايز الزهري في الموز مقارنة بكل من أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق والدائمة الخضرة؟

لو تساءلنا عن سبب توافر ثمار الموز في أسواقنا المحلية معظم أيام السنة، لعلنا أنه لا يوجد وقت محدد من السنة لبدء التمايز الزهري في الموز، فهو يبدأ بالبرعم الطرفي حينما تصل شجرة الموز إلى حجم وعمر كافيين.

## المناقح

يبدأ نبات الموز بالنمو حينما تصل درجة الحرارة إلى ١٨س°، ثم يصل أعلى معدل له عند درجة حرارة ٢٧س°، وبعد ذلك ينخفض معدل النمو ليتوقف عند درجة ٣٨س°. والموز نباتي إستوائي لا يتحمل الصقيع؛ لأن انخفاض درجة الحرارة عن أقل من ١٢س° يضربه، ويؤدي إلى تخثر المادة السائلة البيضاء في خلاياه.

الطلاب إلى أربع مجموعات، ويهيئ البيئة الصفية المناسبة للعمل، كما يأتي:

- المجموعة الأولى: تدرس تكثير الموز خضرياً باستخدام الكورمة الكبيرة من حيث: المقصود بالكورمة، كيفية تكوّننها، كيفية زراعتها.
- المجموعة الثانية: تدرس تكثير الموز خضرياً باستخدام الفسائل (الخلفات) من حيث: المقصود بالفسائل (الخلفات)، كيفية تكوّننها، وكيفية زراعتها.
- المجموعة الثالثة: تدرس الفسائل من حيث حجمها، وتوضح المقصود بكل من الفسيلة الكبيرة، والبروز، وتحدد الأهداف من عملية تعقيم الفسائل أو الخلفات قبل زراعتها، وتبين كيفية تعقيم الفسائل أو الخلفات قبل زراعتها.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداؤهم.

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: قائمة رصد (١-٤٩)

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

- كتاب الإنتاج النباتي - المستوى الثاني.

#### مصادر التعلم

#### للمعلم

- Childers, N., Modern fruit science . U.S. Library of the Congress, ninth edition . 1983
- and 2. Eagle Wood Cliffs., plant Science, Growth Development, Utilization of Cultivated Plant New Jersey: Printice-Hall Inc.1991

#### للطالب

- فهمي شتات، بساتين التفاحيات واللوزيات والعنب والزيتون، وزارة الزراعة، عمان، ١٩٩٥م.
- فهمي شتات وآخرون، أشجار الفاكهة، ط٢، جامعة القدس المفتوحة عمان الأردن، ٢٠٠٦م.

#### حل المشكلات

تعرض شجيرات الموز المزروعة في غور الأردن بين الحين والآخر إلى أضرار الصقيع، ابحث في شبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية عن هذه المشكلة، وطرق حماية الشجيرات منها، واعرض ما تتوصل إليه، وناقشه مع زملائك.

تفضل زراعة الموز في الأماكن المشمسة، لأن زراعته في الأماكن الظليلة والأماكن المنخفضة الرطوبة تبطئ معدل النمو، وتضر به وتشقق ثماره، وتزيد معدل نتح الأوراق. ولا ينصح بزراعته في الأماكن التي يشتد فيها هبوب الرياح؛ لأنها تمزق الأوراق بسبب كبرها، وتكسر الساق الهوائية، وتلف الجذور.

#### التربة

تجود زراعة الموز في مدى واسع من أنواع التربة، على أن تكون جيدة التصريف، والمواد العضوية، والرطوبة الأرضية، ويفضل أن يقل محتوى التربة من الطين عن ٤٠٪، وأن يكون مستوى الماء الأرضي أكثر من متر، وأفضل درجة حموضة (pH) هي التي تتراوح بين ٥-٦.

#### طرق التكاثر

يكثر الموز خضرياً على نطاق تجاري باستخدام الأجزاء النباتية الآتية:

١. الكورمة الكبيرة: تزرع الكورمات بعد خلعها من البستان كاملة، أو تقسم إلى أجزاء، على أن يتوافر برعم أو برعمان في كل منها.
  ٢. الفسائل (الخلفات): الخلفات نباتات تنشأ من البراعم (العيون) الموجودة على الساق الأرضية (الكورمة)، وتزرع في البستان بعد فصلها مباشرة إذا كانت كبيرة، وتزرع في المشتل إذا كانت صغيرة في حفر عمقها ٢٥ سم، على أبعاد تبلغ ٧٥ سم في أنلام يبعد بعضها عن بعض ما يقرب من المتر، ثم تُخلع بعد مرور سنة على زراعتها في المشتل. وللفسائل أسماء، تبعاً لحجمها، على النحو الآتي:
١. الفسيلة الكبيرة: هي التي تكون على وشك الإثمار، وهي مفضلة عن غيرها من الفسائل، وبخاصة الصغيرة جداً.
  ٢. البزوز: هي الخلفات أو الفسائل الصغيرة جداً.
- ويفضل تعقيم الفسائل أو الخلفات قبل زراعتها؛ للتخلص من الأمراض الفطرية

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يتعرّف مسافات الزراعة المناسبة لبساتين الموز.
- يصف عمليات الخدمة اللازمة لبساتين الموز.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر / أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بتنفيذ المعلم جلسة لمناقشة موضوع مسافات الزراعة المناسبة لشجيرات الموز، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما العوامل التي تؤثر في تحديد مسافات الزراعة عند غرس فسائل الموز؟ كيف تؤثر المنطقة والصنف في اختيار مسافات الزراعة المناسبة عند غرس فسائل الموز؟ ما طرق زراعة فسائل؟ كم عدد الفسائل التي يمكن زراعتها في الدونم بالطريقة المستطيلة على أبعاد (٢×٢,٥) متر، أو بالطريقة المربعة بأبعاد (٢,٥×٢,٥) متر؟ احسب عدد نباتات الموز اللازمة لزراعة وحدة زراعية مساحتها (١٠٠) دونم بالطريقة المستطيلة؟ حدّد أبعاد حفر الزراعة (عرض × طول × عمق).
- مناقشة إجابات الطلبة، وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرّف عمليات الخدمة اللازمة لبساتين الموز، يقدم المعلم عرضاً توضيحياً يتضمن أهم هذه العمليات، ثم يقسم الطلبة إلى خمس مجموعات، كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تدرس عمليتي الحرث والعزق، وتجيّب عن الأسئلة الآتية: هل يكون الحرث في بساتين الموز عميقاً أم سطحياً، ولماذا؟ ما الهدف من إجراء عمليتي الحرث والعزق في بساتين الموز؟ ما المقصود بالخدمة النظيفة التي تُتبع في بساتين الموز؟ ما الهدف من إجراء الخدمة النظيفة في بساتين الموز؟ كيف تجرى الخدمة النظيفة في بساتين الموز؟
- المجموعة الثانية: تدرس عملية ريّ بساتين الموز، وتجيّب عن الأسئلة الآتية: لماذا يعد الريّ من العمليات المهمة في بساتين الموز؟ ما أثر تأخر الريّ مدة أسبوعين في النمو الخضري و الثمري لنباتات الموز؟ كم تقدر احتياجات الموز الأسبوعية من الماء؟ ما الطرق المتبعة في عملية الريّ؟
- المجموعة الثالثة: تدرس عملية تسميد بساتين الموز، وتجيّب عن الأسئلة الآتية: لماذا يجب زراعة الموز في الأراضي الخصبة؟ لماذا تعدّ إضافة السماد العضوي ضرورية حتى لو أضيفت الأسمدة الكيميائية؟ كم تقدر كمية السماد العضوي طن/دونم التي يجب إضافتها؟ كم تقدر احتياجات الموز

والنيماودا، ويكون ذلك بتقصيرها على ارتفاع ٢٥ سم، وبقص الساق الكاذبة، ووضعها في ماء ساخن في درجة ٦٠°س مدة ١٥-٢٠ دقيقة، ثم تترك بعدها مدة (٢٤) ساعة؛ كي تجفّ ولا تصاب بالعفن.

## ٥ مسافات الزراعة

تختلف مسافات الزراعة باختلاف المنطقة والصنف، ففي المناطق الشديدة الحرارة تقصّر المسافات، حتى يتسنى حماية الجذور السطحية من وهج الشمس، وبصورة عامة يمكن زراعة (١٠٠-٢٠٠) فسيلة (خلفة)/دونم، بالطريقة المستطيلة على أبعاد ٢,٥×٢,٥م، أو بالطريقة المربعة على أبعاد ٢,٥×٢,٥م. أما أبعاد حفر الزراعة فهي ١م × ١م × ١م (عرض × طول × عمق).

## تطبيقات

احسب عدد نباتات الموز اللازمة لزراعة وحدة زراعية مساحتها ١٠٠ دونم بالطريقة المستطيلة.

## ٦ عمليات الخدمة

تشمل خدمة بساتين الموز العمليات الآتية:

- ١ العزق: نظراً إلى أن جذور رايزوم الموز سطحية فإنه يسهل تلفها، نتيجة لإجراء الحرث العميق، ولذلك يجب أن يكون الحرث سطحياً عند مقاومة الأعشاب، ويمكن استخدام الخدمة النظيفة Clean Cultivation في بساتين الموز، إما يدوياً بإزالة الأعشاب، وإما كيميائياً باستخدام مبيدات الأعشاب، وفي هذه الحالة يمكن استخدام المبيدات قبل ظهور الأعشاب، مثل: اترازين Atrazine، أو باستخدام مبيدات لها تأثير قبل ظهور الأعشاب وبعد ظهورها، مثل كلوروبروميورون Chlorobromuron، أما مبيدات باراكوت Paraquat فيمكن استخدامها فقط بعد ظهور الأعشاب.
- ٢ الري: يعدّ الريّ من العمليات المهمة في بساتين الموز؛ بسبب كبر حجم الأوراق، وزيادة معدل النتح، لذا يجب ملاحظة أن التأخر في الريّ مدة أسبوعين يؤثر سلباً في المحصول، ويحدث أضراراً بالغة تشمل النمو الخضري و الثمري. وتقدر احتياجات الموز الأسبوعية من الماء بـ ٢٥ سم، ويمكن استعمال أغلب طرق الريّ المعروفة التي تشمل الغمر، والأحواض، والخطوط والريّ الرذاذي.

٩٠

من العناصر الغذائية من (N,P,K) على الترتيب للدونم الواحد لكل (١٠٠٠) كغم ثمار؟ لخص أعراض نقص العناصر التي تظهر على شجيرات الموز.

● المجموعة الرابعة: تدرس عملية الحف في بساتين الموز من حيث: الهدف من إجرائها، وكيفية إجرائها.

● المجموعة الخامسة: تدرس الهدف من إجراء كلٍّ من العمليات الآتية لنباتات الموز: التقليم، إزالة، بقايا الأزهار، إزالة الأوراق التي تعارض نمو العنقود الزهري، تدعيم الموز، تكويم التراب، إزالة البرعم الذكري، تكييس السباطات، إزالة آخر كفوف السباطات.

- يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.

- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.

- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح موحد لدى الطلبة جميعهم

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف الطلبة حساب عدد نباتات الموز اللازمة لزراعة وحدة زراعية مساحتها (١٠٠) دوئم بالطريقة المربعة.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير لفظي (١-٥٠)
- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: سجل وصف سير التعلم (١-٥١)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

– كتاب الإنتاج النباتي – المستوى الثاني.

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- مجلة المهندس الزراعي، العدد الخاص بالمؤتمر الزراعي الوطني الثاني، العددان (٦٩-٧٠)، نقابة المهندسين الزراعيين، عمان، الأردن، حزيران، ٢٠٠١م.
- Hartman, H., Kester, D., davies, F. and Geneve, R. Plant propagation : principles and practices ,7th edition . 2002
- George,A.Cquaah.Horticulture Principles and practices.Pearson Prentice Hall. 2005

#### للطالب

- خليل جرن، دليل المزارع السنوي، وزارة الزراعة، عمان، الأردن، ٢٠٠٨م.
- محمد زين، الموسوعة الزراعية : الفاكهة والأشجار المثمرة، دار الطريق للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٠م.

التسميد: يفضل الموز الأراضي الخصبة، ولذلك يجب إضافة السماد العضوي إلى الأراضي المزروعة به حتى لو أضيفت الأسمدة الكيميائية، ليصبح محتوى التربة منه في حدود ١٪ على الأقل، ثم يضاف ٥-٢ طن/دوئم ليصبح نسبته في التربة ١٣ أو ١٤٪. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يكون مزارع الموز على علم ودراية ومعرفة بأعراض نقص العناصر التي تظهر على شجيرات الموز، وهي التي لخصها العالم سامسون كما يأتي:

العنصر	أعراض النقص
النيتروجين	أوراق شاحبة اللون، صغيرة الحجم، ومتقرمة
الفسفور	أوراق ذات لون أخضر داكن، يصاحبه ضعف في تكوّن الأوراق الجديدة، واصفرار هامشي Marginal chlorosis
الكالسيوم	اصفرار الأوراق الصغيرة
البوتاسيوم	نقصان النمو، وسرعة اصفرار الأوراق المسنة
المغنيسيوم	يقع أرجوانية على أعناق الأوراق
الحديد	اصفرار بين عروق الأوراق الصغيرة
المنغنيز	اصفرار جانبي بين عروق الأوراق الصغيرة
الخاصين	أوراق رفيعة، وتقرم النبات
النحاس	تدلي الأوراق لتأخذ شكل المظلة.

وللوقوف على حالة بستان الموز الغذائية فإنه ينصح بإجراء تحليل كيميائي للأوراق، فقد دلت التجارب على أنه إذا كان محتوى الأوراق من عناصر النيتروجين، والفسفور، والبوتاسيوم ٢،٦٪، ٠،٢٪، ٣،٣٪ على الترتيب فإن حالة النبات الغذائية جيدة.

الخف: يهدف الخف إلى إزالة الرايزومات (الخلفات) غير المرغوب فيها التي تتره في الصيف أو الشتاء، إذ ينتج الأول (في الصيف) ثماراً رديئة الجودة، تنضج ثمارها في وقت لا تستطيع فيه منافسة ثمار الفواكه الأخرى، مثل التفاحيات، واللوزيات، والعنب، أما الثاني (في الشتاء) فيتأثر بالصقيع. وتوجد طريقتان لإزالة الرايزومات، هما:

١. فصل الرايزوم كلياً عن الأم، وذلك بواسطة سكين مقوسة خاصة.
٢. تقصير الرايزوم إلى مستوى سطح الأرض بعد أن يُقَدَّر بسكين لإحداث فراغ،

٩١

ثم يضاف الكيروسين في ذلك الفراغ، وقد يعتمد بعض المزارعين إلى إضافة أحد المنظمات الحيوية، مثل 2-4-D.

التقليم: ينحصر التقليم في الموز بإزالة الأوراق الجافة وتلك التي يتعارض وجودها مع نمو العقود الزهري، والخلفات غير المرغوب فيها، وطرف العقود الزهري؛ لاحتوائه على الأزهار المذكرة.

إزالة بقايا الأزهار: تشمل هذه العملية إزالة السبلات والبتلات في بعض أصناف موز الكافنديش Cavendish.

إزالة الأوراق التي تعارض نمو العقود الزهري: إن قرب الأوراق من العقود الزهري يحدث احتكاكاً بينها وبين الثمار في أثناء نموها، مما يسبب وجود ندب عليها، ولذا يجب إزالة تلك الأوراق، أو تجميعها جانباً.

تدعيم الموز (وضع الدعائم): كما في الشكل (١-٢٤): تجرى هذه العملية لحماية أشجار الموز من الوقوع، بسبب الإثمار، أو الرياح، إذ توضع دعائمان لكل شجرة، تشكلان معاً مثلثاً.



الشكل (١-٢٤): تدعيم الموز.

- ١. تكويم التراب: يكوم التراب حول ساق الموز الكاذبة، وذلك لحمايتها من الرياح.
- ٢. إزالة البرعم الذكري: إن إزالة طرف العقود الزهري، أو ما يعرف بالبرعم الذكري يحسن الإثمار.
- ٣. تكتيس السباطات: تكتيس سباطات الموز بأكياس بلاستيكية، على أن يترك طرفها من دون إغلاق، وتكون متدلية إلى الأسفل، وتجري هذه العملية لحماية السباطات من الغبار، ولسعة الشمس، وبقايا مبيدات الآفات والطيور، ويسهم التكتيس في رفع درجة الحرارة

٩٢

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى



## النتائج الخاصة

- يتعرّف أكثر الآفات شيوعاً في بساتين الموز.
- يتعرّف أهم أصناف الموز الموجودة في الأردن.
- يصف عمليتي نضج ثمار الموز وجنيها.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر / أسئلة وأجوبة

- التمهيد للحصة: ينفذ المعلم جلسة لمناقشة أبرز الآفات شيوعاً في بساتين الموز، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما أكثر الأمراض شيوعاً في بساتين الموز؟ ما أكثر الحشرات التي تهاجم شجيرات الموز؟
- مناقشة إجابات الطلبة، وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.
- التعلم التعاوني / العمل الجماعي
- لتعرّف أصناف الموز الشائعة محلياً، يعرض المعلم الشكل (١-٢٥)، ثم يكلف الطلبة ضمن المجموعات ما يأتي:
- المجموعة الأولى: تدرس صنف الموز البلدي من حيث: ميزاته وصفاته.
- المجموعة الثانية: تدرس صنف الموز (باز) من حيث: ميزاته وصفاته.
- المجموعة الثالثة: تقارن بين صنف الموز البلدي وباز من حيث طول الساق، والأصابع.
- المجموعة الرابعة: تكتب تقريراً عن أصناف الموز الشائعة في منطقتها مستعينة بالمراجع وأدلة الشركات المستوردة، وتعرض ما تتوصل إليه وتناقشه مع الطلبة.
- يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.
- التعلم التعاوني / العمل الجماعي
- لتعرّف عمليتي نضج ثمار الموز وجنيه يقدم المعلم عرضاً توضيحياً يتضمن عمليتي نضج ثمار الموز وجنيه، ثم يكلف الطلبة ضمن المجموعات ما يأتي:
- المجموعة الأولى: تدرس أهمية مراعاة بُعد السوق عن مكان الإنتاج عند قطف الموز.

حول السباطات بمقدار درجة إلى درجتين؛ مما يكرّ الإنتاج ويزيده.

● إزالة آخر كفوف السباطات: في هذه العملية تزال آخر كفّ في السباطة مبكراً؛ لأن ذلك يزيد وزنها.

## الآفات

تتعرض شجيرات الموز للإصابة بأمراض وحشرات عدّة، من أهمها: الحشرة القشرية الحمراء، ودودة ورق القطن، والبقّ الدقيقي، وتوزّد القمة، وعفن طرف السيجار، والذبول البكتيري، والديدان الثعبانية، ومرض بنما.

## الأصناف

أصناف الموز، كما في الشكل (١-٢٥): من أصناف الموز الشائعة محلياً:

- البلدي: هو من أصناف موز كافنديش، قصير الساق، وثماره صغيرة، وغني بالمواد السكرية، ورائحته معطرة، وطعمه فاخر، وقناباته مستديرة في نهاية العنقود الزهري.
- باز (Paz): أصغر أصناف الموز، ساقه أطول من ساق الموز البلدي، وأصابعه أطول قليلاً من أصابع الموز البلدي.



الشكل (١-٢٥): من أصناف الموز الشائعة محلياً.

## النضج

يجب ملاحظة أن الموز يقطف أخضر بصرف النظر عن المنطقة التي يزرع فيها، والمدة اللازمة لوصول الثمار إلى مرحلة النضج، وعند قطفه ينبغي مراعاة بعد السوق عن مكان الإنتاج، على النحو الآتي:

- الأسواق المحلية: تقطف سباطات الموز عندما تكون خضراء تامة النضج، ويستدل على ذلك من استدارة أصابع الكفوف جميعها، وتقارب بعضها من بعض، وبدء جفاف الأزهار الخشن والمذكرة، وتغيّر لون الأصابع من الأخضر الداكن إلى الأخضر الرائق.

٩٣

- المجموعة الثانية: تدرس الأمور التي يجب مراعاتها عند قطف الموز لإرساله إلى الأسواق المحلية.
- المجموعة الثالثة: تدرس الأمور التي يجب مراعاتها عند قطف الموز لإرساله إلى الأسواق البعيدة والتصدير إلى الخارج.
- المجموعة الرابعة: تدرس خطوات قطف الموز.
- المجموعة الخامسة: تدرس إنضاج الموز، وتجيّب عن الأسئلة الآتية: ما المعايير التي تحدّد مرحلة نضج ثمار الموز؟ ما الغاز الذي ينطلق في أثناء عملية إنضاج الموز؟ بين كيفية إنضاج ثمار الموز؟ ما التغيرات التي تحدث في أثناء إنضاج الموز؟
- المجموعة السادسة: تزور أحد مخامر الموز، وتعدّ تقريراً عن إنضاج الموز صناعياً، وتناقشه مع الطلاب.
- يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى



## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف بعض الطلبة زيارة أحد مخامر الموز، ثم كتابة تقرير عن إنضاج الموز صناعياً وعرض ما يتوصلون إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية، ومناقشة ذلك مع زملائهم.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: قلم وورقة
- أداة التقويم: اختبار (١-٥٢)
- استراتيجية التقويم: الملاحظة
- أداة التقويم: السجل القصصي (١-٥٣)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

– كتاب الإنتاج النباتي – المستوى الأول.

## مصادر التعلم

### للمعلم

### للطالب

الأسواق البعيدة والتصدير إلى الخارج: تقطف سباطات الموز وهي في مرحلة تعرف بـ "ثلاثة أرباع استدارة" ("Three quarters full")، تكون بعض أصابع الموز عندئذ ذات زوايا؛ كي تتحمل النقل إلى مسافات بعيدة، ويفضل استخدام مقاييس أو علامات أخرى للنضج.

خطوات قطف الموز: تقطف سباطات الموز وفق الترتيب الآتي:

١. إزالة الدعامات.
٢. تحديد السباطات الجاهزة للقطف، إذ يقوم القاطف بحزّ الساق الكاذبة بسكين خاصة، ثم يقوم مساعد القاطف بقطف السباطة، ووضعها على عربة، وبعد ذلك تزال الساق الكاذبة جميعها على مستوى سطح الأرض، أو تقصر إلى ما يقرب من المتر (علّل ذلك).
٣. يقوم حامل السباطات بنقلها إلى مكان التحميل، وذلك باستخدام إحدى وسائل النقل المتوافرة داخل المزرعة.

تجهيز سباطات الموز: يشمل تجهيز سباطات الموز عالمياً الخطوات الآتية:

١. تعليق السباطات بعد وصولها إلى محطات التعبئة والتجهيز، ثم تفصل إلى كفوف بالسكين.
٢. توضع الكفوف في خزانات ماء مدة ٨-١٠ دقائق، لإزالة المادة العصارية اللزجة الناتجة من عملية الفصل.
٣. تغمر الكفوف في محلول فطري، وذلك لوقف نمو الفطريات، ثم تترك بعد ذلك لتجف.
٤. تعبأ الكفوف في أوعية كرتونية مثقبة، سعة كل منها ١٨ كغم، وتحاط بالقش أو البلاستيك المثقب؛ ثم تنقل مبرّدة في درجة تقرب من درجة حرارة ١١-١٣°س.
٥. تفرغ الحمولة وتنقل الأوعية إلى المخامر؛ لإنضاج الموز عُقب وصول الثمار إلى المكان المخصص.

إنضاج الموز: كيف تُضج ثمار الموز؟ يكون ذلك في مخامر خاصة بإحدى الطريقتين:

١. الإنضاج بالحرارة: ترفع درجة الحرارة في مخمر الموز بحيث تكون بين ٢٠-٢٦°س، ورطوبة ٨٥٪/مدة ٣٦-٩٦ ساعة.
٢. الإنضاج بالغازات: يُضج الموز في غرفة محكمة الإغلاق تتراوح درجة حرارتها بين

٩٤

١٨-٢٠°س، وترفع نسبة الرطوبة إلى ٩٠٪ مع انبعاث غاز الأثيلين (Ethylene) في جوّ المخمر من إحدى المواد، مثل: إثريل (Ethrel)، أو إيثفون (Ethephon).

### زيارة ميدانية

زر أحد مخامر الموز، واكتب تقريراً عن إنضاج الموز صناعياً، واعرض ما تتوصل إليه، وناقشه مع زملائك.

### التقويم

- ١- اذكر أنواع أزهار الموز الثلاث، ثم حدّد أماكن وجود كلٍّ منها على النبات.
- ٢- بين الاحتياجات المناخية للموز، ثم اذكر المناطق الملائمة لزراعته في الأردن.
- ٣- أيّ طرق التكاثر تفضل لزراعة الموز؟ ولماذا؟
- ٤- احسب عدد نباتات الموز اللازمة لزراعة وحدة زراعية مساحتها ٣٠ دونماً بالطريقة المربعة.
- ٥- اذكر الأهداف التي يسعى لتحقيقها مزارعو الموز عند إجرائهم العمليات الآتية:
  - أ - التقليم.
  - ب - تكييس القظوف وهي على أمهاتها.
  - ج - إزالة آخر كف من القطف.
  - ٦- علّل ما يأتي:
    - أ - ضرورة عزق بستان الموز سطحيّاً.
    - ب - انخفاض الرطوبة الجوية له تأثير ضار في الثمار.
    - ج - توافر الموز المحلي في السوق على مدار السنة.
- ٧- يرغب مزارع موز في تصدير محصوله إلى خارج الأردن، واستشارك لتحديد مرحلة النضج الواجب قطف الثمار عندها، فبمّ تشير عليه؟

٩٥

## النتائج الخاصة

- يحدد الفسائل المناسبة لفصلها عن الأم.
- يفصل الفسائل عن الأم.
- يزرع الفسائل التي فصلتها.
- يصف نباتات الموز نباتياً.
- يميز نباتات الموز نباتياً.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم عن طريق النشاط/ التدريب

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (١-١٢)، كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تحدد الفسائل المناسبة لفصلها عن الأم حينما تصل إلى الحجم المناسب.
- المجموعة الثانية: تفصل الفسائل عن الأم، وتحفر حول الفسيلة، وتزيل التراب أولاً بأول حتى تتكشف الفسيلة، وتستمر في الحفر حول الفسيلة إلى أن تظهر منطقة اتصالها بالنبات الأم، وتفصل الفسيلة عن النبات الأم بالسكين من مكان اتصالها، وتعيد التراب إلى مكانه، تلف الفسيلة المفصولة عن الأم بالخييش المبلل وتربطها.
- المجموعة الثالثة: تزرع الفسائل التي فصلت.
- بعد تنفيذ المهام يعرض مقرر والمجموعات العمل، ثم يجري المعلم مقارنة بينها، لاستخلاص الإجابة الصحيحة عن طريق المناقشة والحوار.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم، ويجب عن تساؤلات الطلبة في أثناء العمل.
- مناقشة إجابات الطلبة، وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.
- تكليف مقرر كل مجموعة إرجاع الأدوات والمواد إلى مكانها.
- التعلم عن طريق النشاط/ التدريب
- تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (١-١٣) كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تتفحص الجزء الأرضي من نبات الموز، وتلاحظ أنه ساق أرضية متحورة، وتلاحظ الرايزومات التي تخرج من تفتح البراعم الجانبية. وتلاحظ وجود برعم كبير في قمة هذا الجزء الأرضي تنتج الأوراق منه، وأن


- يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:
- تحدد الفسائل المناسبة لفصلها عن الأم.
- تفصل الفسائل عن الأم.
- تزرع الفسائل التي فصلتها.

## المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

- أمهات موز. ● خيش. ● إزميل طويل. ● مطرقة. ● سكين.

## الرسوم التوضيحية

## خطوات العمل والنقاط الحاسمة



الشكل (١): طريقة فصل الفسيلة.

- ١- حدد إحدى الفسائل المراد فصلها عن النبات الأم حينما تصل إلى الحجم المناسب.
- ٢- احفر التربة حول الفسيلة، وتجنّب قطع الجذور، وأزل التراب الناتج أولاً بأول، حتى تتكشف الفسيلة.
- ٣- استمر في الحفر حول الفسيلة إلى أن تظهر منطقة اتصالها بالنبات الأم.
- ٤- افصل الفسيلة عن النبات الأم بالسكين من مكان اتصالها، انظر الشكل (١).
- ٥- أعد التراب المحفور إلى مكانه.
- ٦- لفّ الفسيلة المفصولة عن الأم بالخييش المبلل، واربطها.
- ٧- ازرع الفسيلة في المكان المخصص، بحيث يكون أكبر قطرًا على مستوى سطح التربة.

## التقويم

- ١- عدّد خمسة نباتات تتكاثر بالفسائل.
- ٢- ما الموعد المناسب لفصل الفسائل وزراعتها؟
- ٣- اذكر مزايا التكثير بالفسائل وعيوبه.

## الجذور العرضية الموجودة في قاعدة الساق الأرضية.

- المجموعة الثانية: تتفحص الساق الهوائية، وتعمل مقطعاً عرضياً في الساق الكاذبة، وتلاحظ ترتيب الأوراق، وأنه من الداخل (وسط الساق الكاذبة) تنمو النورة من البرعم الطرفي في الساق الأرضية الحقيقية.
- المجموعة الثالثة: تتفحص نصل الورقة الخارجية، وتلاحظ أنه كبير جداً، وتلاحظ وجود انخفاضات عديدة عن سطح الورقة، وتحدد مواقع الثغور، وتلاحظ نظام تعرق الأوراق.
- المجموعة الرابعة: تتفحص النورة، وتلاحظ تدليها إلى أسفل. وتتفحص الزهيرات وتلاحظ جنسها، والحامل النوري وعناقيد الأزهار، وتحدد نوعه؟ ومكونات كل عنقود، وتلاحظ الأزهار الأنثوية والأزهار المذكرة، وتحدد موقع كل منهما.
- المجموعة الخامسة: تتفحص ثمرة موز، وتلاحظ أنها عنبية، وتعمل مقطعاً عرضياً لثمرة الموز، وتلاحظ البويضات داخلها، وخلو الثمرة من البذور، وتعد الثمار في كل كف، ثم تحسب متوسط عددها.
- بعد تنفيذ المهام تعرض مقرر والمجموعات العمل لاستخلاص الإجابة الصحيحة عن طريق المناقشة والحوار.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.

### مراعاة الضروك الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف الطلبة بالآتي:

- تكثير نباتات الموز بالفسائل باستخدام ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.
- رسم الأجزاء النباتية التي تفحصوها وكتابة اسم كل جزء على الرسم.
- عمل مقطع عرضي في ثمار الموز، وتعرّف أجزائها.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٥٤)
- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٥٥)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسى

– كتاب الإنتاج النباتي – المستوى الأول.

### مصادر التعلّم

#### للمعلم

- George, A. Cquaah. Horticulture Principles and practices. Pearson Prentice Hall. 2005

#### للطالب

- طه عبدالله نصر، إكثار أشجار الفاكهة / القواعد العلمية والأساليب العصرية، مكتبة المعارف الحديثة، الإسكندرية، ٢٠٠٣ م.
- سلام أيوب، الدليل الفني لتطعيم الأشجار المثمرة، المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٦ م.

### تمييز نباتات الموز

التجارب	التمرين (١-١٣)
يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– تصف نباتات الموز نباتيًا.</li> <li>– تميّز نباتات الموز نباتيًا.</li> </ul>
المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بستان موز .</li> <li>• أو نبات موز كامل .</li> <li>• سكين.</li> </ul>
خطوات العمل والنقاط الحاسمة	<p>١- تفحص الجزء الأرضي من نبات الموز، كما في الشكل (١)، ولاحظ أنه ساق أرضية متحوّرة للتخزين. ماذا يسمى؟</p> <p>أ - لاحظ الريزومات التي تخرج من تفتح البراعم الجانبية.</p> <p>ب- لاحظ وجود برعم كبير في قمة هذا الجزء الأرضي ينتج الأوراق من نموه، ماذا يسمى؟</p> <p>ج- لاحظ الجذور العرضية الموجودة في قاعدة الساق الأرضية.</p> <p>٢- تفحص الساق الهوائية، ولاحظ أنها أعناق الأوراق الملتفة، ولذا تسمى ساقًا كاذبة.</p> <p>٣- اعمل مقطعًا عرضيًا في الساق الكاذبة، لاحظ ترتيب الأوراق، كما في الشكل (٢)، ماذا يسمى هذا النوع من ترتيب الأوراق؟</p>
الرسوم التوضيحية	<p>الشكل (١): خلفه الموز.</p> <p>الشكل (٢): ترتيب أوراق الموز.</p>

٩٧



الشكل (٣): مكان نمو النورة في الموز.



الشكل (٤): عقود الموز.



الشكل (٥): مقطع عرضي لثمرة الموز.

- ٤- لاحظ أنه من داخل (وسط الساق الكاذبة) تنمو النورة من البرعم الطرفي في الساق الأرضية الحقيقية، كما في الشكل (٣).
- ٥- تفحص نصل الورقة الخارجية، ولاحظ أنه كبير جدًا، لاحظ وجود انخفاضات عديدة عن سطح الورقة تمثل مواقع الثغور، علام تدل كثرة الثغور؟ لاحظ نظام تفرع الأوراق، ماذا تنتج منه.
- ٦- تفحص النورة، وهي سنبله مركبة، ولاحظ تدليها إلى أسفل. افحص الزهيرات، ولاحظ جنسها، والحامل النوري وعناقيد الأزهار، ما نوعه؟ ومم يتكون كل عقود؟ انظر الشكل (٤).
- ٧- لاحظ الأزهار الأنثوية والأزهار المذكرة، وحدد موقع كل منها.
- ٨- افحص ثمرة موز، ولاحظ أنها عنبية.
- ٩- اعمل مقطعًا عرضيًا لثمرة الموز، ولاحظ البويضات في داخلها، ولاحظ خلو الثمرة من البذور، انظر الشكل (٥).
- ١٠- عدّ الثمار في كل كفة، ثم احسب متوسط عددها.

### التقويم

- ١- لماذا تسمى ساق الموز ساقًا كاذبة؟
- ٢- حدّد مواقع الأزهار المذكرة، والأزهار المؤنثة في نورة الموز.
- ٣- علّل خلو ثمار الموز من البذور.

٩٨

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يقلم نباتات الموز.
- يربي خلفات موز حول النبات الأم.
- يجني محصول الموز.
- ينضج ثمار الموز صناعياً.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (١-١٤)، كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تقلّم النباتات التي أثمرت، وتعمل حزراً في الساق بالسكين على ارتفاع (٣٠-٤٠) سم عن سطح الأرض حتى تستمر الأوراق في تغذية الخلفات الصغيرة.
- المجموعة الثانية: تقص الساق بمحاذاة سطح التربة.
- المجموعة الثالثة: تقلّم النباتات التي لم تثمر بعد (الخلفات)، وتزيل الأوراق الجافة.
- المجموعة الرابعة: تزيل الأوراق التي تعارض العنقود الزهري.
- المجموعة الخامسة: تحدد عدد الخلفات حول النبات الأم، وتترك (٢-٣) منها، وتزيل الباقي بتقوير الرايزوم بوساطة سكين؛ للتخلص من البرعم الطرفي، أو بفصلها بأكملها عن النبات الأم.
- بعد تنفيذ المهام يعرض مقرر والمجموعات العمل، ثم يجري المعلم مقارنة بينها، لاستخلاص الإجابة الصحيحة عن طريق المناقشة والحوار.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.
- يجيب المعلم عن تساؤلات الطلبة في أثناء العمل.
- مناقشة إجابات الطلبة، وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.
- تكليف مقرر كل مجموعة إرجاع الأدوات والمواد إلى مكانها.
- التعلم عن طريق النشاط / التدريب
- تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (١-١٥) كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تحدد مرحلة الجني، وذلك عندما تستدير المقاطع

- يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادراً على أن:
- تقلّم نباتات الموز.
- تربي خلفات الموز حول النبات الأم.
- المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات
- مقصّ تقليم . ● سكين معكوفة . ● بستان موز .



- ١- النباتات التي أثمرت:
  - أ - حُرّ الساق بالسكين على ارتفاع ٣٠-٤٠ سم عن سطح الأرض؛ لكي تستمر الأوراق في تغذية الخلفات الصغيرة.
  - ب- قصّ الساق، بحيث تكون بمستوى سطح التربة، وانتظر مدة شهر.
- ٢- النباتات التي لم تثمر بعد (الخلفات):
  - أ - أزل الأوراق الجافة.
  - ب- أزل الأوراق التي تعارض العنقود الزهري.
  - ج- حدّد عدد الخلفات حول النبات الأم، واركب اثنين أو ثلاثاً منها، وأزل الباقي بتقوير الرايزوم بوساطة السكين؛ للتخلص من البرعم الطرفي، أو بفصلها كلياً من النبات الأم.

- ١- ما عدد الخلفات التي يجب تركها حول نبات الموز؟
- ٢- لماذا قصّ ساق الموز بالتدريج؟

العرضية لأصابع الموز وتختفي زواياها.

- المجموعة الثانية: تجني القطوف المثمرة بقصها من قاعدتها، وتزيل البرعم الذكري من نهاية قطف الموز بالسكين. وتضع القطوف في وضع رأسي في مكان ظليل تمهيداً لنقلها، بحيث تكون حواملها إلى الأعلى.
- المجموعة الثالثة: تنضج الموز، وتقسم قطف الموز إلى كفوف.
- المجموعة الرابعة: غمس الكف في محلول إيثريل أو إيثفون ذي تركيز (١٠٠) جزء في المليون مدة دقيقة.
- المجموعة الخامسة: تضع الكف بعد غمسه في المحلول في كيس بلاستيكي أسود وتغلق فوهته.
- المجموعة السادسة: تضع الكيس بعد إغلاقه في غرفة مدة (٤ - ٥) أيام، وتراقب التغيرات.
- تدوير عمل المجموعات، وتصويب إجراءات العمل من قبل المعلم.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى



### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف بعض الطلبة ما يأتي:

- تقليم نباتات الموز التي أثمرت، باستخدام ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.
- تقليم نباتات الموز التي لم تثمر، باستخدام ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٥٦)
- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٥٧)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- خليل جرن ، دليل المرشد الزراعي في تربية وتقليم الأشجار المثمرة، مديرية الإرشاد الزراعي، عمان، ٢٠٠٧م.

#### للطالب

- عواد حسين، ماجدة بهجت، الخصائص العامة للحاصلات البستانية بعد الحصاد وعلاقتها بالتكنولوجيا المستخدمة في التداول بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية ستامفورد أنكتكت – الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٧م.

التحجرات	التمرين (١-١٥)
يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– تجني محصول الموز.</li> <li>– تُضج ثمار الموز صناعيًا.</li> </ul>
المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات	<ul style="list-style-type: none"> <li>● سكين. ● وعاء. ● إيثريل. ● (أو محلول إيثون ١٠٠ جزء بالمليون). ● كيس بلاستيكي أسود.</li> <li>● ثمار موز ناضجة.</li> </ul>
خطوات العمل والنقاط الحاكمة	<ol style="list-style-type: none"> <li>١- تحديد مرحلة الجني: يحين وقت الجني عندما تستدير المقاطع العرضية لأصابع الموز، وتختفي الزوايا منها.</li> <li>٢- جني القطوف، كما في الشكل (١): <ol style="list-style-type: none"> <li>أ - اقطع الحامل الثمري بقصه من قاعدته.</li> <li>ب - أزل البرعم الذكري من نهاية قطف الموز بالسكين.</li> <li>ج - ضع القطوف في وضع رأسي في مكان ظليل مهيأ لنقلها، بحيث تكون حواملها إلى أعلى.</li> </ol> </li> <li>٣- إنضاج الموز: <ol style="list-style-type: none"> <li>أ - قسم قطف الموز إلى كغوف.</li> <li>ب - اغمس الكف في محلول إيثريل، أو إيثون، بحيث يكون تركيزه ١٠٠ جزء في المليون، مدة دقيقة.</li> <li>ج - ضع الكف بعد غمسه في المحلول في كيس بلاستيكي أسود، وأغلق فوهته.</li> <li>د - ضع الكيس بعد إغلاقه في غرفة، لمدة (٤ - ٥) أيام، وراقب التغيرات في: <ul style="list-style-type: none"> <li>● لون قشرة الأصابع من الأخضر إلى الأصفر.</li> <li>● طعم الثمار من النشوي إلى السكري.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>
الرسوم التوضيحية	 <p>الشكل (١): جني القطوف.</p>

#### التقويم

- ١- ما المعايير الواجب توافرها لإنضاج ثمار الموز؟
- ٢- ما الغاز الذي ينطلق في أثناء عملية إنضاج الموز؟
- ٣- ما التغيرات التي تحدث في أثناء عملية إنضاج الموز؟



## النتائج الخاصة

- يتعرّف الفصيلة التي ينتمي إليها الزيتون.
- يصف نبات الزيتون نباتياً.
- يوضح المقصود بكل من : الفصيلة الزيتية، التحليق، ثمرة حسلة، التمايز الزهري.
- يتعرّف طبائع الإزهار والإثمار في الزيتون.
- يصف عمليتي تلقيح الزيتون وإخصابه.

## المفاهيم والمصطلحات

الفصيلة الزيتية، التحليق، ثمرة حسلة، التمايز الزهري.

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بتوظيف خبرات الطلبة السابقة وطرح الأسئلة الآتية: ما اسم الفصيلة التي ينتمي الزيتون لها؟ ما اسم النوع الذي تتبع شجرة الزيتون له؟ ما اسم الجنس الذي تتبع شجرة الزيتون له؟ ما الاسم العلمي للزيتون؟ هل يصنّف الزيتون من أشجار الفاكهة الدائمة الخضرة، أم من أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق؟ مناقشة إجابات الطلبة، وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## التعلم التعاوني/ العمل الجماعي

- لتعرف الإزهار والإثمار في الزيتون، يعرض المعلم الشكل (١-٢٦)، ثم يكلف المعلم الطلبة ضمن المجموعات ما يأتي:
- المجموعة الأولى: تحدد أماكن حمل البراعم الزهرية في الزيتون، وتحدد نوع النورة الناتجة من تفتح البرعم الزهري، وعدد أزهار النورة الواحدة.
- المجموعة الثانية: تحدد أنواع الأزهار في الزيتون.
- المجموعة الثالثة: تجيب عن السؤال الآتي: لا توجد أزهار مؤنثة في أشجار الزيتون، فكيف تتكون الثمار؟
- المجموعة الرابعة: تدرس التمايز الزهري من حيث: مفهومه، وزمن بدئه، والعوامل التي تؤثر في التمايز الزهري.
- المجموعة الخامسة: تبحث في مصادر البحث المتاحة (كتب، أو مواقع إنترنت، وغيرها) عن عملية التحليق في أشجار الزيتون، وتعدّ تقريراً يتضمن ما يأتي: المقصود بالتحليق، وكيفية إجرائه، وفوائده.
- عرض النتائج بوساطة برمجية العروض التقديمية ومناقشته مع الطلاب.
- يقدم منسق كل مجموعة ما توصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

## خامساً الزيتون

ينتمي الزيتون إلى الفصيلة الزيتية (Oleaceae)، واسمه العلمي (Olea europaea L). وشجرة الزيتون من أشجار الفاكهة الدائمة الخضرة، يمكنها العيش أكثر من ألف سنة، خشبها مقاوم للعفن، وتستطيع تكوين جذع جديد من منطقة الجذور في حالة موت مجموعها الخضري.

## الإزهار والإثمار

تحمل البراعم الزهرية في الزيتون جانبياً على فروع عمرها سنة، وقد تحمل بعض البراعم على فروع عمرها سنتان، وينتج من تفتح البرعم الزهري الواحد نورة عنقودية من النوع الجرابي، ويبلغ عدد أزهار النورة الواحدة ١٢-١٨ زهرة، كما في الشكل (١-٢٦)، ويختلف ذلك باختلاف الأصناف.



الشكل (١-٢٦): نورة زيتون.

١ أنواع الأزهار في الزيتون: تحمل أشجار الزيتون نوعين من الأزهار:

١. أزهار كاملة (خنثى): تحتوي أعضاء الذكور وأعضاء الأنثى.
٢. أزهار مذكرة: تحتوي أعضاء الذكور فقط.

## فكر

بلاحظ عدم وجود أزهار مؤنثة في أشجار الزيتون، فكيف تتكون الثمار؟

٢ التمايز الزهري: يبدأ التمايز الزهري في الزيتون في الصيف السابق من تفتح البراعم الزهرية، وغالباً ما يكون في شهر تموز الذي يصادف بدء تصلب نواة الثمرة (العجمة).

## التعلم التعاوني/ العمل الجماعي

- لتعرف عمليتي تلقيح الزيتون يعرض المعلم الشكل (١-٢٧)، ثم يقسم الطلاب إلى مجموعات ويكلفهم ما يأتي:
- المجموعة الأولى: تدرس عمليتي تلقيح الزيتون وإخصابه، ثم تجيب عن الأسئلة الآتية: متى تبدأ هاتان العمليتان في الزيتون؟ هل يعدّ الزيتون ذاتي التلقيح أم خلطي التلقيح؟
- المجموعة الثانية: تصنف أصناف الزيتون المزروعة في الأردن: النبالي والرصيبي، وسيفيلانو، ومانزانيللو إلى أصناف ذاتية التلقيح وأصناف خلطية التلقيح.
- المجموعة الثالثة: تجيب عن السؤال الآتي: (هل يزداد عقد ثمار الزيتون في حالة التلقيح الخلطي، ولماذا؟)
- المجموعة الرابعة: تدرس كيفية ترتيب أصناف الزيتون في البستان الواحد عندما يوجد صنفان من أصناف الزيتون في البستان الواحد. يقدم منسق كل مجموعة ما توصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

## مراعاة الضروك الفردية

### علاج

### إثراء

## استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم: التقييم المعتمد على الأداء
- أداة التقييم: سلم تقدير (١-٥٨)
- استراتيجية التقييم: مراجعة الذات
- أداة التقييم: قائمة رصد (١-٥٩)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

- كتاب الإنتاج النباتي - المستوى الثاني.

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- ملك أبو زينة وآخرون، دليل المواصفات القياسية الأردنية للفاكهة الطازجة، وزارة الزراعة، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.
- محمد البدور، مسنات الحيارى، تقدير خسائر فاقد ما بعد الحصاد لبعض محاصيل الخضار والفواكه، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.
- رابندارات طاغور، بديع حقي (مترجم)، جني الثمار، دار العلم للملايين، بيروت، ٢٠٠٠م.

#### للطالب

ويستمر بعدها تطور البرعم الزهري خلال فصل الخريف، ويتباطأ كثيراً في الشتاء. وبعد تعرض الأشجار للبرودة يستعيد البرعم الزهري نشاطه وتموّه خلال فصل الربيع، ثمّ يفتح في شهر أيار.

العوامل التي تؤثر في التمايز الزهري: يؤثر في التمايز الزهري في الزيتون عدد من

العوامل، أهمها:

١. درجة الحرارة المنخفضة شتاء.
٢. طول النهار.
٣. التحليق.
٤. منظمات النبات الحيوية.
٥. الرطوبة الأرضية.

#### قضية للبحث

اكتب تقريراً عن عملية التحليق في أشجار الزيتون متضمناً ما يأتي:

١- ما المقصود بالتحليق؟

٢- كيف يُجرى التحليق؟

٣- ما فوائد التحليق؟

واعرض ما تتوصل إليه، وناقشه مع زملائك.

التلقيح والإخصاب: بعد تفتح البراعم الزهرية في الزيتون تبدأ عملية التلقيح، وقد يكون الزيتون ذاتي التلقيح، أو خلطي التلقيح. فأغلب أصنافه المزروعة في الأردن؛ كالتبائي، والرصيبي ذاتية التلقيح، وإن كان بعضها، مثل: سيفلانو، ومانزانيلو، خلطي التلقيح. لقد أجمعت الدراسات على أن عقد الثمار في الزيتون يزداد في حالة التلقيح الخلطي، وهذا يحصل بوجود صنفين من أصناف الزيتون في البستان الواحد، وفي هذه الحالة ترتب الأصناف في البستان على النحو الآتي:

١. أربعة أسطر من الصنف (أ) يعقبها أربعة أسطر من صنف (ب).

٢. سطر أو سطران من صنف (أ)، يعقبها أربعة أسطر من صنف (ب).

١٠٣

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يصف مرحلة عقد الثمار ونموها.
- يوضح المقصود بظاهرة المعاومة في الزيتون.
- يفسر سبب ظاهرة المعاومة.
- يقترح حلولاً للحد من ظاهرة المعاومة في الزيتون.
- يستقصي أسباب تدني نسبة العقد أو عدمه في أشجار الزيتون.
- يقترح حلولاً لمعالجة تدني نسبة العقد أو عدمه في أشجار الزيتون.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر / أسئلة وأجوبة

- التمهيد للحصة: ينفذ المعلم جلسة لمناقشة مرحلة عقد الثمار ونموها في الزيتون، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ماذا تُسمى المرحلة التي تحدث بعد إتمام عملية تلقيح الزيتون وحدوث الإخصاب؟ لخص مراحل نمو ثمار الزيتون؟ لماذا يود معظم أصحاب بساتين الزيتون سقوط الأمطار في شهري تشرين أول وتشرين ثاني؟ ما نوع ثمرة الزيتون؟ ما المقصود بثمرة حسلة؟ سم الأجزاء الثلاثة التي تتكون منها ثمرة الزيتون من الخارج إلى الداخل؟

## التعلم التعاوني / العرض التوضيحي

- لتعرف ظاهرة المعاومة أو تبادل الحمل، يقدم المعلم عرضاً توضيحياً لهذه الظاهرة، ثم يكلف الطلبة ضمن المجموعات ما يأتي:
- المجموعة الأولى: توضح ظاهرة المعاومة أو تبادل الحمل في أشجار الزيتون.
- المجموعة الثانية: تفسر ظاهرة المعاومة أو تبادل الحمل في أشجار الزيتون.
- المجموعة الثالثة: تبحث في مصادر البحث المتاحة (كتب، أو مواقع إنترنت، وغيرها) عن كيفية الحد من تأثير ظاهرة تبادل الحمل في أشجار الزيتون، ثم تعرض النتائج بوساطة برمجية العروض التقديمية على الطلبة، وتناقشها معهم. يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.
- حل المشكلات والاستقصاء

- قبل البدء بتكليف الطلبة بتنفيذ خطوات الاستقصاء، لا بد من تهيئتهم وإشعارهم بوجود مشكلة، وذلك بطرح السؤال الاستقصائي الآتي: ما أسباب تدني نسبة

٣. ملقح من صنف (أ) لكل ثمانية أشجار من صنف (ب)، كما هو في الشكل (١-٢٧).



الشكل (١-٢٧): ملقح من صنف زيتون (O) لكل ثمانية أشجار من الصنف السائد في البستان (X).

عقد الثمار ونموها: بعد إتمام عملية التلقيح وحدوث الإخصاب، تبدأ مرحلة جديدة هي عقد الثمار وتكوين البذور داخلها. ويمكن إيجاز مراحل نمو الثمار على النحو الآتي:

١. يكون نمو الثمرة سريعاً في المرحلة الأولى من عمرها وبعد العقد مباشرة، وهي في بداية شهر حزيران، وتستمر خلال شهر تموز.

٢. يبطئ معدل نمو الثمرة في المرحلة الثانية، ويصاحبه تصلب عجمة الزيتون، ونمو البذرة داخلها، ويكون ذلك في شهري آب وأيلول. ومع بداية هذه المرحلة، أي في شهر آب، يبدأ الزيت بالتراكم في الثمرة، ويستمر حتى شهري تشرين الثاني وكانون الأول.

٣. يتسارع معدل نمو الثمرة مرة أخرى في المرحلة الثالثة، ويزداد زيادة ملحوظة في الحجم، ويكون ذلك في فصل الخريف (شهر تشرين الأول وتشرين الثاني). وتزامن زيادة حجم الثمرة مع التغيرات في لون الثمرة من الأخضر الداكن إلى الأخضر المصفر، فالأحمر، فالأسود، ويصاحب ذلك لين في صلابة الثمرة.

تُعزى الزيادة في حجم الثمار في فصل الخريف إلى زيادة محتوى الثمرة من الرطوبة، ولهذا يلاحظ أن معظم أصحاب بساتين الزيتون يحبون تساقط الأمطار في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني. وإذا انحس المطر في هذين الشهرين، وصاحب ذلك ارتفاع في درجة حرارة الجو ازداد معدل نتح الأوراق، وبقيت الثمرة صغيرة الحجم، وانكمشت.

١٠٤

العقد أو عدمه في أشجار الزيتون؟. يرصد المعلم إجابات الطلبة، ثم يكلف المجموعات باتباع خطوات الاستقصاء الآتية:

- الخطوة الأولى: تحديد المشكلة، وذلك بالإجابة عن السؤال السابق.

- الخطوة الثانية: تكليف المجموعات بحث المشكلة في مصادر البحث المتاحة (كتب، أو مواقع إنترنت، وغيرها)، والإجابة عن السؤال الآتي: ما أسباب تدني نسبة العقد أو عدمه في أشجار الزيتون؟ الخطوة الثالثة: تكليف المجموعات اقتراح حلول عملية لمعالجة المشكلة بالبحث في المصادر المتاحة عن حلول عملية لمعالجة أبرز المشكلات التي تؤدي إلى تدني نسبة العقد أو عدمه في أشجار الزيتون، وتوجيه المجموعة إلى إيجاد حلول لتخفيف الثمار في سنة الحمل الغزير، إذ يمكن تحقيق ذلك بإجراء عملية خف الثمار، والاهتمام بشجرة الزيتون من حيث التسميد، ومكافحة الآفات، وحرث الأرض، وغيرها من العمليات البستانية، وأخرى تتعلق بتوافر أصناف ذاتية التلقيح أو أصناف خلطية التلقيح. الخطوة الرابعة: اختيار الحل الأمثل من وجهة نظر أفراد المجموعة وتعليل إجاباتهم.

- بعد الانتهاء من تنفيذ خطوات الاستقصاء يعرض مقرر والمجموعات ما يتوصلون إليه من نتائج باستخدام جهاز العرض.

## مراعاة الضرووق الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في شبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية عن أسباب تدني نسبة العقد أو عدمه في أشجار الزيتون، ثم عرض ما يتوصلون إليه ومناقشته.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٦٠)
- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير لفظي (١-٦١)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم


#### للمعلم

- حسين العروسي، المملكة النباتية، مكتبة الإسكندرية، ١٩٩٩م.
- حسين محمد العروسي، النبات العام، مكتبة المعارف، ٢٠٠٠م
- محمود محمد جبر وآخرون، أساسيات علم النبات العام: الشكل الظاهري، والتركيب التشريحي، تقسيم المملكة النباتية، وظائف أعضاء النبات، ط١، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠١م.

#### للطالب

- حسين العروسي، الأطلس النباتي، مكتبة الإسكندرية، ٢٠٠١م

وتوصف ثمرة الزيتون بأنها حسلة، وتكون من ثلاثة أجزاء، هي من الخارج إلى الداخل كما يأتي:



- قشرة الثمرة التي تعرف باسم أكسوكارب.
- الجزء الوسطي اللحمي الذي يعرف باسم ميزوكارب.
- الجزء الداخلي الصلب الذي يعرف باسم أندوكارب أو العجسة، وتغلف الثمرة هذا الجزء الصلب. انظر الشكل (١-٢٨) الذي يبين مقطعاً عرضياً في ثمرة الزيتون.

ظاهرة المعاومة أو تبادل الحمل: تعاني أشجار الزيتون أكثر من غيرها من ظاهرة المعاومة (الشكل (١-٢٨): مقطع عرضي في ثمرة الزيتون.

(تبادل الحمل)، إذ تعطي محصولاً غزيراً في سنة، ثم يليه محصول قليل في السنة التالية. وتعزى هذه الظاهرة إلى أن الحمل الغزير يجهد الشجرة، ويخفض محتواها من المواد الكربوهيدراتية والمواد العضوية النيتروجينية، وبعض المواد الضرورية الأخرى، مما يجعل مخزون الشجرة يتدنى من هذه المواد إلى مستوى لا يكفي لإنتاج محصول وافر في السنة التالية.

وللحد من تأثير ظاهرة تبادل الحمل فإنه يجب القيام بما يأتي:

١. تخفيف الثمار في سنة الحمل الغزير، بإجراء عملية الحف.
٢. الاهتمام بشجرة الزيتون من حيث التسميد، ومكافحة الآفات، وحرث الأرض، وغير ذلك من العمليات البستانية.

### مهارات البحث والاتصال

إذا نظرنا إلى أسباب تدني نسبة العقد، أو عدمه في أشجار الزيتون، فإننا نجد أسباباً كثيرة، يبحث في شبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية عن هذه الأسباب، واعررض ما يتوصل إليه عن طريق برمجية العروض التقديمية، وناقشه مع زملائك.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى



## النتائج الخاصة

- يتعرّف الاحتياجات المناخية لأشجار الزيتون.
- يصف التربة الملائمة لأشجار الزيتون.
- يتعرّف طرق تكثير أشجار الزيتون.
- يوضح المقصود بكلٍّ من البيوض، السرطانات.
- يتعرّف مسافات الزراعة المناسبة لبساتين الزيتون.

## المفاهيم والمصطلحات

البيوض، السرطانات.

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس يعمل مراجعة سريعة للوحدة السابقة، ثم ينفذ المعلم جلسة لمناقشة الاحتياجات المناخية لأشجار الزيتون، والتربة الملائمة لنمو الزيتون وإنتاجه، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: أين تنتشر زراعة الزيتون في العالم؟ ما العوامل المناخية التي يجب توافرها لنجاح زراعة الزيتون في المناطق المختلفة؟ حدد على خريطة الأردن المناطق التي تجود فيها زراعة الزيتون، واستعن بنشرات دائرتي الإحصاءات العامة والأرصاء الجوية؟ لماذا لا يوصى بالتربة العميقة الخصبية عند زراعة الزيتون؟ ما نوع التربة الملائمة لنمو الزيتون وإنتاجه؟ ما خصائص التربة الملائمة لنمو الزيتون وإنتاجه؟ ما درجة الحموضة الملائمة لنمو نبات الزيتون وإنتاجه؟ مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

التعلم التعاوني/ العمل الجماعي

- لتعرّف طرق تكثير الزيتون خضرياً على نطاق تجاري، يقدم المعلم عرضاً توضيحياً يتضمن طرق تكثير الزيتون، ثم يقسم الطلاب إلى خمس مجموعات، ويهيئ البيئة الصفية المناسبة للعمل كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تفسر أسباب إكثار الزيتون خضرياً بدلاً من إكثاره بذرياً، وتدرس إكثار الزيتون خضرياً بالعقل الساقية المتخشبة وبالعقل الساقية الغضة، وتبين المقصود بالعقلة الساقية المتخشبة، وتحدد مواصفاتها، وتبين موعد أخذها.
- المجموعة الثانية: تعدّ تقريراً عن أعداد غراس الزيتون وأصنافها التي أنتجت في مشاتل وزارة الزراعة في الأردن خلال آخر سنتين، ويمكن الرجوع إلى مديريات الزراعة القريبة أو التقارير السنوية لوزارة الزراعة، أو الإحصاءات العامة، ثم تعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية وتناقشه مع الطلبة.
- المجموعة الثالثة: تدرس إكثار الزيتون خضرياً بالبيوض وبالسرطانات، وتبين المقصود بالبيوض، وكيفية تكوّنهما، ومواصفاتها، وكيفية تجهيزها، وتدرس إكثار الزيتون خضرياً، وتبين المقصود بالسرطانات، وكيفية تكوّنهما، ومواصفاتها، وكيفية تجهيزها.

## المناخ

تنتشر زراعة الزيتون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ولضمان نجاح زراعته، يراعى اختيار المناطق التي تتوافر فيها العوامل المناخية الآتية:

- برودة الشتاء اللازمة لاكمال نمو البراعم الزهرية وكسر السكون الفسيولوجي: تساهم درجات الحرارة المنخفضة في أثناء فصل الشتاء في تحسين إزهار أشجار الزيتون، وزيادة نسبة البراعم الزهرية الجانية، التي تكوّن النورات وتتفاوت أصناف الزيتون، من حيث احتياجاتها إلى برودة الشتاء، فقد نجد بعض أصناف، مثل: أزبا، وروبرو تحتاج إلى ٦٠٠ ساعة برودة أقل من ٧ درجات مئوية، ونجد بعضها الآخر، مثل: أسكولانو، وسيفلانو يحتاج إلى ما يقرب من ١٧٠٠-٢٠٠٠ ساعة برودة دون ٧ درجات مئوية.
- اختيار المناطق التي تخلو من الرياح الجافة والحارة، أو ذات الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المنخفضة، وبخاصة خلال فترة الإزهار. إن تعرض أشجار الزيتون لدرجات تصل إلى (١٠-°) مدة طويلة، يحدث أضراراً شديدة للأشجار، ويتلف الصقيع المبكر الثمار (في أواخر الخريف وأوائل الشتاء)، أما الصقيع المتأخر (في فصل الربيع) فيقتل البراعم الزهرية. ومن ناحية أخرى تؤثر الرياح الساخنة والجافة في أثناء مدة إزهار الزيتون سلباً في نسبة عقد الثمار، إذ تسبب تلك الظروف الجوية تساقط نسبة من الثمار الحديثة العقد.
- توافر صيف جاف يسمح بإتمام نضج الثمار.
- معدل سقوط الأمطار في الشتاء: إن تساقط ما معدله (٤٠٠ مم) موزعة توزيعاً جيداً خلال الموسم يعدّ كافياً للحصول على محصول جيد من الزيتون.

## نشاط (٨-١)

حدّد على خريطة الأردن المناطق التي تجود فيها زراعة الزيتون مستعيناً بنشرات دائرتي الإحصاءات العامة والأرصاء الجوية.

## التربة

تعدّ التربة العميقة الخصبية عاملاً أساسياً في نجاح كثير من أنواع الفاكهة، إلا أن مثل تلك الأراضي لا يوصى بها لزراعة الزيتون؛ لأنها تزيد من غزارة النمو الخضري للشجرة، وتقلل

١٠٦

- المجموعة الرابعة: تدرس عيوب طريقتي إكثار الزيتون بالبيوض والسرطانات، وتدرس إكثاره خضرياً بوساطة التطعيم بأشتال بذرية، وتبين الموعد المناسب لإجرائه، ومواصفات الأشتال البذرية.
- المجموعة الخامسة: تدرس إكثار الزيتون خضرياً بوساطة زراعة الأنسجة، وتبحث في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، أو النشرات الزراعية عن أسباب عدم نجاح تكثيره بزراعة الأنسجة، كما هو الحال في بعض أصول التفاح والدرّاق، وتعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية وتناقشه مع الطلبة.

- يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه بمجموعته في عرض تقديمي.

- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى

- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس: ينفذ المعلم جلسة لمناقشة موضوع مسافات الزراعة اللازمة لأشجار الزيتون، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما العوامل التي تؤثر في تحديد مسافات الزراعة عند غرس أشتال الزيتون؟ كيف تؤثر المنطقة وطريقة الزراعة في اختيار مسافات الزراعة المناسبة عند غرس أشتال الزيتون؟ ما طرق زراعة أشتال الزيتون؟ حدد مسافات زراعة غراس الزيتون في المناطق السهلية بالطريقة المربعة أو المستطيلة؟ احسب عدد غراس الزيتون اللازمة لزراعة وحدة زراعية مساحتها (١٠٠) دونم بالطريقة الرباعية إذا علمت أن مسافات الزراعة (٨×٨).
- مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.



## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

– توجيه الطلبة إلى البحث في شبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية عن طرق تكثير أشجار الزيتون، وعرض ما يتوصلون إليه.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: سجل وصف سير التعلم (١-٦٢)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

### للمعلم

### للطالب

النمو الشمري. ويمكن زراعة الزيتون في الأراضي السطحية، لأن جذوره منتشرة، وغير متعمقة، وتعّد الأراضي المعتدلة الحموضة، أو التي تميل قليلاً إلى القلوية، بحيث (لا يزيد رقم حموضتها على ٨,٥)، والأراضي ذات المحتوى العالي نسبياً من الكلس والبورون، صالحة لزراعة الزيتون.

#### ٤ طرق التكثير

نظراً إلى أن بذور ثمار الزيتون من أيّ صنف لا يمكنها أن تنتج غراساً تشبه تماماً ذلك الصنف الذي أخذت منه وراثتها، أو مورفولوجياً، ولأنّ المدة اللازمة لوصولها إلى مرحلة الإثمار طويلة؛ بسبب طور الطفولة، فإن إكثار الزيتون بالطرق الخضرية هو الأنسب. ويكثر الزيتون بالطرق الآتية:

- ١ العقل الساقية المتخشبة (Hardwood cuttings): تؤخذ من فروع عمرها من ٢-٤ سنوات، وتؤخذ في أشهر الشتاء في أثناء مدة تقليم الأشجار، بحيث يكون طولها ٢٥-٣٥ سم، وقطرها ١-٣ سم.
- ٢ العقل الساقية الغضة (Softwood cuttings): بعدّ تكثير الزيتون بالعقل الغضة من أكثر الطرق استخداماً من ناحية تجارية، وذلك لكثرة أعداد الغراس التي يمكن الحصول عليها من مشاتل وزارة الزراعة، إذ تؤخذ العقل في شهر أيلول، بحيث يكون طول العقل ١٠-١٥ سم من نموات عمرها سنة، وتحتوي كل عقلة على ٣-٤ أوراق، في أباطها براعم.

#### مهارات البحث والاتصال

اكتب تقريراً عن أعداد غراس الزيتون وأصنافها التي أنتجت في مشاتل وزارة الزراعة في الأردن خلال آخر سنتين، مستعيناً بمديريات الزراعة في منطقتك، أو التقارير السنوية لوزارة الزراعة، أو الإحصاءات العامة، واعرض ما تتوصل إليه عن طريق برمجية العروض التقديمية، وناقشه مع زملائك.

- ٣ البيوض (Ovules): هي نتوءات تتكون في الجزء السفلي من جذع الشجرة، بسبب بقاء عصارة اللحاء، أو تراكمها في أثناء مرورها لتغذية الجذور، مما يؤدي إلى تغذية

١٠٧

الكامبيوم وانقسام خلاياه، وتكون أنسجة برنشيمية هي سبب أساس البيوض. وبعد أن تتكون البيوض تأخذ في الكبر، وتنتج خلفات خضرية، وجذوراً عرضية، ويساعد وجود التراب حول البيوض على تجذيرها. وتفصل البيوض عن قواعد جذوع الأشجار في أشهر الشتاء، ويبلغ وزن البيوض المستعملة في التكثير والزراعة في المشاتل من ٥٠٠ - ٨٠٠ غم، أما تلك التي تزرع مباشرة في الأرض الدائمة فيبلغ وزنها ١-٣ كغ.

- ٤ السرطانات (Suckers): تنتج النموات الخضرية المتكونة على البيوض جذوراً، وفي هذه الحالة يفصل النمو الخضري مع الجذور المتكونة عليه في نهاية فصل الشتاء، وهذا ما يعرف بالسرطانات. وتزرع هذه السرطانات في أكياس، أو على خطوط في المشتل، أو في المكان الدائم مباشرة، ثم تحفر قواعدھا لإنتاج الجذور، بجمع التراب حولها، أو عن طريق تحليقها، وذلك بلف سلك عليها.

ويعاب على طريقتي تكثير الزيتون بالبيوض والسرطانات ما يأتي:

- ١ محدودية الغراس التي يمكن الحصول عليها.
- ٢ تشويه الشجرة الأم.
- ٣ تحتاج الغراس إلى وقت طويل حتى تصل إلى مرحلة الإثمار.
- ٥ التطعيم على أشغال بذرية: تطعم غراس الزيتون عادة في الخريف، أو الربيع، بطريقة التطعيم الدرعي، بعد أن يصبح طول الغرسة ٥٠-٧٥ سم، وقطرها ١-٢ سم في المنطقة التي فوق سطح التربة مباشرة.
- ٦ زراعة الأنسجة: لم يلق تكثير الزيتون بزراعة الأنسجة نجاحاً كما هو الحال في بعض أصول التفاح والدراق.

#### ٥ مسافات الزراعة

تزرع غراس الزيتون في المناطق السهلية على مسافات تتراوح بين ٨×٨-١٠×١٠ م بالطريقة المربعة أو المستطيلة. أما المناطق الجبلية والمنحدرة فتزرع على خطوط الكنتور، وهناك توجيه حديث لزيادة عدد أشجار الزيتون في وحدة المساحة، بحيث تصبح المسافات ٦×٦ م، أو ٧×٧ م.

١٠٨

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يصف عمليات الخدمة اللازمة لبساتين الزيتون.
- يتعرف أكثر الآفات شيوعاً في بساتين الزيتون.
- يتعرف أهم أصناف الزيتون الموجودة في الأردن.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرف عمليات الخدمة اللازمة لبساتين الزيتون، يقدم المعلم عرضاً توضيحياً يتضمن أهم هذه العمليات، ثم يقسم الطلبة إلى ست مجموعات، ويكلف كل منها ما يأتي:
- المجموعة الأولى: تدرس عملية التقليم الإثمري لأشجار الزيتون من حيث أهدافه.
- المجموعة الثانية: تدرس عملية تسميد بساتين الزيتون من حيث كميات السماد البلدي المختمر بالقفة للشجرة الواحدة سنوياً، موعد إضافة السماد النيتروجيني ومعدل إضافته كل شجرة، وكذلك كميات الأسمدة الكيميائية (كغم/دوم) المقترح إضافتها لمحصول الزيتون.
- المجموعة الثالثة: تجيب عن السؤال الآتي: كيف يضاف السماد الكيميائي إلى أشجار الزيتون في المناطق المروية؟
- المجموعة الرابعة: تدرس عملية الحرث من حيث أهدافها.
- المجموعة الخامسة: تدرس عملية ري بساتين الزيتون من حيث أهدافها، ومراحلها في المناطق التي يقل معدل سقوط الأمطار فيها عن (٤٠٠) مم، وكميات مياه الري اللازمة خلال موسم النمو لري بساتين الزيتون، وأثر عدم توافر الرطوبة الأرضية الكافية خلال مدة التمايز الزهري في شهري شباط وآذار.
- المجموعة السادسة: تدرس عملية الحف في بساتين الزيتون من حيث: الهدف من إجرائها، وكيفية إجرائها.
- يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم
- التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة
- التمهيد للحصة: ينفذ المعلم جلسة لمناقشة أبرز الآفات شيوعاً في بساتين الزيتون، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما أكثر الأمراض شيوعاً في بساتين الزيتون؟ ما أكثر الحشرات التي تهاجم بساتين الزيتون؟ مناقشة إجابة الطلبة عن الأسئلة، وتدوين الإجابات على السبورة.

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرف أصناف الزيتون الشائعة محلياً، يعرض المعلم الشكل (١-٢٩)، ثم يكلف الطلبة ضمن المجموعات تنفيذ ما يأتي:

- المجموعة الأولى: تدرس صنف الزيتون النبالي وصنف الزيتون الرصيعي (النبالي المحسن) من حيث: نمو الأشجار، وحجم الثمار، وشكلها، ونسبة الزيت فيها، والغرض من استخدامها.
- المجموعة الثانية: تدرس صنف الزيتون نصوحي جعب من حيث حجم الثمار، وشكلها،

## الملاحق

ملحق أدوات التقويم (١-٦٣).

## تطبيقات

احسب عدد غراس الزيتون اللازمة لزراعة وحدة زراعية مساحتها ١٠٠ دوم بالطريقة الرباعية، إذا علمت أن مسافات الزراعة ٨x٨.

## ١ عمليات الخدمة

تشمل هذه العمليات ما يأتي:

① التقليم: تهدف عملية تقليم أشجار الزيتون المثمرة إلى:

١. إزالة الأغصان، والفروع الجافة، والمكسورة، والمصابة جميعها.
٢. إزالة السرطانات.
٣. إزالة الأغصان المشابكة.

② التسميد: تضاف قفة، أو قفتان من السماد البلدي المختمر للشجرة الواحدة سنوياً،

ويضاف السماد النيتروجيني خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني بمعدل ٥٠-١٠٠ كغ للشجرة، حسب عمرها، وينصح بإضافة كميات الأسمدة الكيميائية (كغم/دوم) لمحصول الزيتون، على النحو الآتي:

العنصر الغذائي (كغم/دوم)		
نيتروجين (N)	فسفور (P)	بوتاس (K)
١٥-٢٠	٧-١٠	١٢-١٥

## فكر

كيف يضاف السماد الكيميائي إلى أشجار الزيتون في المناطق المروية؟

- ③ الحرث: تحرت أرض البستان، ولاسيما في المناطق المرتفعة التي تعتمد على مياه الأمطار، من أجل خلط الأسمدة، والاستفادة من مياه الأمطار، وخلع الأعشاب.
- ④ الري: يعد ري بساتين الزيتون مهماً ومؤثراً في زيادة محصول الأشجار؛ لأنه:
  ١. يكون نمواً خضرياً جديداً يعرف باسم الخشب الجديد المثمر؛ هو الذي يحمل ثماراً في العام التالي.
  ٢. يرفع من نسبة عقد الثمار.
  ٣. يزيد من حجم الثمار.

١٠٩

⑤ الحشرات: حشرة الزيتون القشرية، وذباب ثمار الزيتون، وسوسة أغصان الزيتون، وبسلا الزيتون، والتريس، وحفار ساق التفاح.

## العلم

## ٨ الأصناف

كما في الشكل (١-٢٩): أصناف الزيتون الشائعة في الأردن كما يأتي:

- ① النبالي: أشجاره متهدلة النمو قليلة الارتفاع، تكاد تكون مظلية الشكل، وثماره متوسطة الحجم، مخدبة مغزلية الشكل، ومديبة عند القمة، وتصلح لإنتاج زيت الزيتون والتخليل، وتراوح نسبة الزيت في ثماره بين ٢١-٣٥٪.
  - ② الرصيعي (النبالي المحسن): الشجرة قائمة النمو، ثمارها متوسطة إلى كبيرة، كروية-أسطوانية الشكل. وتقدر نسبة الزيت في ثماره بما يقرب من ١٦-٢٠٪، ويستعمل لأغراض التخليل بالدرجة الأولى.
  - ③ نصوحي جعب: الثمرة كبيرة، وملساء، لونها أسود غامق، لامعة وجذابة، وتراوح نسبة الزيت في ثماره بين ١٥-١٠٪، وينصح به لأغراض التخليل.
  - ④ الصوراني: الشجرة كبيرة الحجم، والثمرة خضراء اللون، يعلوها شيء من الاحمرار عند النضج، وتراوح نسبة الزيت في ثماره بين ٢٥-٣٠٪.
  - ⑤ الشامي: الثمرة كبيرة، وسطحها غير منتظم الملمس، وتراوح نسبة الزيت في ثماره بين ١٢-١٨٪، وينصح به لأغراض التخليل.
  - ⑥ الحصري: الشجرة كروية الشكل، والثمرة صغيرة، متطاولة الشكل، وتراوح نسبة الزيت في ثماره بين ٢٥-٣٠٪.
- وهناك أصناف عالمية شائعة محلياً، مثل: ميشن (Mission)، ومازانيللو (Manzanillo)، وأسكولانو (Ascolano)، وباروني (Barouni)، وجروسادي أسبانيا (Gross de Espagne)، وتلمساني.

## تطبيقات

يرغب مستثمر في المجال الزراعي في زراعة بستانه بأشجار الزيتون، فما الصنف الذي تنصح بزراعته في الأردن بهدف إنتاج زيت الزيتون؟

١١١

- ولونها، ونسبة الزيت فيها، والغرض من استخدامها.
- المجموعة الثالثة: تدرس الصوراني من حيث حجم الأشجار، وحجم الثمار، وشكلها، ولونها، ونسبة الزيت فيها، والغرض من استخدامها.
- المجموعة الرابعة: تدرس صنف الزيتون الشامي من حيث حجم الأشجار، وحجم الثمار، وشكلها، ولونها، ونسبة الزيت فيها، والغرض من استخدامها.

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف بعض الطلبة كتابة تقرير يتضمن أسماء أصناف الزيتون العالمية التي زرعت محلياً زراعة واسعة، والأصناف التي ينصح بالإكثار منها لتوزيعها على المزارعين في الأردن، ثم عرض النتائج على الطلبة.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: قلم وورقة
- أداة التقويم: اختبار (١-٦٣)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

للمعلم

للطالب

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

تروى الأشجار في المناطق التي يقل معدل سقوط الأمطار فيها عن (٤٠٠ مم)، وبخاصة في المراحل الحرجة من نموها، أي في أثناء فترة التمايز الزهري، وعقد الثمار، والمراحل الأخيرة من نمو الثمار؛ لأن عدم توافر الرطوبة الأرضية الكافية خلال فترة التمايز الزهري في شهري شباط وآذار يؤثر في جنس الزهرة، ويسبب ضمور مبايض الأزهار الخنثى، ويثبط نشاطها لتصبح معها الأزهار مذكرة، ويقلل نسبة النورات الزهرية المتكونة، فيقل الحمل، ولذلك تشير الأبحاث والدراسات والتجارب العملية المحلية إلى ضرورة رعي أشجار الزيتون عند انحسار الأمطار في هذين الشهرين. وتتراوح كميات مياه الري اللازمة خلال موسم النمو لري بسنتين الزيتون بين ٤٠٠ - ٥٠٠ م<sup>٣</sup>/دونم.

⑤ **خف الثمار:** يؤدي خف الثمار في سنة الحمل الغزير إلى تنظيم حمل الأشجار، والتحكم - إلى حد ما - بظاهرة تبادل الحمل، ويساعد كذلك على:

١. زيادة حجم الثمرة.
٢. التكبير في نضج الثمار، وحمايته من الإصابة بالصقيع المبكر، والضمور وقت الحصاد.
٣. زيادة محتوى الثمرة من الزيت.
٤. إنتاج خشب مثمر يكفي لإعطاء محصول جيد في السنة التالية لتكوينه.
٥. زيادة معدل إنتاجية الشجرة في السنوات القادمة.
٦. تقليل تعرض فروع الشجرة للكسر.
٧. تقليل تكاليف الحصاد.

تجرى عملية خف الثمار في سنوات الحمل الغزير يدوياً، أو كيميائياً، وذلك برش الأشجار بمنظّم النمو الذي يسمّى حمض فنتالين الخليك NAA بتركيز (١٠٠-١٥٠) جزءاً في المليون بعد أسبوعين من الإزهار الكامل.

### الأفات

تعرض أشجار الزيتون للإصابة بأمراض وحشرات عدّة، من أهمها:

① الأمراض التي تصيب الزيتون: الذبول المتسبب عن فطر الفيرتسيليوم، وعين الطاووس

١١٠



مانزانيللو.



باروني.



أسكولانو.



نبالي (بلدي).



ميشن



ك ١٨.



الرصيبي (النبالي المحسن).

الشكل (١-٢٩): بعض أصناف الزيتون.

١١٢

- المجموعة الخامسة: تدرس صنف الزيتون الحضيري من حيث شكل الأشجار، وحجم الثمار، وشكلها، ونسبة الزيت فيها، والغرض من استخدامها.
  - المجموعة السادسة: تبحث عن أصناف الزيتون العالمية الشائعة محلياً مستعينة بالمراجع وأدلة الشركات المستوردة، من حيث شكل الشجرة، وحجمها، وحجم الثمرة وشكلها، ونسبة الزيت فيها، والغرض من استخدامها، ثم تعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية وتناقشه مع الطلاب. يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.



## النتائج الخاصة

- يصف عمليتي نضج ثمار الزيتون وجنيها.
- يتعرف طرائق قطف ثمار الزيتون.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرف عمليتي نضج ثمار الزيتون وجنيها، يقدم المعلم عرضًا توضيحيًا، ثم يقسم الطلبة إلى ست مجموعات، ويكلف كل مجموعة ما يأتي:
- المجموعة الأولى: تحدّد علامات نضج ثمار الزيتون.
- المجموعة الثانية: تحدّد مواعيد قطف الزيتون، وتجيّب عن السؤال الآتي: لماذا يؤخّر أصحاب بساتين الزيتون قطف الثمار بعد نزول أول شتوة؟
- المجموعة الثالثة: تدرس قطف ثمار الزيتون يدويًا من حيث طرق القطف اليدوي، وكيفية إجرائه، وتجيّب عن السؤال الآتي: لماذا يجب عدم ضرب فروع الزيتون بالعصي لقطف ثمارها؟
- المجموعة الرابعة: توضح أهمية تنظيف بستان الزيتون تحت الأشجار قبل جمع الثمار؟ ثم تعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية وتناقشه مع الطلاب.
- المجموعة الخامسة: تدرس قطف ثمار الزيتون ميكانيكيًا من حيث طرق القطف الميكانيكي، وكيفية إجرائه، ومزاياه، وعيوبه.
- المجموعة السادسة: تدرس قطف ثمار الزيتون كيميائيًا من حيث المواد الكيميائية المستخدمة، وكيفية إجرائه، ومزاياه وعيوبه.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- تقديم التغذية الراجعة من قبل المعلم للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

## قضية للبحث

اكتب تقريرًا عن أصناف الزيتون العالمية التي استوطنت، ثم بيّن الأصناف التي تنصح بالإنكار منها لتوزيعها على المزارعين في الأردن، واعرض ما تتوصل إليه، وناقشه مع زملائك.

## ٩ النضج والجني

١ علامات النضج: تقطف ثمار الزيتون بغرض التخليل عندما يبدأ لون الثمرة الأخضر الداكن بالتحول إلى الأخضر المغفر، يعقبه ظهور بقع بنفسجية اللون حول قمة الثمرة، عندئذ تكون قد وصلت إلى مرحلة النضج. ويمكن معرفة نضج الثمار بالضغط على الثمرة بالسبابة والإبهام، فإنّه يخرج منها عصير أبيض إذا كانت ناضجة. أمّا قطف الثمار من أجل استخراج الزيت فيبدأ عندما يمتدّ اللون البنفسجي حول قمة الثمرة حتى يغطي قشرتها، وعندما يتغيّر لحم الثمرة من اللون الأبيض إلى اللون البنفسجي وامتداد ذلك إلى نواتها، وتحول قشرة الثمرة إلى اللون البنفسجي الداكن، عندئذ تصبح ناضجة نضجًا استهلاكيًا، أي ما يعرف في العامية بأنها "مستوية".

٢ مواعيد قطف الزيتون: تقطف ثمار الزيتون عادة من منتصف شهر أيلول وحتى منتصف تشرين الثاني، وأوائل كانون الأول، ويعتمد ذلك على عدد من العوامل، مثل: صنف الزيتون، والظروف المحلية، والغرض من استعمال الثمار (التخليل، أو استخلاص الزيت). ويحدّد الوقت الأمثل لقطف الثمار تبعًا لتغيير لون الثمار وتركيبه.

## فكر

يؤخّر أصحاب بساتين الزيتون قطف الثمار بعد نزول أول دفعة من المطر، لماذا؟

٣ طرق القطف: تختلف طرائق قطف الزيتون في الأقطار المختلفة، ويعزى هذا الاختلاف إلى كثافة السكان في المنطقة، والحالة الاقتصادية والاجتماعية، وصفات أصناف الزيتون، وحجم الأشجار، ونوعية الزيت المنتج، وفي ما يأتي أهم طرائق قطف الزيتون: ١. القطف اليدوي، كما في الشكل (١-٣٠): تقطف ثمار الزيتون يدويًا بطرائق عدة، منها: أ. جمع الثمار بعد سقوطها على سطح الأرض: في هذه الطريقة تُترك الثمار لتتساقط على الأرض، ثم يجمعها العمال مرة واحدة أو مرات عدة. وتعدّ هذه الطريقة من أسوأ طرق جمع الثمار، لفقْدان زيت الزيتون كثيرًا من صفاته العضوية والدنيئة،

١١٣



الشكل (١-٣١): الأمشاط اليدوية.

ب. جمع الثمار الساقطة على الأرض ميكانيكيًا: تُسقط الثمار يدويًا على الأرض، أو على شبك بلاستيكية، ثم تجمع ميكانيكيًا؛ ممّا يوفر العمالة. يؤخذ على هذه الطريقة أنها تتطلب تغطية ما مساحته ٦٠-٨٠ م<sup>٢</sup> أسفل كل شجرة، وجمع الثمار على الأقل مرتين؛ ورفع الشباك، وإعادةها مرة ثانية، وتحتاج كل مرة ١٥ دقيقة. ج. قطف الثمار باستخدام أجهزة الهز وإحداث الذبذبات، كما في الشكل (١-٣٢): تُجرى هذه الطريقة بهز جذوع الأشجار آليًا بواسطة الهزازات المتعددة الاتجاهات، وهذه الطريقة تستلزم تربية الأشجار بحيث يكون للشجرة ساق واحدة قائمة وعمودية، ومرتفعة عن سطح الأرض. بما لا يقل عن ٦٠ سم، ويفضل استخدامها في أصناف الزيتون ذات الثمار الكبيرة الحجم التي تُظهر نضجًا منتظمًا. ومن مزايا هذه الطريقة:

- يمكن جمع أكثر من ٩٥٪ من ثمار الشجرة الواحدة في مدة قصيرة.
- سهولة جمع ما تبقى من الثمار على الأشجار يدويًا، وهو ما تقدّر نسبته ٥-١٠٪، نظرًا إلى تركيز الثمار في جهات محدودة في الشجرة، ممّا يسهل جمعها باليد.
- كسر الطرود نتيجة هز الأشجار يكون قليل الحدوث، وتلف الثمار يكون بسيطًا، وهو أقلّ ممّا يحدث في طرائق القطف الأخرى.
- ومن عيوب هذه الطريقة:
- تكسير الفروع، وخلخلة الجذور، بسبب سوء الاستخدام.
- قلة كفاءة الهزازات عندما تكون الأشجار كبيرة.

١١٥

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الضروك الفردية

#### علاج

#### إثراء

– عرض فيلم توضيحي يبيّن طرائق قطف ثمار الزيتون.

### استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم: الملاحظة.
- أداة التقييم: السجل القصصي (١-٦٤).

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

– كتاب الإنتاج النباتي – المستوى الثاني.

### مصادر التعلّم

#### للمعلم

- Childers, N., Modern fruit science . U.S. Library of the Congress, ninth edition . 1983
- Eagle Wood Cliffs., plant Science, Growth Development, Utilization of Cultivated Plant. New Jersey:Printice-Hall Inc.1991

#### للطالب

- فهمي شتات، بساتين التفاحيات واللوزيات والعنب والزيتون، وزارة الزراعة، عمان، ١٩٩٥م.
- فهمي شتات وآخرون، أشجار الفاكهة، ط٢، جامعة القدس المفتوحة، عمان، الأردن، ٢٠٠٦م.

وزيادة حموضة الثمار، والزيت؛ وبسبب ترك الثمار مدة طويلة على سطح الأرض. ب. قطف الثمار باليد: يقف العامل أو يصعد سلمًا، ويبدأ بقطف الثمار باليد، ووضعها في سلة مربوطة حول عنقه أو كتفه، وتتبع هذه الطريقة في زيتون المائدة، وليس في زيتون الزيت، ومن ناحية أخرى، قد يلجأ العمال إلى إسقاط الثمار على شباكٍ بلاستيكية، أو قماش من نوع خاص، توضع أسفل الأشجار.

#### فكر

لا ينصح بضرع فروع الزيتون بالعصي من أجل الحصول على ثمارها. لماذا؟

ج. ضرب الأشجار: يلجأ بعض المزارعين إلى ضرب أشجار الزيتون بعصي خشبية، إذ تسقط الثمار على القماش أسفل الأشجار، ثم تجمع يدويًا. وتزيد هذه الطريقة من حدوث تبادل الحمل في الزيتون بسبب تكسر الطرود (Shoot)، وسقوط نسبة كبيرة من الأوراق وتقطع الأوعية الناقلة الموجودة تحت القلف.



الشكل (١-٣٠): قطف ثمار الزيتون يدويًا.

#### فضيئة للبحث

وضّح أهمية تنظيف أرض بستان الزيتون تحت الأشجار قبل جمع الثمار، ثم اعرض ما توصل إليه، وناقشه مع زملائك.

٢. القطف الميكانيكي: تقطف ثمار الزيتون ميكانيكيًا بطرق عدة، منها: أ. الأمشاط اليدوية، كما في الشكل (١-٣١): تمسّط الفروع المثمرة بأمشاط، لكل منها عصا طويلة، وتدار هذه الأمشاط ميكانيكيًا، أو يدويًا.

١١٤



الشكل (١-٣٢): قطف الثمار باستخدام أجهزة الهز وإحداث الذبذبات.

د. القطف الكيميائي: أجريت تجارب عديدة لقطف ثمار الزيتون كيميائيًا باستخدام الأثيلون Ethephon، والأثيريل Ethrel، وألسول Alsol، وتوصلت إلى نتائج مهمة، تلتخص في أن استخدام المواد الكيميائية يحتاج إلى دقة كبيرة في تحديد التركيز المناسب، نظرًا إلى سقوط أعداد كبيرة من الأوراق في حالة التركيز المرتفع؛ مما يقلل من تكوين المواد الكربوهيدراتية اللازمة لنمو الثمار والأشجار، ويؤثر سلبيًا في إثمار الأشجار في السنة التالية.

#### التقييم

- ١ - ماذا يقصد بكل من:
  - أ - ظاهرة تبادل الحمل في الزيتون.
  - ب - ثمرة حسلة.
- ٢ - أي طرائق القطف تفضل لقطف ثمار الزيتون؟ ولماذا؟
- ٣ - علّل ما يأتي:
  - أ - لا ينصح بزراعة الزيتون في الأراضي الخصبة العميقة.
  - ب - ضرورة زراعة أكثر من صنف واحد أحيانًا في بستان الزيتون.
  - ج - ينصح بري أشجار الزيتون خلال شهري شباط وآذار في حالة انحباس الأمطار.

١١٦



## النتائج الخاصة

- يجهز عقلاً غضة.
- يعامل العقل الغضة بهرمون التجدير.
- يغرّس العقل الغضة لتجديرها.
- يصف نباتات الزيتون نباتياً.
- يميز نباتات الزيتون نباتياً.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم عن طريق النشاط/ التدريب

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (١٦-١) كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تجهز عقلاً غضة، وتقص أطراف فروع الزيتون، وتأخذ عقلاً بقص ما تبقى من الفروع، بحيث يكون طولها (٧-١٥) سم، وتزيل الأوراق القريبة من القاعدة، وتبقي (٢-٤) ورقات من القمة.
- المجموعة الثانية: تحضر هرمون التجدير الخاص بالعقل الغضة، تعامل العقل الغضة بهرمون التجدير، وتتخلص من الكمية الزائدة بهز قاعدة العقلة.
- المجموعة الثالثة: تغرّس العقل الغضة لتجديرها في وسط تجدير ملائم، مثل البيتموسس والفحم والبيرلايت وترطب العقل وتظلّلها باستمرار، وتنقل الأشتال بعد تجديرها إلى أوعية زراعية ملائمة.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.
- يجيب المعلم عن تساؤلات الطلبة في أثناء العمل.
- يعرض المعلم الإجابة الصحيحة.
- تكليف مقرر كل مجموعة إرجاع الأدوات والمواد إلى مكانها.

## التعلم عن طريق النشاط/ التدريب

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (١٧-١)، كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تتفحص فروع زيتون مثمرة، وتلاحظ ما يأتي:
- الأوراق: نظام توزيعها، وضع الأوراق على الساق، ملمس الورقة الجلدي، ولون سطح الورق الفضي الذي يغطيه شعيرات ورقية، آباط

يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:  
- تجهز عقلاً غضة.  
- تعامل العقل الغضة بهرمون التجدير. - تغرّس العقل الغضة لتجديرها.

المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

● فروع من نباتات زيتون. ● هرمون تجدير. ● وسط زراعة مناسب. ● أوعية زراعية. ● مقص تقليم.

الرسوم التوضيحية	خطوات العمل والنقاط الحاكمة
	١- قص أطراف فروع الزيتون.
	٢- خذ عقلاً، طولها (٧-١٥ سم) وذلك بقص ما تبقى من الفروع، انظر الشكل (١).
	٣- أزل الأوراق القريبة من القاعدة، وأبقي (٢-٤) ورقات من القمة، انظر الشكل (١).
	٤- حضر هرمون التجدير الخاص بالعقل الغضة.
	٥- اغمس قواعد العقل في هرمون التجدير، وتخلص من الكمية الزائدة بهز قاعدة العقلة.
	٦- اغرس العقل في وسط تجدير ملائم، مثل: البيتموس، والفحم، والبيرلايت.
	٧- رطب العقل، وظللها باستمرار.
	٨- انقل الأشتال بعد التجدير إلى أوعية زراعية ملائمة.

## التقويم

- ١- ما الظروف المناسبة لتجدير العقل الطرفية الغضة ونموها؟
- ٢- يفضل زراعة العقل الغضة في وسط زراعي يتكون من الفحم، والبيتموس، والبيرلايت، بين دور كل من هذه المكونات.

الأوراق، ووجود براعم ينتج منها نمو خضري جديد أو نورات زهرية.

● المجموعة الثانية: تتفحص فروع زيتون مثمرة، وتلاحظ ما يأتي:

■ البراعم: البرعم الجانبي في الفرع الذي عمره سنة واحدة يفتح عن نورة، وأنواع الأزهار في تلك النورة؛ أزهار مذكرة وأزهار خنثى، عدد زهيرات النورة، البرعم الطرفي في الزيتون يفتح دائماً عن نمو خضري.

● المجموعة الثالثة: تتفحص فروع زيتون مثمرة، وتلاحظ عدد الثمار في النورة الواحدة.

● المجموعة الرابعة: تعمل مقطعاً عرضياً في ثمرة الزيتون وتلاحظ ما يأتي: أن الثمرة حسلة من النوع البسيط، وتتكون من ثلاث طبقات، ما اسمها؟ وأن النواة الصلبة هي جزء الثمرة الداخلي، أما البذرة فهي الموجودة داخل النواة الصلبة.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الضروك الفردية

#### علاج

#### إثراء

- تكليف مجموعة من الطلبة تنفيذ ما يأتي:
- تجهيز عقلة زيتون غضة من النموات المتوافرة، باستخدام ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات.
- رسم الأجزاء النباتية التي تفحصوها، وتدوين أسمائها على الرسم.
- عمل مقطع عرضي في ثمار الزيتون، وتعرّف أجزائه.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٦٥)
- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٦٦)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسى

- كتاب الإنتاج النباتي - المستوى الثاني.

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- مجلة المهندس الزراعي، العدد الخاص بالمؤتمر الزراعي الوطني الثاني، العدان، (٦٩-٧٠)، نقابة المهندسين الزراعيين، عمان، الأردن، حزيران، ٢٠٠١م.

- George.A.Cquaah.Horticulture Principles and practices.  
Pearson Prentice Hall. 2005.

#### للطالب


- خليل جرن، دليل المزارع السنوي، وزارة الزراعة، عمان، الأردن، ٢٠٠٨م.
- محمد زين، الموسوعة الزراعية: الفاكهة والأشجار المثمرة، دار الطريق للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٠م.

التساؤلات	التمرين (١-١٧)
يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن: - تصف نباتات الزيتون نباتيًا. - تميّز نباتات الزيتون نباتيًا.	
المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات	
*فروع زيتون مزهرة. *فروع زيتون مثمرة. *سكين.	
خطوات العمل والنقاط الحاكمة	الرسوم التوضيحية
١- تفحص فروع زيتون مثمرة، كما في الشكل (١)، ولاحظ ما يأتي: أ - الأوراق: ما نظام توزيع الأوراق على الساق؟ لاحظ ملمس الورقة الجلدي، ولون سطح الورق الفضي الذي يغطيه شعيرات ورقية، ولاحظ أباط الأوراق، هل توجد فيها براعم ينتج منها النمو الخضري الجديد، أو النورات الزهرية؟ ب- البراعم: البرعم الجانبي في الفرع الذي عمره سنة واحدة يفتح عن نورة، لاحظ أنواع الأزهار كما في الشكل (٢)، في تلك النورة أزهار مذكرة وأزهار خنثى، ما عدد زهيرات النورة؟ إن البرعم الطرفي في الزيتون يفتح دائمًا عن نمؤ خضري، كما في الشكل (٣). ٢- تفحص فروع زيتون مثمرة، ولاحظ عدد الثمار في النورة الواحدة.	الشكل (١): فروع زيتون. الشكل (٢): نورة زيتون.

١١٨



الشكل (٣): أماكن حمل ثمار الزيتون.



الشكل (٤):

مقطع عرضي في ثمرة زيتون.

- ٣- اعمل مقطعًا عرضيًا في ثمرة الزيتون، كما في الشكل (٤)، ولاحظ أن الثمرة حاملة من النوع البسيط، وتتكون من ثلاث طبقات، ما اسم كل طبقة؟ لاحظ أن النواة الصلبة هي جزء الثمرة الداخلي، أما البذرة فهي الموجودة داخل النواة الصلبة.

#### التقويم

- ١- ارسم نورة زيتون، واكتب أسماء الأجزاء على الرسم.
- ٢- ارسم مقطعًا عرضيًا في ثمرة الزيتون، واكتب أسماء الأجزاء على الرسم.
- ٣- صف طبيعة الحمل في الزيتون.
- ٤- ما نوع الثمار في الزيتون؟

١١٩

## النتائج الخاصة

- يقلم أشجار الزيتون المثمرة تقليماً إثمارياً.
- يجني ثمار الزيتون.

## المفاهيم والمصطلحات

التنضيد، التطعيم، الأصول، الطعوم

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (١-١٨)، كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تزيل الفروع القديمة والجافة والمكسورة.
- المجموعة الثانية: تزيل الفروع المتشابكة والمتداخلة والنامية باتجاه وسط الشجرة.
- المجموعة الثالثة: تزيل السرطانات التي تخرج من تحت سطح التربة حول الجذع.
- المجموعة الرابعة: تزيل الفروع الزائدة (بطريقة الخف)؛ للمحافظة على المنطقة المثمرة في الشجرة.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.
- يجيب المعلم عن تساؤلات الطلبة في أثناء العمل.
- يعرض المعلم الإجابة الصحيحة.
- تكليف مقرر كل مجموعة إرجاع الأدوات والمواد إلى مكانها.

التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (١-١٩)، كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تحدد مرحلة النضج الملائمة للجني حسب الغرض.
- المجموعة الثانية: تختار الثمار الخضراء المصفرة لأنها مناسبة للمائدة.
- المجموعة الثالثة: تختار الثمار الأرجوانية للزيت.
- المجموعة الرابعة: تفرش بساطاً أسفل الشجرة.

يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:  
- تقلم أشجار الزيتون المثمرة تقليماً إثمارياً.

المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

● بستان زيتون. ● مقص تقليم. ● منشار.

الرسم التوضيحية



خطوات العمل والنقاط الحاكمة

- 1- أزل الفروع القديمة والجافة والمكسورة.
- 2- أزل الفروع المتشابكة، والمتداخلة، والنامية باتجاه وسط الشجرة.
- 3- أزل السرطانات التي تخرج من تحت سطح التربة حول الجذع.
- 4- أزل الفروع الزائدة (بطريقة الخف)؛ للمحافظة على المنطقة المثمرة في الشجرة.

## التقويم

- 1- حدّد منطقة حمل الثمار على أشجار الزيتون.
- 2- صف طريقة تقليم أشجار الزيتون تقليماً إثمارياً.
- 3- كيف تقلم أشجار الزيتون الكبيرة السن؛ من أجل تجديدها؟

## تطبيقات

قلم أشجار الزيتون الموجودة في مدرستك، تقليماً إثمارياً، مستخدماً ما يلزم من مواد، وأدوات، وتجهيزات متوافرة.

- المجموعة الخامسة: تقطف الثمار باليد أو بالأمشاط.
- المجموعة السادسة: تقطف الثمار العالية بوساطة السلم.
- المجموعة السابعة: تجمع الثمار وتعبئها في صناديق أو أكياس صغيرة.
- المجموعة الثامنة: تضع الصناديق في مكان مظلل.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.
- يجيب المعلم عن تساؤلات الطلبة في أثناء العمل.
- يعرض المعلم الإجابة الصحيحة.

### مراعاة الضروك الفردية

#### علاج

#### إثراء

- تكليف مجموعة الطلبة تنفيذ ما يأتي:
- تقليم أشجار الزيتون، تقليماً إثمارياً، باستخدام ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.
- جني ثمار الزيتون بوساطة الأمشاط، وما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٦٧)
- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٦٨)

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

- كتاب الإنتاج النباتي - المستوى الأول.

#### مصادر التعلم

##### للمعلم

- Hartman, H., Kester, D., davies, F. and Geneve, R. Plant propagation : principles and practices, 7th edition . 2002.
- George, A. Cquaah. Horticulture Principles and practices. Pearson Prentice Hall. 2005

##### للطالب

- طه عبدالله نصر، إكثار أشجار الفاكهة، القواعد العلمية والأساليب العصرية، مكتبة المعارف الحديثة، الإسكندرية، ٢٠٠٣ م.
- سلام أيوب، الدليل الفني لتطعيم الأشجار المثمرة، المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٦ م.

#### جني ثمار الزيتون

التحضير (١٩-١)	التأجرات
	يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا الثمرين أن تكون قادرًا على أن: - تجني ثمار الزيتون.
	المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات
	* بستان زيتون . * بساط . * كيس خيش أو صناديق جمع الثمار . * سلم . * قاطفات ثمار الزيتون.
الرسوم التوضيحية	خطوات العمل والنقاط الحاكمة
	١- حدّد مرحلة النضج الملائمة للجني حسب الغرض. ٢- اختر الثمار الخضراء المصفرّة، للمائدة. ٣- اختر الثمار الأرجوانية للزيت. ٤- افرض بساطاً أسفل الشجرة. ٥- اقطف الثمار باليد، أو بالأمشاط، كما في الشكل (١)، لتسقط على البساط. ٦- اقطف الثمار العالية بوساطة السلم. ٧- اجمع الثمار، وعبئها في صناديق، أو أكياس صغيرة. ٨- ضع الصناديق في مكان ظليل.
	الشكل (١): قطف ثمار الزيتون بالأمشاط.

#### التقويم

- ١- علّل ما يأتي:
- أ - يجب عدم ضرب فروع الزيتون المثمرة بالعصي.
- ب- يجب وضع ثمار الزيتون في مكان ظليل بعد جنيها مباشرة.
- ٢- كيف تحدّد موعد جني ثمار الزيتون؟
- ٣- ما العلامة التي تدل على صلاحية ثمار الزيتون للقطف لاستخراج الزيت؟

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يصف نخيل البلح نباتياً.
- يتعرّف المساحة الإجمالية لمزارع النخيل في المملكة الأردنية الهاشمية.
- يتعرّف مناطق زراعة النخيل في الأردن.

## المفاهيم والمصطلحات

العائلة النخيلية.

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر / أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بعمل مراجعة سريعة للحصة السابقة، ثم ينفذ المعلم جلسة لمناقشة الوصف النباتي لنخيل البلح، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: هل يعدّ النخيل من النباتات الدائمة الخضرة أم من النباتات المتساقطة الأوراق؟ كيف تقسم نخيل البلح حسب المناخ الملائم لزراعته؟ هل يعدّ نخيل البلح من فاكهة المناطق الاستوائية أم من فواكه المناطق تحت الاستوائية؟ ما اسم العائلة التي تنتمي لها نباتات النخيل؟ ما اسم النوع الذي ينتمي له نخيل البلح؟ ما اسم الجنس الذي ينتمي له نخيل البلح؟ ما اسم الرتبة التي ينتمي لها نخيل البلح؟ ما الاسم العلمي لنخيل البلح؟ ما الموطن الأصلي لنخيل البلح؟ هل يعدّ نخيل البلح من نباتات الفلقة الواحدة، أم من نباتات الفلقتين؟ علل إجابتك. هل يعد نبات النخيل ثنائي المسكن، أم وحيد المسكن؟ لماذا؟
- مناقشة إجابة الطلبة، وتدوين الصحيح منها على السبورة.

التعلم التعاوني / العمل في الكتاب المدرسي

- لتعرّف المساحة الإجمالية لمزارع النخيل ومناطق زراعته في المملكة الأردنية الهاشمية يعرض المعلم الشكلين (٣٣-١)، و (٣٤-١) ثم يقسم الطلبة إلى ثلاث مجموعات، ويكلف كلًّا منها ما يأتي:
- المجموعة الأولى: تدرس تطور مساحات النخيل في المملكة خلال الأعوام (١٩٩٥-٢٠٠٩م)، وتجب عن الأسئلة الآتية: كم تبلغ المساحة الإجمالية لمزارع النخيل في المملكة؟ ما أسباب تزايد مزارع مساحات النخيل في المملكة خلال الأعوام (١٩٩٥-٢٠٠٩)؟
- المجموعة الثانية: تدرس تطور مساحات النخيل في المملكة خلال

## سادساً نخيل البلح

النخيل *(Phoenix Dactylifera)*: من النباتات المعمرة الدائمة الخضرة، وهي من فواكه المناطق تحت الاستوائية، تنتمي إلى العائلة النخيلية (Palmaceae) المنتمة إلى الرتبة (Palmae)، ومن المرجح أن موطن نخلة التمر الأصلي هو منطقة الخليج العربي، وهناك دلائل تشير إلى أن زراعة نخيل التمر قد عرفت لأول مرة في بلاد الرافدين (العراق)، وعرفت زراعته في الحقبة الزمنية نفسها في منطقة وادي النيل، ويُذكر أن مدينة أريحا التي هي من أقدم مدن التاريخ، كانت تسمى "مدينة النخيل" لكثرة أشجار النخيل فيها.

والنخيل من نباتات الفلقة الواحدة، فبماذا تتصف هذه النباتات؟ تتكون من جذع منفرد، في قمته برعم طرفي ضخم يعدّ مسؤولاً عن استطالة الجذع وتغلّظه، ونحو السعف الذي يحوي براعم في إبطه، ولا تحتوي شجرة النخيل على ما يسمى بمنطقة الكامبيوم، ولا يتكون لها نموات ثانوية، كسائر الأشجار، والنخيل ثنائي المسكن، أي أن هناك أشجاراً مذكرة وأخرى مؤنثة. وتشير الإحصاءات إلى أن المساحة الإجمالية لمزارع النخيل في المملكة تبلغ (٢٣٣٠٠) ألف دونم، تتركز في محافظة البلقاء، في لواتي دير علا، والشونة الجنوبية، ومحافظة العقبة، ومحافظة إربد. وبين الشكل (٣٣-١) تطور مساحات النخيل في المملكة خلال الأعوام ١٩٩٥-٢٠٠٩م.



الشكل (٣٣-١): تطور مساحات النخيل في المملكة خلال الأعوام ١٩٩٥-٢٠٠٩م.

١٢٢

الأعوام (٢٠١٢-٢٠٠٩م)، وتجب عن الأسئلة الآتية: كم تبلغ المساحة الإجمالية لمزارع النخيل في المملكة؟ ما أسباب زيادة مساحة مزارع النخيل في المملكة خلال الأعوام (٢٠١٢-٢٠٠٩م)؟

- المجموعة الثالثة: تتأمل الشكل (٣٤-١)، وتحدد مناطق زراعة النخيل في المملكة الأردنية الهاشمية، ينظم الطلبة النتائج التي يتوصلون إليها، ثم يعرضونها، ويناقشونها للتوصل إلى فهم صحيح موحد لدى الطلبة جميعهم.



### مراعاة الضروك الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف بعض الطلبة كتابة تقرير يتضمن القيمة الغذائية لنخيل البلح، وعرض ما يتوصلون إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية ومناقشته مع زملائهم .

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٦٩)
- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: قائمة رصد (١-٧٠)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

– كتاب الإنتاج النباتي – المستوى الأول.

### مصادر التعلم

#### للمعلم

– آلاء وهبة، ويوسف العمري، دليل إنتاج نخيل التمر (زراعة النخيل في وادي الأردن، وزارة الزراعة- المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، مشروع الصادات البستانية ونقل التكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٧م.

#### للطالب

– أطلس الأردن والعالم، المركز الجغرافي الملكي الأردني، عمان، الأردن، ٢٠٠٢م.

تأمل الشكل (١-٣٤)، ثم حدّد مناطق زراعة النخيل في المملكة الأردنية الهاشمية



• مناطق زراعة النخيل في الأردن

الشكل (١-٣٤): خريطة المملكة وبيان مناطق زراعة النخيل في الأردن.

#### نشاط (١-٩)

اكتب تقريرًا تبين فيه القيمة الغذائية لنخيل البلح، واعرض ما تتوصل إليه، وناقشه مع زملائك.


#### الإزهار والإثمار

تحمّل البراعم الزهرية، وهي من النوع البسيط، في الأشجار المذكرة أو الموننة جانبيًا في آباط الأوراق التي تكونت في السنة السابقة، وتفتح عن نورات زهرية تعرف بالإغريض، ويحمل

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

كل إغريض داخل الطلع عدداً كبيراً من الأزهار يتراوح بين (٨٠٠٠-١٠٠٠) من النورات الأنثوية، وأكثر من ذلك في النورات الذكورية، ويتراوح عدد الأغاريض التي تحملها النخلة سنوياً من صفر- ٢٥ في الأشجار المؤنثة، ويمكن أن يصل العدد إلى ٣٠ إغريضاً في حالة الأشجار المذكورة. ويبدأ التمايز الزهري للبراعم في شهر آب، إذ يستمر نمو تلك البراعم ببطء خلال الخريف والشتاء، إلى أن تتفتح في فصل الربيع عن نورات تسمى الواحدة إغريضاً، ولكل إغريض غلاف. ويبين الشكل (١-٣٥) النورات في التخيّل.



إغريض مذكر.

إغريض مؤنث.

الشكل (١-٣٥): النورات في التخيّل.

① التلقيح في التخيّل: تعدّ أشجار التخيّل من النباتات الثنائية المسكن، إذ تحمل الأزهار المذكرة على شجرة والأزهار المؤنثة على شجرة أخرى، ثمّ تنتقل حبوب اللقاح من شجرة إلى أخرى، ويكون ذلك بمساعدة النبات على نقل حبوب اللقاح لضمان الحصول على منتج جيد.

ولضمان نجاح عملية التلقيح ينبغي مراعاة الشروط الآتية:

١. إجراء عملية التلقيح تحت أشعة الشمس.
٢. تجنب إجراء عملية التلقيح في أثناء هطل الأمطار، أو في أوقات الغيوم، أو الضباب.


١٢٤

لتلقيح الأزهار المؤنثة الناضجة مباشرة، ويمكن استخلاص حبوب اللقاح، منفصلة، باستعمال المناخل المناسبة؛ لفصله عن باقي أجزاء الزهرة.

٣. طرق تلقيح أشجار التخيّل: تُلَقَّح أزهار أشجار نخيل التمر بأحد الأسلوبين الآتيين:
  - أ. التلقيح الطبيعي: الأسلوب الطبيعي لتلقيح أشجار نخيل البلح، وذلك بواسطة الرياح، ويتوافر عدد كافٍ ومساهمٍ من الفحول المذكرة لتلقيح الأشجار المؤنثة؛ للحصول على نسبة عُقد جيدة، والتلقيح بهذا الأسلوب غير مجدٍ اقتصادياً.
  - ب. التلقيح الصناعي: في هذه الطريقة يتدخل الإنسان في عملية التلقيح، وذلك بزراعة أعداد قليلة من الأشجار المذكرة (الفحول) في المزارع التجارية، ثمّ تجمع حبوب لقاح هذه الفحول لإجراء عملية التلقيح الصناعي، يدوياً، أو ميكانيكياً.

وتجرى عملية تلقيح نخيل البلح وفقاً للخطوات الآتية:

\* الإغريض الذكري يقصّ ويشقّ، عند نضجه في نهاية شباط إلى أول آذار، وتؤخذ الشماريخ الزهرية، وتوضع في مكان جافّ بعيداً عن التيارات الهوائية، أو في غرفة تجفيف، ويقبّل بضعة أيام، حتى لا تتعفن الأزهار، بسبب احتواء الإغريض على نسبة رطوبة عالية، انظر الشكل (١-٣٧).



الشكل (١-٣٧): جمع الأغاريض الذكورية.

١٢٦

— ينظم الطلبة النتائج التي تيوصلون إليها، ثم يعرضونها ويناقشونها لتتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

## المفاهيم والمصطلحات

الإغريض، النباتات الثنائية المسكن.

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

— لتعرّف طبائع الإزهار والإثمار في نخيل البلح يعرض المعلم الشكل (١-٣٥)، ثم يقسم الطلاب إلى مجموعات على النحو الآتي:

- المجموعة الأولى: توضح المقصود بالإغريض؟ كم عدد النورات الأنثوية التي يحملها كل إغريض داخل الطلع؟ كم عدد النورات الذكورية التي يحملها كل إغريض داخل الطلع؟
  - المجموعة الثانية: تحدد عدد الأغاريض التي تحملها النخلة سنوياً في الأشجار المؤنثة، وتحدد عدد الأغاريض التي تحملها النخلة سنوياً في حالة الأشجار المذكرة.
  - المجموعة الثالثة: تدرس التمايز الزهري في نخيل البلح، وتجيّب عن الأسئلة الآتية: ما المقصود بالتمايز الزهري؟ متى يبدأ التمايز الزهري للبراعم، كيف تنمو البراعم الزهرية؟ متى تتفتح البراعم الزهرية؟ ماذا تسمى النورات الناتجة من تفتح البراعم الزهرية في فصل الربيع؟
- يقدم منسق كلّ مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

## التعلم التعاوني / الزيارة الميدانية

— لتعرّف كيفية إجراء عملية تلقيح النخيل، ينظم المعلم زيارة ميدانية لإحدى مزارع نخيل البلح، ولمشاهدة كيفية إجراء ذلك، ثم يقسم الطلبة إلى خمس مجموعات، ويكلف كل مجموعة إعداد تقرير يتضمن ما يأتي:

- المجموعة الأولى: الشروط التي يجب مراعاتها لضمان نجاح عملية تلقيح النخيل.
- المجموعة الثانية: كيفية اختيار فحول نخيل البلح، وأهم الصفات الواجب توافرها في فحول نخيل البلح الجيد.
- المجموعة الثالثة: كيفية جمع حبوب اللقاح وتخزينها.
- المجموعة الرابعة: طرق تلقيح أشجار النخيل.
- المجموعة الخامسة: خطوات إجراء عملية تلقيح نخيل البلح.

## الملاحق

ملحق أدوات التقويم (١-٧١).

## مراعاة الضروك الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف بعض الطلبة زيارة إحدى مزارع نخيل البلح، ومشاهدة كيفية إجراء عملية تلقيح النخيل تلقيحاً يدوياً، ثم مناقشة أهمية هذه العملية وطريقة إجرائها.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٧١)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

### للمعلم

### للطالب

- يجب التأكد من حيوية حبوب اللقاح وصلابيتها للتلقيح.
- يوضع في القنوات كمية كافية من شماریخ حبوب اللقاح، لتلقيح الأزهار المؤنثة. اختيار فحول نخيل البلح، كما في الشكل (١-٣٦): وفي ما يأتي أهم الصفات الواجب توافرها في فحول نخيل البلح الجيد:
  - أ. أن يكون موعد نضج حبوب اللقاح متزامناً مع وقت إزهار الإناث، أو يسبقه قليلاً.
  - ب. أن يكون هناك توافق بين حبوب اللقاح والأشجار المؤنثة.
  - ج. أن ينتج فحول نخيل البلح كمية كبيرة من حبوب اللقاح، تتراوح بين ٢٥٠-٧٥٠ غم/فحول، وينبغي أن تكون ذات حيوية عالية.
  - د. أن ينتج الفحول أغاريض زهرية ذات أعداد وحجوم كبيرة.
  - هـ. ينتج فحول نخيل البلح الجيد بين ١٠-٣٠ إغريضاً سنوياً.
  - و. يمتاز بعدم تساقط الأزهار من شماریخها وبقايتها ملتصقة مدة أطول، ومن الأمثلة على فحول نخيل البلح المعروفة في العراق (الغلامي الأحمر، والأخضر، والخكري: سيمسي، وجريطلي، ووردي)، وفي أمريكا: (جارس، وموسك، وفاردي)، وفي مصر (الحياني والسيوي والصعيدي).
- جمع حبوب اللقاح، وتخزينها: يكون ذلك بجمع الأغاريض الذكرية عند نضجها،



الشكل (١-٣٦): فحول نخيل البلح.

ويستدل على نضجها بخروج الإغريض الذكرية كاملاً من إبط السعفة، وانتفاخه، وبداية انشقاق غلافه الخارجي، ويقص قبل حدوث الانشقاق، بشرط التأكد من نضجه، بالضغط على منتصف الإغريض بالإبهام، وسماع صوت مكتوم. وتجفّ الشماریخ الزهرية الذكرية في مكان جاف جيد التهوية، معتدل الحرارة (٢٨-٣٢°س)، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، وتستغرق هذه العملية (٣-٥) أيام، يمكن بعدها قص هذه الشماریخ،

١٢٥



الشكل (١-٣٧): تجفيف الشماریخ الزهرية.

- \* تجمع الشماریخ الجافة في صناديق جافة ونظيفة، ويمكن جمع حبوب اللقاح وحدها؛ وذلك بعد نفضها؛ للحصول على حبوب اللقاح المتناثرة، ثم توضع في عُلب محكمة الإغلاق.
- \* إزالة الأشواك من سعف الأشجار المؤنثة المنوي تلقيحها، كما في الشكل (١-٣٨).
- \* يصعد عامل التلقيح إلى الشجرة، ثم يكشف الطلع الأنثوي، ويأخذ (٣-١٠) شماریخ من



الشكل (١-٣٨): إزالة الأشواك من سعف الأشجار المؤنثة.

١٢٧

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى



## النتائج الخاصة

- يوضح المقصود بعملية التكميم في نخيل البلح.
- يتعرف العوامل المناخية التي تؤثر في نخيل البلح.
- يصف التربة التي تنمو أشجار نخيل البلح فيها.

## المفاهيم والمصطلحات

التكميم

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر / أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بعمل مراجعة سريعة للحصة السابقة، ثم ينفذ المعلم جلسة لمناقشة عملية تكميم نخيل البلح مستعيناً بالشكل (١-٤٢)، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ماذا تُسمى تغطية النورة الملقحة بكيس من الورق بعد إتمام عملية التلقيح؟ ما المقصود بعملية التكميم؟ لماذا يستحسن أن تكون الأكياس المستعملة في عملية التكميم مثقبة؟ ما فوائد عملية التكميم؟
- مناقشة إجابات الطلبة، وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرف العوامل المناخية التي تؤثر في نخيل البلح، يقدم المعلم عرضاً توضيحياً لهذه العوامل ثم يقسم الطلاب إلى مجموعات، ويهيئ البيئة الصفية المناسبة للعمل، ويكلف الطلبة ما يأتي:
- المجموعة الأولى: تدرس الاحتياجات الحرارية لنخيل البلح.
- المجموعة الثانية: تدرس تأثير الأمطار والرطوبة النسبية في نخيل البلح.
- المجموعة الثالثة: تدرس تأثير الرياح في نخيل البلح.
- المجموعة الرابعة: تدرس الاحتياجات الضوئية لنخيل البلح.
- ينظم الطلبة النتائج التي يتوصلون إليها، ثم يعرضونها ويناقشونها للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

التدريس المباشر / أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بعمل مراجعة سريعة للحصة السابقة، ثم ينفذ المعلم جلسة لمناقشة التربة التي تنمو أشجار نخيل البلح فيها، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما أنواع التربة التي تنمو أشجار نخيل البلح فيها؟ ما مواصفات التربة التي تنمو أشجار نخيل البلح فيها؟ ما التربة الملائمة لنمو أشجار نخيل البلح؟ ما أثر زيادة ملوحة التربة في نمو أشجار نخيل البلح؟
- مناقشة إجابات الطلبة، وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

الشمرايح الزهرية، وتنفذ على الأزهار الأنثوية، ثم توضع على نحو معكوس وسط الإغريض، ثم يربط الإغريض الأنثوي، انظر الشكل (١-٣٩).



الشكل (١-٣٩): عملية التلقيح بواسطة الأغاريفض.

\* في حالة استعمال حبوب لقاح فقط، فإننا نضعها داخل كيس قماش، ثم نهزها على الأزهار المؤنثة، أو نغمس قطعة قطن في حبوب اللقاح، ونمسح بها الأزهار المؤنثة، ويمكن القيام بذلك باستعمال العلب (البلاستيكية ذات الأغشية المثقبة). وقد يقص الجزء العلوي من الإغريض المؤنث قبل تلقيحه بهدف خف الثمار، كما في الشكل (١-٤٠).



الشكل (١-٤٠): عملية التلقيح بالتعفير.

١٢٨

- \* يمكن إعادة التلقيح بعد ٥-٧ أيام، حسب الصنف والظروف الجوية.
- \* يختص عادةً فحل نخيل واحد لكل (١٥-٢٥) شجرة نخيل مؤنثة.

## زيارة ميدانية

زر إحدى مزارع نخيل البلح، وشاهد كيفية إجراء عملية التلقيح اليدوي للنخيل، ثم ناقش زملاءك في أهمية هذه العملية، وطريقة إجرائها.

التكميم: بعد إتمام عملية التلقيح ينصح بتغطية النورة الملقحة بكيس من الورق، وهذه العملية تسمى التكميم، ويستحسن أن تكون الأكياس مثقبة من أجل التهوية، وتخفيض درجة الحرارة والرطوبة داخل الكيس. ومن فوائد التكميم منع تطاير حبوب اللقاح؛ مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإخصاب ويحد من وجود ثمار غير مخضبة، ويكبر في النضج، ويزيد من حجم الثمار، ويقلل من الإصابة بحشرة الحميرة.

## المناخ

في ما يأتي العوامل المناخية التي تؤثر في نخيل البلح:

① الحرارة: يحتاج النخيل إلى فصل نمو طويل، وحار، وجاف، ومشمس، وشتاء معتدل الحرارة، فهو يتحمل درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى ٥٤ س°، ولا يتحمل الصقيع، إذ تتجمد أطراف سعفه في درجة -٦ س°، ويتجمد جريده في درجة -٩ س°. ويبدأ نخيل البلح بالإزهار عندما تزيد درجة حرارة الظل عن ١٨ س°، أما أفضل عقد للثمار فيكون عندما تصل درجة الحرارة إلى ٢٥ س°، ويصل النبات إلى قمة النشاط عندما تتراوح درجات الحرارة بين ٣٢-٣٨ س°.

② الاحتياجات الحرارية (التجميع الحراري): تبلغ عدد الوحدات الحرارية التي تحتاج إليها الأصناف الطرية من بداية الإزهار إلى نضج الثمار، ١٢٥٠ وحدة، أما الأصناف الجافة ونصف الجافة فتقدر احتياجاتها للجو بـ (١٩٠٠-٢٦٠٠) وحدة أعلى من ١٨ س°.

③ الأمطار والرطوبة النسبية: يتضرر النخيل من الأمطار والرطوبة الجوية العالية، وبخاصة في أثناء التلقيح والإثمار ونضج الثمار، فهي تعرق عملية التلقيح، وتؤثر في الأزهار، وتزيد من فرص انتشار الأمراض المتعلقة بالأزهار، مثل مرض خياس الطلع، وغيره، وقد يؤدي إلى تعفن الثمار الناضجة وتحمضها.

١٣٠

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف بعض الطلبة ضمن العمل في مجموعات البحث عن الطرق المتبعة لإكثار نخيل البلح في المصادر المعرفية المتاحة، ثم عرض ما يتوصلون إليه على زملائهم.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: سجل وصف سير التعلم (١-٧٢)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

– عواد حسين، ماجدة بهجت، الخصائص العامة للحاصلات البستانية بعد الحصاد وعلاقتها بالتكنولوجيا المستخدمة في التداول بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية ستامفورد أنكتكت – الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٧م.

### للطالب

\* عند استعمال الطرق الميكانيكية للتلقيح، مثل استخدام آلات التعفير، أو إذا كانت كمية حبوب القاح غير كافية، فإن الحبوب تخلط بمادة مائلة، مثل الطحين، أو بودرة التلك، بنسب مختلفة، انظر الشكل (٤١-١).



الشكل (٤١-١): خلط حبوب القاح بمادة مائلة.

\* يفضل إجراء التلقيح بدءًا من اليوم الثاني إلى اليوم الرابع من تفتح الإغريض الأنثوي، قبل أن تجفّ مياسم الأزهار الأنثوية، مع أن مدة التلقيح قد تستمر إلى ما يقرب من ١٥ يومًا، حسب الصنف والظروف الجوية السائدة.



الشكل (٤٢-١): وضع كيس على البورة الزهرية بعد التلقيح مباشرة.

\* يفضل إجراء التلقيح في الصباح بعد تبخر الندى، وقبل ارتفاع درجة الحرارة، ولا ينصح بإجرائه عند نزول الأمطار.

\* يوضع كيس على البورة الزهرية بعد التلقيح مباشرة؛ لزيادة نسبة عقد ثمار البلح، انظر الشكل (٤٢-١).

١٢٩

١ الرياح: يتحمل نخيل البلح الرياح الصيفية الشديدة الحرارة والمثيرة للأتربة نظرًا إلى مرونة جذعه وعمقه، ولكن الأتربة والرمال تؤثر في ثماره في مراحل الرطب والتمر، وتؤثر الرياح الشديدة الحرارة والجافة في مياسم الأزهار الأنثوية، وتؤدي إلى جفافها، ومما يعوق نجاح التلقيح، أما الرياح الباردة فتؤثر سلبًا في إنبات حبوب القاح ونجاح التلقيح.

٢ الضوء: تتطلب أشجار نخيل البلح احتياجات عالية من حيث شدة الإضاءة، فإذا نمت شجرة النخيل في منطقة ظل، أو حجب الضوء عنها، فإن ذلك يؤثر تأثيرًا سلبيًا في محصولها وجودة ثمارها.

### ٣ التربة

تنمو أشجار نخيل البلح في أنواع متعددة من التربة، فهي تتحمل الأراضي المالحة والقلوية أكثر من أي شجرة مثمرة أخرى، إلا أنها تفضل الأراضي العميقة الجيدة الصرف والتهوية، التي يمكن للماء أن يتخللها بعمق لا يقل عن مترين، ويوجد النخل ويكون أسرع نموًا في التربة الخفيفة العميقة منه في التربة الثقيلة الطينية، وتؤدي زيادة ملوحة التربة إلى صغر حجم الجريد، وانحنائه، وضعف نمو الخوص، وقلة انتشاره، واصفرار لونه.

### ٤ طرق التكاثر

تطورت الطرق المتبعة في تكثير نخيل البلح على مر التاريخ، وقد كان لطريقة التكاثر البذري (الجنسي) الفضل في انتشار الأصناف التجارية الموجودة حاليًا وتكاثرها، بالإضافة إلى استعمال طرق التكاثر الجنسي لأغراض البحث، أو لإنتاج النخيل للزينة، وقد كانت الفسائل – إلى وقت قريب – الوسيلة الوحيدة للإكثار الخضري، ثم أدخلت تقنيات الزراعة بالأنسجة في أواخر الستينات من القرن العشرين.

يتكاثر النخيل بالطرق الآتية:

١ التكاثر بالبذور: تنبت بذور البلح بسهولة إذا زرعت على عمق ٥، ٢ سم تقريبًا في أرض جيدة التهوية، وتزرع البوي عادةً في آخر فصل الشتاء، أي في نهاية شباط. ومع أن هذه الطريقة مهمة لأغراض التهجين، إلا أنها ليست الطريقة الملائمة لتكاثر نخيل التمر؛ للأسباب الآتية:

١. إن البذور تنتج غراسًا غير معروفة الجنس (٥٠٪ ذكور، ٥٠٪ إناث)، ويمكن تمييزها بعد وصول الغراس إلى مرحلة الإثمار.

١٣١

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى



## النتائج الخاصة

- يتعرف الطرق المتبعة في إكثار نخيل البلح.
- يتعرف مسافات الزراعة المناسبة لبساتين نخيل البلح .
- يصف عمليات الخدمة في بساتين نخيل البلح (التقليم، التسعيف).
- يوضح المقصود بالتسعيف

## المفاهيم والمصطلحات

التسعيف

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بعمل مراجعة سريعة للحصة السابقة، ثم ينفذ المعلم جلسة مناقشة عامة عن مسافات زراعة النخيل، ومفاهيم التقليم، والتسعيف وطرق تكثير نخيل البلح، ويمكن الاستعانة بالأسئلة الآتية:

- ما مسافات الزراعة المناسبة للنخيل في البساتين؟
- كيف يمكن الاستفادة من المسافات الفارغة بين أشجار النخيل؟
- ما هدف تقليم أشجار النخيل؟
- كيف تقلم أشجار النخيل؟
- ما مواعيد تقليم أشجار النخيل؟
- ما المقصود بالتسعيف؟ ولماذا يستخدم؟
- يناقش المعلم إجابات الطلبة ويدون ما هو صحيح منها على السبورة.

التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للموضوع بتنفيذ جلسة مناقشة خدمة بساتين البلح، ويمكن الاستعانة بالأسئلة الآتية:

- ما أهم الخدمات التي تقدم للنخيل؟
- كيف تقلم أشجار نخيل البلح؟
- ما أهداف تقليم أشجار نخيل البلح؟
- ما مواعيد تقليم بساتين نخيل البلح؟
- تنظم إجابات الطلبة وتدوين الملاحظات على السبورة.

٢ . النباتات الناتجة تتأخر في الإنتاج، وغالبًا ما يكون إنتاجها من الثمار متدني المواصفات.

٣ . لا يمكن إنتاج أشجار متشابهة، أو مطابقة للأصل.

التكاثر الخضري بالفسائل: يُجرى التكاثر الخضري في نخيل البلح بواسطة الفسائل الناتجة من المرستيم الموجود في آباط الأوراق على أشجار النخيل الصغيرة، وهذه الفسائل تكون مجموعًا جذريًا من قواعدها، وذلك بعد ٣-٥ سنوات من نموها على النخلة الأم. ويمكن تنشيط الفسائل القريبة من سطح الأرض، ومساعدتها على تكوين الجذور بتكويهم الأتربة حول قواعدها، ثم تفصل عن الأم، وتررع في المشتل، وقد ينح بعضهما، ويكون جذورًا، وبعضها الآخر يموت. تبدأ عملية فصل فسائل النخيل بإزالة التربة من حول قواعدها، وترك جزء مغطى بالتربة من (٥-٧ سم)؛ لنفاذي تضرر الجذور الصغيرة، ثم يكشف مكان اتصال الفسيلة بالأم ثم تفصل، وقد تزال الأوراق السفلية، وتترك الأوراق الأخرى التي يبلغ عددها ١٠-١٢ ورقة، ثم تربط من الأعلى بسلك سميكة، ثم تقصر إلى مكان الربط، وبعد ذلك تنقل إلى حفرة مجهزة لها، ويراعى أثناء النقل، وبخاصة في المناطق ذات المناخ الجاف، بذل عناية فائقة، لتجنب موت الجذور قبل أن توضع في الحفرة وقبل الرّي، انظر الشكل (١-٤٣) الذي يبين التكاثر الخضري للنخيل بالفسائل.



١٣٢

٤ . تقليل الكلفة الزراعية على مدار العام.

٥ . حفظ المادة الوراثية.

٦ . سهولة النقل، وبخاصة إلى المسافات الطويلة.



الشكل (١-٤٤): التكاثر بزراعة البراعم والأنسجة.

مواعيد زراعة الفسائل في الأردن: يمكن زراعة فسائل نخيل البلح في أي وقت من السنة ما عدا أشهر الشتاء الباردة لأن النمو يكون بطيئًا، وماعدا أشهر الصيف المرتفعة الحرارة؛ لأنها تتسبب في جفاف الفسائل وموتها، وتجري عمليات الزراعة في مواعيد رئيسين، هما:

- ١ . فصل الربيع: ( آذار - نيسان - أيار ) .
  - ٢ . أواخر فصلي الصيف والخريف: ( أيلول، وتشرين أول، وتشرين ثاني ) .
- وينصح بزراعة الفسائل في أواخر فصل الصيف؛ لتجنبها الحرارة الشديدة التي تؤدي إلى موتها.

#### ٥ مسافات الزراعة:

تررع أشجار النخيل على مسافات تتراوح بين ٨-١٠ م بين الأشجار، ويمكن استغلال المسافة التي بين الأشجار لزراعة أشجار، مثل الحمضيات، والجوافة، وغيرها من الأشجار التي يناسبها المناطق الدافئة.

#### ٦ عمليات الخدمة

تشمل خدمة بساتين نخيل البلح العمليات الآتية:

١٣٤

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

– عرض فيلم توضيحي يتضمن عمليات خدمة بساتين نخيل البلح.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: القلم والورقة
- أداة التقويم: اختبار (١-٧٣)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

– جلال المحتسب، وهاني غنيم، الدليل الحقلّي لعمليات خدمة نخيل التمر، وزارة الزراعة – المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٧م.

### للطالب



الشكل (١-٤٣): التكاثر الخضري للنخيل بالفسائل.

هل تنجح طرق التكاثر بالتطعيم في النخيل؟ علّل إجابتك؟

- التكاثر بزراعة البراعم والأنسجة، انظر الشكل (١-٤٤): تؤخذ براعم طرفية من فسائل النخيل تتراوح أعمارها بين (٢-٣) سنوات، بحيث يكون ارتفاع البرعم (١٠ سم)، وقطر قاعدته (١٠ مم)، ثم يقطع البرعم طولياً إلى أربعة أجزاء متشابهة، باستعمال أدوات معقمة، ثم تنقل وتزرع في وسط غذائي صناعي، ثم يعاد تقطيعها مرة أخرى قطعاً، فطر كل منها ٤ مم، ثم تزرع في وسط غذائي للحصول على مستعمرات جديدة، ويُستمر في زراعتها للحصول على أجزاء خضريه يتشكل منها نبات كامل له ساق، وجذر يبلغ طوله (١٠-١٥ سم)، إذ يُنقل ويزرع في التربة. وباستخدام هذه الطريقة يمكن الحصول على نباتات صالحة للنقل إلى التربة من برعم واحد خلال (٢-٣) أشهر، وبذلك يمكن تجاوز الصعوبات الناتجة من التكاثر بواسطة الفسائل، أو البذور. وتتميز هذه الطريقة بما يأتي:
١. التكاثر السريع لأي أعداد مطلوبة، ومن أي صنف مرغوب.
  ٢. خلوّ الأشغال من الآفات والأمراض.
  ٣. الأشغال المكثرة بالأنسجة متماثلة في الحجم والشكل.

١٣٣

## التقويم: تحتاج أشجار نخيل التمر إلى التقليم، بهدف الموازنة بين المجموع الجذري

والخضري، ولتسهيل عمليات الخدمة والرعاية المقدمة لها، و يكون ذلك بإزالة السعف القديم، ليحل محله أوراق جديدة غضة ذات قدرة عالية على التمثيل الغذائي الذي يزيد من إنتاجية الشجرة. ويقتصر التقليم في السنوات الأولى من عمر النخلة على إزالة السعف الجاف الذي توقّف عن القيام بوظائفه، وكذلك السعف الموجود في الجورة، الذي يعوّق العمل، ويترك الليّف والكرب؛ لحماية رأس النخلة. وتجرى عملية تقليم النخيل وتشذيبه مرة واحدة في السنة، أو كلما دعت الحاجة؛ لإزالة السعف الجاف فقط؛ وتشذيب قواعد السعف، أو تهذيبها.

١. أهداف تقليم نخيل البلح: تقلم أشجار نخيل البلح، لتحقيق الأهداف الآتية:
  - أ. التخلص من السعف الجاف والمريض والمصاب.
  - ب. إزالة الأشواك؛ لتسهيل الوصول إلى أغاريض النخلة، سواء في أثناء التلقيح، أو القطاف.
  - ج. السماح لأشعة الشمس والهواء بالوصول إلى العذوق، ممّا يساعد على التقليل من الأمراض.
  - د. تحسين نوعية الثمار، والإسراع في نضجها.
  - هـ. تحسين منظر شجرة النخيل، وتجميلها.
  - و. الاستفادة من مخلفات التقليم، من سعف، وليف في بعض الصناعات اليدوية.
٢. مواعيد تقليم أشجار نخيل البلح: تُجرى عملية تقليم أشجار نخيل البلح في أحد مواعدين، هما:
  - أ. قبل إجراء عملية التلقيح.
  - ب. بعد جني المحصول في نهاية موسم الإثمار.
٣. تشمل عملية تقليم أشجار نخيل البلح المهمات والأعمال الآتية:
  - أ. السعيف: عملية إزالة السعف القديم الذي يزيد عمره على ٣-٤ سنوات، وكذلك الجفاف، والمصفر، والمصاب بالأمراض. وتعدّ هذه العملية من أعمال الخدمة الضرورية، إذ إن بقاء هذا السعف يعوّق العامل عند ارتفاعه إلى جذع النخلة، لخدمة العذوق.

١٣٥

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يصف عمليات الخدمة الآتية في بستتين نخيل البلح: إزالة "الراكوب" من جذع النخلة والفائض من الفسائل، وبقايا العذوق وأغلفة الطلع الباقية على النخلة، وعملية التكريب، وإزالة الاشواك، وعمليات الحراث والعزق، والتسميد، والري.
- يوضح المقصود بكل من الراكوب، والفسائل، والعذوق، والتكريب.

## المفاهيم والمصطلحات

الراكوب، والفسائل، والعذوق، والتكريب.

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرف الطرق المتبعة لإكثار نخيل البلح يقدم المعلم عرضاً توضيحياً لهذه الطرق مستعيناً بالشكلين (١-٤٣)، و(١-٤٤)، ثم يقسم الطلاب إلى مجموعات، ويهيئ البيئة الصفية المناسبة للعمل، كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تدرس إكثار نخيل البلح بالبذور من حيث الغرض من استعمال الإكثار الجنسي لنخيل البلح، وكيفية إجراء تكثير نخيل البلح بهذه الطريقة، وأسباب عدم ملائمة هذه الطريقة لإكثار نخيل التمر.
- المجموعة الثانية: تدرس عمليتي "إزالة الراكوب من جذع النخلة، والفائض من الفسائل، وبقايا العذوق وأغلفة الطلع الباقية على النخلة، وتبين المقصود بكل من الراكوب، والفسائل، والعذوق، وأهداف عملية إزالة الراكوب من جذع النخلة والفائض من الفسائل، وبقايا العذوق وأغلفة الطلع الباقية على النخلة، وكيفية إجرائها، وعملية تكريب أشجار نخيل البلح؛ بالاستعانة بالشكل (١-٤٥)، والمقصود بالتكريب، وأهدافه، والموعد المناسب لإجرائها، وكيفية إجرائها، والأدوات المستخدمة لذلك.
- المجموعة الثالثة: تدرس عملية إزالة أشواك نخيل البلح بالاستعانة بالشكل (١-٤٦) من حيث أهداف هذه العملية، وكيفية إجرائها، والأدوات المستخدمة في ذلك، وعمليات الحراث والعزق في بستتين النخيل من حيث عدد مرات الحراث في السنة، ومواعيد إجراء كل حرثة، والهدف من ذلك.
- المجموعة الرابعة: تدرس عملية تسميد بستتين النخيل من حيث الشروط التي ينبغي مراعاتها عند القيام بعمليات تسميد أشجار النخيل، وبرنامج تسميد أشجار النخيل البالغة، وعملية ري بستتين النخيل؛ بالاستعانة بالشكل (١-٤٧) من حيث الشروط التي ينبغي مراعاتها عند القيام بعملية ري النخيل الحديث الزراعة، والنخيل القائم في البستان. وأوقات زيادة كميات الري، وأوقات تقليلها، وأنظمة الري المستخدمة في حقول النخيل.
- المجموعة الخامسة: تبحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن برنامج ري بستتين النخيل متضمناً ما يأتي: احتياج الدونم الواحد من النخيل للري بالمتر

## الملاحق

ملحق أدوات التقويم (١-٧٤).

وتعطي أشجار نخيل البلح البالغة ما يقرب من ١٠ - ٣٠ سعة سنوياً، حسب الصنف، وعمليات خدمة الأشجار، وتعمّر السعة الواحدة ٣ - ٧ سنوات تقريباً، ويجف في المقابل العدد نفسه عند اكتمال نمو النخلة، مما يتطلب إزالته سنوياً. يقطع السعف المراد إزالته باستخدام المسيف، أو المنجل المسنن، على أن يكون القطع على ارتفاع ١٠-١٥ سم من قاعدة الكربة، ومن أسفل إلى أعلى، ومنحدرًا إلى الخارج؛ حتى لا تتجمع مياه الأمطار بين الكربة والساق. ويجب الحذر من إزالة الأوراق الخضراء والأوراق التي عمرها أقل من ثلاث سنوات؛ حتى لا تؤثر في النمو والإزهار. ويفضل بعد إجراء التقليم ألا يقل عدد السعف الموجود على الشجرة البالغة عن ١٠٠-١٢٠ سعة، لضمان محصول جيد، أو ٩-١٢ سعة، لكل قطف (عذق).

إزالة "الراكوب" من على جذع النخلة، والفائض من الفسائل: يفضل إزالة العدد الزائد من الفسائل عن الشجرة الأم، وترك ٤-٨ فقط، حسب قوة النخلة وعمليات الخدمة، وتعفر أماكن فصل الفسائل، أو ترش بأحد المبيدات الحشرية للوقاية من الإصابات الحشرية، ويفضل إزالة الفسائل التي تنمو فوق سطح التربة (الراكوب)، وعدم تركها؛ حتى لا تضعف النبات الأم، بسبب استهلاكها للمواد الغذائية.

إزالة بقايا العذوق وأغلفة الطلع الباقية على النخلة

التكريب: الشكل (١-٤٥):

تجري عملية إزالة قواعد (أصول) السعف مع الليف الذي يتخللها في فصل الخريف أو الربيع (بعد انتهاء الأمطار)، كل سنتين إلى



الشكل (١-٤٥): التكريب.

١٣٦

١. يضاف (٤-٦) م ٣ من السماد البلدي المختمر لكل دونم، تنثر على سطح التربة في فصل الشتاء، ثم تخلط جيداً فيها.
  ٢. يضاف (٢-٣) كغم من السماد النيتروجيني على (٢-٣) دفعات؛ وذلك بعد عقد الثمار، وخلال موسم النمو، أي في أشهر آذار، وأيار، وتموز.
  ٣. يضاف السوبر فوسفات بمعدل (٢) كغم/نخلة؛ وذلك كل سنتين في شهر تشرين ثاني.
  ٤. تضاف سلفات البوتاسيوم بمعدل (٢) كغم/نخلة في شهر آذار.
- وبصورة عامة يُصح بإجراء فحص للتربة، وللسماد الأخضر قبل التسميد؛ لمعرفة كميات السماد المناسبة التي يجب أن تضاف.
- عند القيام بعمليات تسميد أشجار النخيل ينبغي مراعاة الشروط الآتية:
- أ. إضافة كميات السماد المناسبة حسب الحاجة، ووفق المعدلات التي يحتاج إليها النبات.
  - ب. اتباع طريقة الريّ الغزير بعد إضافة السماد إلى التربة.
  - ج. تجنب إضافة السماد إلى أشجار النخيل في الأيام الحارة.
  - د. تجنب إضافة السماد إلى أشجار النخيل بالرش في أثناء هبوب الرياح (للفسائل الصغيرة).
  - هـ. يمكن استخدام بعض أنواع الأسمدة ذات التحلل البطيء؛ لتقليل عدد المرات اللازمة للتسميد.

## الري

من العوامل المهمة التي يتوقف عليها نجاح زراعة النخيل تزويدها بكميات مناسبة من الماء، وتوالي عملية الريّ في مواعيدها المنتظمة، وتعتمد كمية المياه المضافة على موسم الأمطار، وقوام التربة، ودرجة ملوحتها، والصنف المزروع. ويراعى ما يأتي في عملية الريّ:

● التخييل المزروع حديثاً: يتوقف نجاح زراعة التخييل الجديد على طريقة الريّ، فيجب ريه يومياً، لمدة أربعين يوماً، تبدأ منذ غرس التخييل، من دون انقطاع، حسب طبيعة التربة والظروف الجوية، ونسبة الرطوبة الأرضية، لتوفير الرطوبة حول منطقة الجذور، ولتساعدتها على النمو. وتجري عملية الريّ في ظروف معتدلة في الصباح الباكر، أو

١٣٨

المكعب، وعدد أشجار النخيل في الدونم، وكمية المياه للريّة الواحدة بالتر، وعدد الريّات التي يحتاج إليها النخيل كل أسبوع وكل شهر، ثم تعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية، وتناقشه مع الطلاب.

يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.

الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.

يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.



## مراعاة الضروك الفردية

### علاج

### إثراء

عرض فيلم توضيحي يتضمن عمليات الخدمة في بساتين نخيل البلح.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

– استراتيجية التقويم: الملاحظة

– أداة التقويم: السجل القصصي (١-٧٤).

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

- حسين العروسي، المملكة النباتية، مكتبة الإسكندرية، ١٩٩٩ م.
- حسين محمد العروسي، النبات العام، مكتبة المعارف، ٢٠٠٠ م
- محمود محمد جبر وآخرون، أساسيات علم النبات العام: الشكل الظاهري، والتركيب التشريحي، تقسيم المملكة النباتية، وظائف أعضاء النبات، ط ١، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠١ م.

### للطالب

- حسين العروسي، الأطلس النباتي، مكتبة الإسكندرية، ٢٠٠١ م.

أربع سنوات تبعاً لنشاط النخلة ونموها، بهدف التخلص من الأماكن التي قد تتجمع فيها الحشرات والمسببات المرضية. وحتى لا تتعرض أعقاب الكبر للتعفن، ولجعل جذع النخلة على نحو مدّج؛ تسهيلاتاً لارتقاء العامل.



الشكل (١-٤٦): إزالة الأشواك.

إزالة الأشواك: انظر الشكل (١-٤٦): تختص هذه العملية بقطع الأشواك الكائنة عند سيقان السعف النامي في السنة السابقة؛ لتسهيل عمليات التلقيح، وخدمة العذوق والأشجار، وذلك باستعمال المسيف، أو المنجل المسنّ المعقوف.

## ✓ الحرق والعزق

تحرث أرض بستان النخيل مرتين في السنة: الأولى قبل إجراء عملية التلقيح، للتخلص من الأعشاب، وخلط الأسمدة العضوية، والثانية في الخريف، للتخلص من الأعشاب، وزيادة نسبة الرطوبة في البستان؛ مما يؤثر في نضج الثمار.

## Ⓜ التسميد

يعدّ التّخيل أقلّ النباتات حاجة إلى العناصر الكيميائية الذاتية؛ لأنّ معظم ما يحتاجه منها موجود في التربة الطينية ومياه الريّ. وإن أكثر التّخيل حاجة إلى العناصر الكيميائية هو التّخيل المزروع في تربة فقيرة، فأشجار التّخيل المزروعة على ضفاف الأودية، وتسقى من مياه السيول، ولو مرة واحدة في السنة تستغني كلياً عن التسميد، إذ يحتاج النبات إلى ما يقرب من (١٢) عنصراً، منها عناصر رئيسة يحتاج إليها النبات بكميات كبيرة، ومنها عناصر نادرة يحتاج إليها بكميات قليلة. وفي حالة نقص أحد العناصر الكيميائية الأساسية تظهر على النبات أعراض نقص التغذية، مما يجعل الحاجة ضرورية لتعويض هذا النقص عن طريق التسميد، وتعدّ أشجار التّخيل سريعة الاستجابة للتسميد، ويستدل على سوء التسميد بقلة المحصول، واصفرار الجريد، وقلة عدده، وصغر حجمه. ويمكن تسميد أشجار التّخيل البالغة على النحو الآتي:—

١٣٧

عند المساء، ويُجنّب في أثناء فترات ارتفاع درجة الحرارة ظهوراً، وبعد تكون المجموع الجذري يروي التّخيل مرتين، أو ثلاث مرات أسبوعياً، حسب الظروف المناخية، من حيث درجة الحرارة والرطوبة.

Ⓜ التّخيل القائم في البستان: عند ري بساتين التّخيل ينبغي مراعاة ما يأتي:

١. تقارب فترات الريّ في حالة الأراضي الخفيفة أو الملححة؛ لأنّ ذلك يساعد على غسل الأملاح الموجودة حول الجذور.
  ٢. الحرص على ضمان إيصال المياه إلى منطقة انتشار جذور التّخيل.
- Ⓜ فترات الاهتمام بعملية الريّ: ينبغي زيادة كميات الريّ في الفترات الآتية:
١. قبل موسم التلقيح، لتنشيط نموّ الطلع، والتعجيل في عملية التلقيح مبكراً.
  ٢. بعد عقد الثمار مباشرة، إذ يحتاج التّخيل إلى كمية كبيرة من الماء لنمو الثمار.
  ٣. عند إجراء عملية التقويس.
  ٤. بعد جني المحصول؛ لأنّ الريّ يساعد على تنشيط التّخيل، وتكوين الطلع الجديد، علماً بأن الهكتار الواحد من بساتين التّخيل يحتاج إلى ٦٣م<sup>٣</sup> من مياه الريّ، بمعدل ريتين في الأسبوع عادةً.

Ⓜ فترات تقليل كميات الريّ: ينبغي تقليل كميات الريّ في الحالات الآتية:

١. في حالة زراعة التّخيل في الأماكن التي يكون منسوب الماء الأرضي فيها مرتفعاً.
  ٢. عند تكامل نضج القسم الأكبر من ثمارها؛ لأنّ الريّ بعد انتهاء نضج الثمار يقلل من جودة المحصول.
  ٣. في فصل الشتاء عند انخفاض درجات الحرارة يراعى عدم الإفراط في عملية الريّ؛ حتى لا تسوء صفات التّخيل، وتعرض الجذور للتعفن، وينبغي التوقف عن الريّ عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وبخاصة في ساعات الظهيرة، واستئناف ذلك في الصباح الباكر، أو المساء، كلما أمكن ذلك.
- Ⓜ أنظمة الريّ المستخدمة في حقول التّخيل، كما في الشكل (١-٤٧): في ما يأتي أنظمة الريّ المتبعة في حقول التّخيل: الريّ بالأحواض، وبالتنقيط، والسواقي.

١٣٩

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يصف عمليات الخدمة الآتية في بساتين نخيل البلح: (خف الثمار، والتدلية والتقويس، والتكيس).
- يوضح المقصود بكل من: (خف الثمار، والتدلية والتقويس، والتكيس).

## المفاهيم والمصطلحات

خف الثمار، والتدلية والتقويس، والتكيس.




## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- تعرّف عمليات الخدمة في بساتين نخيل البلح: (خف الثمار، والتدلية والتقويس، والتكيس)، يقدم المعلم عرضاً توضيحياً لعمليات الخدمة في بساتين نخيل البلح؛ مستعيناً بالأشكال (١-٤٨) و(١-٤٩) و(١-٥٠)، ثم يقسم الطلاب إلى مجموعات، ويهيئ البيئة الصفية المناسبة للعمل، كما يأتي:

- المجموعة الأولى: تدرس عملية خف ثمار نخيل البلح، بالاستعانة بالشكل (١-٤٨)، وتبين المقصود بخف الثمار، وطرقه، وفوائده.
- المجموعة الثانية: تدرس عمليتي تدلية قطوف نخيل البلح وتقويسها؛ بالاستعانة بالشكل (١-٤٩)، وتبين المقصود بكل منهما، وفوائدهما، وكيفية كل منهما.
- المجموعة الثالثة: تدرس عملية تكيس قطوف نخيل البلح؛ بالاستعانة بالشكل (١-٥٠)، وتبين المقصود بذلك، والغرض منها، وكيفية إجرائها، وأنواع الأغذية المستخدمة في عملية التكيس.
- ينظم الطلبة النتائج التي يتوصلون إليها، ثم يعرضونها، ويناقشونها للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.



الشكل (١-٤٧): أنظمة الري المستخدمة في حقول النخيل.

١٤٠

وتجرى هذه العملية عندما تبدأ الثمار في الكبر، حتى لا يؤدي تركها إلى تشابكها مع السعف، أو عدم انتظامها؛ مما يعوق نموها وجمعها بعد النضج. وتجرى عملية التقويس بضم شماريخ العرجون بعضها إلى بعض، وتدليتها إلى أسفل، ثم ثني عيدان العرجون برفق إلى الأمام، وشدّها إلى ما يجاورها من السعف، وقد يربط العرجون عند مفترق الشماريخ لضعفها، أو قد تسند بعصيّ، أو يوزع ثقلها على السعف، حسب حالة العرجون، وحجمه، ودرجة صلاحية عيدانه.

للتدلية والتقويس أهمية كبيرة، وفوائد جمّة، من أهمها:

- ① توزيع حمل النخلة بانتظام، وعدم تركيزه في جهة واحدة.
- ② تسهيل عملية جني المحصول.
- ③ منع تكسّر العذوق، وبخاصة عند ازدياد وزنها.
- ④ تسهيل الوصول إلى القطوف، خفّ ثمارها، ورشها بالمبيدات، أو لوضع الأكياس حولها.
- ⑤ زيادة تهوية العذوق، وما بين الشماريخ؛ للقليل من المشكلات المرتبطة بارتفاع الرطوبة.



الشكل (١-٤٩): التدلية والتقويس.

## ١٢١ التكيس

يقصد به: وضع القطوف في أكياس؛ انظر الشكل (١-٥٠)، وتجرى هذه العملية تحقّقاً للأغراض الآتية:

١٤٢



## مراعاة الضروقات الفردية

### علاج

### إثراء

– عرض فيلم توضيحي يتضمن عمليات الخدمة في بساتين نخيل البلح.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

– استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء

– أداة التقويم: سلم تقدير (١-٧٥)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

### للطالب

## ٤٨ خف الثمار

يقصد بذلك إزالة بعض العذوق، وتقصير الشماريخ، أو إزالة بعضها، بهدف تنظيم الحمل، وزيادة وزن وحجم الثمار وحجمها، وتحسين صفاتها، والتبكير في نضجها، انظر الشكل (٤٨-١).

① طرق خف الثمار: يُجرى خف ثمار النخيل بالطرق الآتية:

١. خفض عدد القطوف في النخلة الواحدة.
  ٢. خفض عدد الشماريخ في القطف الواحد.
  ٣. خفض عدد الثمار في الشمرخ الواحد.
- ومن الفوائد التي تتحقق بخف ثمار النخيل ما يأتي:
١. تجنب ظاهرة المعاومة، وتنظيم الحمل، وضمان إزهار كافٍ للموسم التالي.
  ٢. تحسين حجم الثمار، وتلبية متطلبات التسويق.
  ٣. تحسين نوعية الثمرة وقوامها؛ مما يزيد أسعارها وقيمتها.
  ٤. تبكير النضج.
  ٥. إتاحة الفرصة والحيز لنمو الثمار، وتقليل الفاقد من العناصر الغذائية.
  ٦. تقليل وزن القطوف وكثافتها (تراصها)؛ مما يسهل عمليات القطف والتعبئة.
  ٧. تجنب الإصابة بالآفات، وبخاصة الفطرية.



الشكل (٤٨-١): خف الثمار.

## ٤٩ التحلية والتقويس

يقصد بهذه العملية تعديل وضع القطوف (العراجين) بعد إتمام عملية الإخصاب وعقد الثمار، بحيث تأخذ وضعها الطبيعي في التدلي إلى أسفل، متخذة شكل القوس، انظر الشكل (٤٩-١).

١٤١

① حماية الثمار من الرطوبة العالية والأمطار: وخصوصاً عند تزامن هطل الأمطار مع موسم نضج الثمر.

② الحماية من الطيور: تتسبب الطيور بإحداث أضرار جسيمة لثمار النخلة، لأنها تهاجمها خلال مرحلتَي الرطب والتمر، لارتفاع حلاوتها. ولحماية القطوف من الطيور توضع شبكة بلاستيكية حولها، بشرط ألا تؤثر في التهوية اللازمة للثمار، وخاصة في المراحل المتأخرة من النضج، حتى لا تصاب بالفن، أو التخمر، بالإضافة إلى المشكلات المرتبطة بارتفاع الرطوبة حول القطوف.

③ الحماية من تساقط الثمار: تستعمل الأكياس البلاستيكية، لمنع تساقط الثمار، وخاصة في الأصناف الطرية التي توكل رطباً، والأصناف المتأخرة؛ لأنها تتأخر على الشجرة الأم، مما يعرضها للتساقط الذي ينجم عنه إصابة الثمار بالأضرار الفيزيائية والجروح، فضلاً عن إصابتها بالمسببات الحشرية والفطرية.

④ الحماية من الحشرات: من الإجراءات العملية لمكافحة الحشرات، وبخاصة الدبابير والذباب، عزل القطوف باستخدام أكياس شبكية، قياسها (١-١,٥ م) حسب حجم القطف، تربط بالسعف لمنع تأثير الرياح فيها. وأفضل وقت لوضع الأكياس هو في منتصف مرحلة الكمري وأواخرها، ويعتمد ذلك على الصنف.

ويمكن استخدام الأغشية الورقية المفتوحة من الأسفل، لسهولة خدمة القطوف ورشها، وتبدأ تغطية القطوف عند انتهاء مرحلة الكمري إلى بداية اكتساب اللون المميز لمرحلة الحلال، وينبغي تجنب استخدام الأكياس البلاستيكية؛ لأنها تزيد من تعرض الثمار لضربة الشمس، والتأثير الضار للحرارة. ويمكن استعمال الأكياس البلاستيكية في عملية قطف الأصناف الطرية، مثل الحيتاني، والزغلول، والمجهول، وغيرها من الأصناف التي تنضج على الشجرة، وذلك بهز الكيس البلاستيكي المحيط بالقطف، فتساقط الثمار داخله، ثم تجمع في أوعية خاصة من القش أو البلاستيك.

١٤٣

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يتعرف أكثر الآفات شيوعاً في بساتين النخيل.
- يتعرف أهم أصناف النخيل الموجودة في الأردن.

## المفاهيم والمصطلحات

التسعيف

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة

- التمهيد للحصة بتنفيذ المعلم جلسة لمناقشة آفات ثمار البلح، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية:

- ما أكثر الآفات التي تصيب النخيل؟
- ما أكثر الحشرات التي تصيب بساتين النخيل؟
- كيف يمكن مواجهة الآفات التي تصيب بساتين النخيل؟

التعلم التعاوني/ العمل الجماعي

- لتعرف أصناف نخيل البلح الشائعة في بساتين النخيل في الأردن، يقدم المعلم توضيحاً بالصور والأشكال المتوفرة في الكتاب المدرسي، ويقسم الطلبة إلى مجموعتين:

- المجموعة الأولى: تدرس أصناف: مجهول، ودجلة نور، وتقرن بينهما، وتجب عن الأسئلة الآتية:

■ لماذا سمي صنف مجهول بهذا الاسم؟

■ ما أشهر صنف موجود من هذه الأصناف؟

■ ما ميزات كل صنف منها؟

■ أيّ منهما تنصح المزارعين بزراعته في منطقة الأغوار؟

- المجموعة الثانية: تدرس الأصناف (برحي - نوري - الخلاص - زاهدي - مكايي - خستاوي)، وتقرن بينها، وتكتب ميزات كل صنف، ومناطق زراعته المناسبة، وتقرن حجم الثمار، ولونها ورغبة المستهلكين شرائه، مع إبداء السبب.

- ينظم الطلبة النتائج التي يتوصلون إليها، ثم يعرضونها، ويناقشونها للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.



الشكل (٥٠-١): التسعيف.

## الآفات ١٢٣

الآفات المسجلة التي تصيب نخيل التمر في الأردن تشمل ما يأتي: قشرية الزيتون، والقشرية الرمادية، والبقّ الدقيقي الكروي، والقشرية الحمراء، ودوباس النخيل، والدبّور الشرقي، والدبّور المرقط، وعثة أو دودة الطلع، وسوسة النخيل الحمراء، وحفّار عذق النخيل، وعثة الحميرة، وحلم الغبار، والدبّور الأصفر، والنمل الأبيض، وحفّار الساق الطويل القرون، وحفّار السعف، والحلمة الكاذبة، والحفّار ذو القرن، والحلمة الشرقية، وحفّار السعف الجاف، وخنفساء الأناناس، وخنفساء عصير الذرة، وخنفساء الثمار الجافة، وخنفساء نواة التمر، وعثة اللوز، أو عثة التمر، وخنفساء الثين، و فراشة الرمان، وذبابة البحر المتوسط، وثريس العنب، وجعل الأزهار، وعثة الزبيب، والقشرية السوداء، وخنفساء النخيل الطحانة، وعثة الطحين الهندية، وسوسة طلع النخيل، والجراد الصحراوي، انظر الشكل (٥١-١) الذي يمثل بعض آفات النخيل.

١٤٤

## الأصناف ١٤٤

كما في الشكل (٥٢-١) : تتميز كل دولة عن غيرها من الدول بانتشار أصناف مختلفة من التمور فيها، فمثلاً لا ينتشر صنف المجهول في المغرب العربي، ولكن ينتشر صنف دجلة نور في الجزائر والعراق، ويعدّ البرحي من أهم الأصناف وأكثرها انتشاراً، ويوجد في العديد من البلدان المنتجة للتمور عدد كبير من الأصناف التجارية التي تسوّق محلياً، أو تصدر إلى الخارج، وأصناف غير تجارية تستهلك مباشرة من المزارعين، أو أصناف تستعمل علفاً حيوانياً.

تقسم أصناف نخيل البلح حسب نوع الثمار: تقسم أصناف نخيل البلح حسب نوع الثمار إلى:

① أصناف نخيل البلح الطرية: ثمارها طرية، لارتفاع نسبة الرطوبة فيها، وهي ذات محتوى قليل من السكر، وسريعة العطب، تؤكل طازجة، أو تحفظ بالتبريد، ومنها الخلاوي، والحياطي، والخضراوي، والكتاوي، ودجلة نور، وسائر.

② أصناف نخيل البلح نصف الجافة: لحمها متماسك، وهي ذات محتوى رطوبي متوسط، ومحتوى عالٍ من السكر، وتشمل: مجهول، وزاهدي.

③ أصناف نخيل البلح الجافة: جافة، محتواها من السكر مرتفع، ومن أمثلتها: الإبريحي، وجديلة، ودجنة.



دجلة نور



مجهول

١٤٦

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف الطلبة عرض فيلم توضيحي يتضمن أهم أصناف النخيل الموجودة في الأردن.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

– استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء

– أداة التقويم: سلم تقدير (١-٧٦)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

– علي فتحي حمايل، الطرق الحديثة للمقاومة والقضاء على الحشرات والأمراض والآفات والحشائش، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠١م.

#### للطالب

– سليمان بن محمد الشبل، أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية، جامعة الملك سعود، الرياض، ٢٠٠٧م.



سوسة النخيل الحمراء.




الحفّار ذو القرون.



الدبور المرقط.



حلم الغبار.



سوسة طلع النخيل الحمراء.



حفّار ساق النخيل ذو القرون الطويلة.

الشكل (١-٥١): بعض آفات النخيل.

١٤٥



الخلاص



البرحي



زاهدي



توري



مختاوي



مكاوي

الشكل (١-٥٢): بعض أصناف نخيل البلح.

١٤٧

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى



الجدول (٨-١): أهم أصناف نخيل البلح المزروعة في المملكة الأردنية الهاشمية وإنتاجيتها وموعد نضجها واستعمالاتها.

الرقم	الصفة	الإنتاجية (كغم/شجرة)	موعد النضج	الاستعمال		
				بلح	رطب	تمر
١	مجهول	٨٠-٧٠	متأخر	√	√	√
٢	برحي	١٢٠-٨٠	متوسط - متأخر	√	√	√
٣	خضراوي	٦٠-٤٠	متوسط التبيكر	√	√	√
٤	خلاص	٦٠-٤٠	متوسط	√	√	√
٥	دجلة نور	٨٠-٦٠	متوسط - متأخر	√	√	√
٦	زغلول	١٠٠-٨٠	متوسط	√	√	√
٧	حياتي	١٥٠-٧٥	مبكر	√	√	√
٨	زاهدي	٦٠-٤٠	متوسط	√	√	√
٩	مكتومي	٦٠-٤٠	متأخر	√	√	√
١٠	أحمر طلال	١٣٠-١٠٠	مبكر	√	√	√

#### ١٥ النضج والجني

تنضج ثمار البلح في أواخر الصيف، وأوائل الخريف، ويستدل على ذلك عند اختفاء لونها الأخضر، وظهور اللون المميز للصفة (أحمر، أصفر)، ووصولها إلى الحجم الطبيعي، ونقصان مستوى المادة التي تسبب الطعم القابض، وارتفاع نسبة السكر إلى النسبة المعروفة لذلك الصنف، باستثناء أصناف البلح الجاف.

① مراحل نضج الثمار: في ما يأتي مراحل نضج الثمار:

١. خلال (البلح) Maturity stage: هي مرحلة النضج الفسيولوجي، إذ تكون الثمار صلبة وقاسية، وتحول من اللون الأخضر إلى اللون المميز للصفة (أصفر، أو أحمر....)، وتصبح نسبة رطوبته بين ٥٠-٥٨٪، ومن أصنافه: (برحي، زغلول، حياتي، طلال، ..).
٢. رطب Ripening: لونها البني، ورطوبتها منخفضة تتراوح بين ٣٠-٤٥٪، وثمارها طرية، والألياف منخفضة، ومن أصنافها: (مجهول، دجلة نور، حياتي).
٣. تمر Full Ripening: ثماره بنية غامقة، ورطوبته منخفضة (أقل من ٢٥٪)، ثم تزداد صلابته، لديه قابلية عليا للتخزين، ومن أصنافه: (ديري، خضراوي، حلاوي، زاهدي).

١٤٨

## نخيل البلح (٨): النضج والجني

## الموضوع

### النتائج الخاصة

- يصف عمليتي نضج ثمار البلح وجنيها.
- يستقصي العوامل التي تؤثر في تلف ثمار النخيل في أثناء تخزينها.
- يقترح حلولاً لمعالجة أبرز المشكلات التي تواجه ثمار النخيل في أثناء تخزينها.
- يتعرف بدائل غاز الميثيل بروميد المستخدم في تعقيم التمور.

### المفاهيم والمصطلحات

غاز الميثيل بروميد، الفوستوكسين.

### السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة:

- التمهيد للحصة بتنفيذ المعلم جلسة لمناقشة عمليتي نضج ثمار البلح وجنيها، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ماذا تُسمى عملية حدوث تغيرات فسيولوجية وكيميائية داخل الثمرة التي اكتمل نموها؟ ما المقصود بنضج الثمرة؟ متى تنضج ثمار البلح؟ ما علامات ذلك؟ ما مراحل نضج الثمار؟ ما طرق قطف العناقيد الثمرية؟ لماذا تقطف العناقيد الثمرية يدوياً مرات متعددة؟ هل يمكن قطف العناقيد الثمرية آلياً؟ لماذا؟
- مناقشة إجابة الطلبة، وتدوين الصحيح منها السبورة.

### حل المشكلات والاستقصاء

- قبل البدء بتكليف الطلبة تنفيذ خطوات الاستقصاء لا بد من تهيئتهم وإشعارهم بوجود مشكلة، وذلك بطرح السؤال الاستقصائي الآتي: ما العوامل التي تؤثر في تلف ثمار النخيل في أثناء تخزينها. • يرصد المعلم إجابات الطلاب.
- تكليف المجموعات اتباع خطوات الاستقصاء الآتية:
  - الخطوة الأولى: تحديد المشكلة بالإجابة عن السؤال السابق.
  - الخطوة الثانية: تكليف المجموعات بحث أسباب المشكلة في الكتاب المدرسي، أو المصادر المتاحة ( كتب، مواقع إنترنت، وغيرها ).
  - الخطوة الثالثة: تكليف المجموعات اقتراح حلول عملية لمعالجة المشكلة بالاستعانة بالكتاب المدرسي، أو البحث في المصادر المتاحة ( كتب، مواقع إنترنت، وغيرها ) عن حلول عملية لمعالجة أبرز المشكلات التي تواجه ثمار النخيل في أثناء تخزينها.
- توجيه المجموعة إلى إيجاد حلول تتعلق بعدم جني المحصول في مرحلة النضج المثلى، وأخرى تتعلق بالتباطؤ في تخفيض درجة حرارة الثمار الحقلية بعد جنيها منذ قطفها حتى تخزينها، وأخرى تتعلق بعدم تنظيف المخازن وتعقيمها قبل إدخال التمور إلى المخازن، وأخرى تتعلق بالتلف الميكانيكي للثمار الناجم عن سوء الرص في المخازن، وانقطاع التيار الكهربائي، وتعرض المخازن للتوقف، وتذبذب درجات الحرارة والرطوبة النسبية.

- الخطوة الرابعة: اختيار الحل الأمثل من وجهة نظر أفراد المجموعة وتعليل إجاباتهم.

- بعد الانتهاء من تنفيذ خطوات الاستقصاء يعرض مقرر المجموعة ما يتوصلون إليه من نتائج باستخدام برمجية العروض التقديمية.

### الملاحق

ملحق أدوات التقويم (١-٧٧).

تتطف العناقيد الثمرية مرات متعددة يدويًا، لأنها لا تنضج دفعة واحدة، ويمكن قطف العناقيد آليًا، وبخاصة في الأصناف الجافة ونصف الجافة.

## ١٤٧ بدائل غاز بروميد الميثايل في تعقيم التمور:

تعرض ثمار التخليل للتلف في أثناء تخزينها، وهناك أسباب عدّة تؤدي إلى ذلك، منها؛ مرحلة النضج التي تخزن بحسبها الثمار، إذ إن لكل مرحلة من مراحل نضج الثمار (خلال، أو بسر، أو رطب، أو تمر) ظروفًا مناسبة للتخزين تختلف باختلاف الأصناف، وفي ما يأتي أهم الأسباب التي تؤدي إلى تلف التمور في أثناء التخزين بصورة عامة:

- ١- عدم جني المحصول في مرحلة النضج المثلى للصنف .
- ٢- التباطؤ في تخفيض درجة حرارة الثمار الحقلية بعد جنيها، وفي أثناء تخزينها.
- ٣- عدم تنظيف المخازن وتعقيمها قبل إدخال التمور إليها.
- ٤- عدم استخدام درجة الحرارة المثلى لخن أصناف الرطب حسب محتواها المائي والسكري، إذ يمكن خزن بعض الأصناف في درجة حرارة (-٣ إلى -٥) س°، ولكن هناك أصناف أخرى يمكن تخزينها في درجة التجميد (-١٨ إلى -٢٢) س°.
- ٥- التلف الميكانيكي للثمار الناجم عن سوء الرص في المخازن.
- ٦- انقطاع التيار الكهربائي.
- ٧- تذبذب درجات الحرارة والرطوبة النسبية، بسبب عدم السيطرة على المخازن على نحو دقيق، وتكرار فتح أبوابها.

- عملية تعقيم التمور: تهدف هذه العملية إلى قتل الحشرات في أطوار حياتها كافة (البيض، واليرقات، والعذارى، والحشرات الكاملة)، وقتل مسببات المرضية جميعها، مما يسمح بإيصال التمور إلى المستهلك في حالة صحية سليمة.
- وسائل تعقيم التمور: تقسم وسائل تعقيم التمور إلى:
  ١. المكافحة الطبيعية Physical control : تشمل استخدام الحرارة والأشعة والكهرباء في المخازن ذات الجو المحكم .
  - أ. الحرارة Temperature: إذ إن لكل حشرة منطقة حرارية تكون فيها في أقصى

١٤٩

نشاطها إذا توافرت درجات الحرارة المناسبة، وأما ارتفاعها، أو انخفاضها عن هذا المستوى فإنه يجعل الحشرة خاملة، ويمكن أن يقلل نشاطها أو ينهيه، وإذا استمر فيمكن أن يؤدي إلى موتها، وقد استخدمت هذه الظاهرة بوصفها وسيلة من وسائل تعقيم المخازن، ومكافحة آفات التبريد أو التسخين.

ب. التبريد Cooling: يكون ذلك بتبريد تيار هوائي بارد في مكان تخزين التمور في مخازن باردة يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى صفر مئوي؛ لحمايتها من الإصابة بالآفات .

ج. التسخين Heating: يتوقف نشاط الحشرة، وقد تقتل، بتعرضها لدرجة حرارة تبلغ ٥٥ س°، لمدة (١٠-١٢) ساعة.

د. أشعة جاما Gamma radiation: استخدمت أشعة جاما (كوبلت ٦٠) بنجاح في تعقيم مخازن التمور، فقد وجد أن معاملة النمر بجرعة ٢٥ كيلو راد من أشعة جاما الصادرة من الكوبالت ٦٠، بتركيز ١,٢٥ × ١٠ م/ساعة، يمنع فقس البيض، ويوقف تطور اليرقات والعذارى، ويقتل الحشرات الكاملة لخنفساء الحبوب المنشارية التي توجد في الثمار مدة تتراوح بين ٣ - ١٢ شهرًا بعد التخزين، من دون التأثير في قيمتها الغذائية، أو طعمها أو رائحتها، أو مذاقها، ولكن هذه الوسيلة محدودة الاستخدام، بسبب خوف الناس من الإشعاع .

٢. المكافحة الكيميائية: تشمل هذه الطريقة استخدام مواد كيميائية مختلفة، لطرد الحشرات، أو قتلها بأطوارها جميعها، ومن هذه المواد: غاز بروميد الميثايل، والفوستوكسين.

أ. استخدامات غاز بروميد الميثايل: يستخدم "بروميد الميثايل" على نطاق واسع بوصفه مبيدًا لمكافحة الحشرات الزراعية والأحياء الدقيقة في التربة وتعقيم المناطق المغلقة، مثل المباني، والمخازن، ومصانع الأغذية، ومعالجة المنتجات الزراعية بعد الحصاد، كالتمور، والعنب، والزبيب، والمكسرات، داخل غرف محكمة، وقد يحقن في التربة على عمق ٣٠-٦٠ سم قبل الزراعة بمحاصيل البندورة، والفراولة، والتبغ، والفلفل، للقضاء على الديدان، والقواقع، والفيروسات، والأحياء الدقيقة، ثم تغطى التربة بأغطية بلاستيكية، ولا يترك هذا الغاز آثارًا سامة في التربة، وتستمر تأثيراته طوال موسم الزراعة.

١٥٠

## الزمن المتوقع ساعة (نظري)

## مراعاة الضروك الفردية

## علاج

## إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في شبكة الإنترنت أو النشرات الزراعية، عن حلول لمعالجة أبرز المشكلات التي تواجه ثمار النخيل في أثناء تخزينها وعرض ما تتوصل إليه عن طريق برمجية العروض التقديمية، ومناقشته مع زملائهم.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير لفظي (١-٧٧)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

– كتاب الإنتاج النباتي – المستوى الثاني.

## مصادر التعلم

## للمعلم

- Childers. N., Modern fruit science . U.S. Library of the Congress. ninth edition . 1983.
- Development. Utilization of Cultivated Plant. New Jersey: Printice-Hall Inc. 1991

## للطالب

- فهمي شتات وآخرون، أشجار الفاكهة، ط٢، جامعة القدس المفتوحة عمان الأردن، ٢٠٠٦ م.
- هاني غنيم، نخيل التمر النضج وعمليات ما بعد الحصاد، الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، عمان، الأردن، ٢٠٠٩ م.



## النتائج الخاصة

- يتعرّف أهم طرق تعقيم التمور المتبعة في الأردن.
- يتعرّف بدائل غاز بروميد الميثيل في تعقيم التمور المطروحة دولياً وجدواها.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرّف أهم طرق تعقيم التمور المتبعة في الأردن، يقدم المعلم عرضاً توضيحياً لأهم طرق تعقيم التمور، والتقنيات الحديثة في ذلك، ثم يقسم الطلاب إلى أربع مجموعات، ويهيئ البيئة الصفية المناسبة للعمل، ويكلف كلاً منها ما يأتي:
- المجموعة الأولى: تدرس التعقيم باستخدام الفوستوكسين، وتبيّن كيفية جمع الثمار الناضجة، وتجفيفها وفرزها، وتدريبها تمهيداً لإجراء عملية التعقيم باستخدام الفوستوكسين، وتحديد معدل الأقراص المستخدمة (قرص/م<sup>3</sup>)، وكيفية توزيع الأقراص في غرفة التعقيم، وكيفية إجراء عملية التعقيم.
- المجموعة الثانية: تدرس التعقيم باستخدام غاز الميثيل بروميد، وبيان كيفية جمع الثمار الناضجة، وتجفيفها وفرزها، وتدريبها تمهيداً لإجراء عملية التعقيم باستخدام غاز الميثيل بروميد، وتحديد معدل كمية غاز الميثيل بروميد المستخدمة (غرام/م<sup>3</sup>)، وكيفية إجراء عملية التعقيم باستخدام هذا الغاز.
- المجموعة الثالثة: تدرس بدائل غاز بروميد الميثيل في تعقيم التمور ذات الجدوى الاقتصادية المطروحة دولياً.
- المجموعة الرابعة: تدرس بدائل ليست ذات جدوى اقتصادية لغاز بروميد الميثيل في تعقيم التمور.
- المجموعة الخامسة: تدرس بدائل واعدة لغاز بروميد الميثيل في تعقيم التمور
- يقدم منسق كل مجموعة ما توصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

ب. الفوستوكسين (النيوم فوسفيد): أقراص دائرية مضغوطة أو أشربة، لها رائحة، مثل رائحة الثوم، تقتل الحشرات في أطوارها جميعها، وهي فعالة، وتعمل ببطء، وليس لها تأثير بروميد الميثيل في التسبب في هجرة الحشرات من التمرة، وتحتاج إلى مدة ٥ أيام شتاءً، و٣ أيام صيفاً لكي يبدأ تأثيرها في الحشرة، أما في وقت الحصاد فيجب أن تكون عملية التعقيم سريعة. وقد طورت الحشرات في بعض الدول مناعة ضد هذه المادة.

أهم طرق تعقيم التمور المتبعة في الأردن

١. التعقيم باستخدام الفوستوكسين (فوسفيد النيوم): تجمع الثمار الناضجة فحسب، أما الثمار الرطبة فتجفف، بواسطة أشعة الشمس، وتقسم إلى ثلاث فئات، ثم تعقم بواسطة الفوستوكسين، بمعدل (١٢ قرصاً/م<sup>3</sup> أي ٣م<sup>3</sup> ٠,٧٥ قرص/م<sup>3</sup>). توزع الأقراص في غرفة التعقيم، وتغلق مدة ٧٢ ساعة، وبعد إتمام مدة التعقيم يسحب الغاز الزائد بواسطة شفطات خاصة، وتفتح أبواب غرفة التعقيم؛ لإخراج أي كمية غاز زائدة، ثم تلمع الثمار باستخدام مواد خاصة، وتعبأ في صناديق مختلفة حسب الطلب، ثم تحفظ في برادات خاصة.
٢. التعقيم بواسطة التحكم في الضغط الجوي: أجريت تجربة عملية التعقيم بواسطة التفريغ الهوائي، والتحكم في الضغط الجوي في مزارع مختلفة، ووجد أن النتائج كانت فعالة عند توفير ضغط جوي يقدر بـ ٦٠٠ ملي بار.
٣. التعقيم باستخدام غاز بروميد الميثيل: تجمع الثمار الناضجة، ثم تعقم بواسطة غاز بروميد الميثيل بمعدل ٣٠ غرام/م<sup>3</sup>. في غرفة تعقيم محكمة الإغلاق مدة ١٢ ساعة، وبعد إتمام مدة التعقيم يسحب الغاز الزائد بواسطة شفطات خاصة؛ لإخراج أي كمية غاز زائدة، و تزال الثمار التالفة يدوياً. تغسل الثمار، وتجفف، ثم تفرز حسب وزن التمرة، ونسبة الرطوبة، وتستبعد الثمار ذات الجلد المنفصل (lose skin)، ثم تعبأ في صناديق مختلفة، حسب الطلب، وتحفظ في برادات خاصة، ومن الجدير بالذكر أن غاز بروميد الميثيل يتم التخلص من استخدامه الزراعي تدريجياً في العالم بسبب أضراره البيئية، مما يستوجب البحث عن بدائل آمنة بيئياً، وذات جدوى اقتصادية لاستخدامها في القطاع الزراعي.

١٥١

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## مراعاة الضرووق الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في شبكة الإنترنت أو النشرات الزراعية، عن مشروع التخلص التدريجي من غاز بروميد الميثيل من القطاع الزراعي الذي ينفذ بين وزارة البيئة والمركز للبحث والإرشاد الزراعي، ثم عرض ما تتوصل إليه عن طريق برمجية العروض التقديمية، ومناقشته مع زملائهم.

## استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم: مراجعة الذات
- أداة التقييم: سجل وصف سير التعلم (١-٧٨)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

كتاب الإنتاج النباتي – المستوى الثاني.

## مصادر التعلّم

### للمعلم

– مجلة المهندس الزراعي، العدد الخاص بالمؤتمر الزراعي الوطني الثاني للعددان (٦٩-٧٠)، نقابة المهندسين الزراعيين، عمان، الأردن، حزيران، ٢٠٠١م.

- George.A.Cquaah.Horticulture Principles and practices. Pearson Prentice Hall. 2005.

### للطالب

– خليل جرن، دليل المزارع السنوي، وزارة الزراعة، عمان، الأردن، ٢٠٠٨م.  
– محمد زين، الموسوعة الزراعية: الفاكهة والأشجار المثمرة، دار الطريق للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٠م.  
– ماجد الزعبي وآخرون، بدائل غاز بروميد الميثيل في الأردن، وزارة البيئة، عمان، الأردن، ٢٠٠٧م.

## تقنيات حديثة

بدائل غاز بروميد الميثيل في تعقيم التمور المطروحة دوليًا وجدواها:

١. بدائل ذات جدوى اقتصادية: تشمل كلاً من البدائل الآتية:

أ. المعالجة الحرارية: تتراوح درجة الحرارة المعالجة بين ٤٥س - ٥٥س، فقد حقق استخدام درجة حرارة تتراوح بين ٥٠س-٥٥س نتائج جيدة، وأدى ذلك إلى قتل خنفساء الثمار الجافة، وتغلب على آفاتهما. ولكن قد يؤدي استخدام درجة حرارة قدرها ٥٥س إلى انفصال القشرة عن لب الثمرة، وبذلك تصبح التمور غير صالحة لتسويقها، أما إذا كانت درجة الحرارة المستخدمة ٤٥س فإن نسبة قتل خنفساء الثمار الجافة تكون ٦٠٪ فقط.

ب. المعالجة الحرارية مع ثاني أكسيد الكربون: تستخدم هذه الطريقة في معالجة التمور المزروعة عضوياً، وقد وجد أنها تأثيراً في قتل الحشرات وطردتها، وتستخدم على نحو واسع في معالجة أصناف المجهول، ودجلة، نور، ويمكن أن تسهم هذه المعالجة في حل مشكلة التلون (browning) في الأصناف الحساسة، التي تخزن سائبة، ولكن هذه التقنية تحتاج إلى تطوير لتوصيل الحرارة في التمور التي تخزن في طبقات عدّة.

٢. بدائل ليست ذات جدوى اقتصادية، مثل فوسفين PH<sub>3</sub>: يعمل على نحو بطيء، ولكنه فعال وليس له تأثير بروميد الميثيل في التسبب في هجرة الحشرات من الثمرة، ويحتاج إلى ٥ أيام شتاءً، و٣ أيام صيفاً، ويجب أن يكون التعقيم خلال الحصاد سريعاً. وقد طورت الحشرات في بعض الدول مناعة ضد الفوسفين.  
٣. بدائل واعدة: تشمل ما يأتي:

ب. Ethyl formate: يسوق على صورة خليط مع ثاني أكسيد الكربون مضغوطاً في أسطوانات.

– أعطت الجرعة ٤٢٠غراماً/م<sup>٣</sup> نتائج جيدة عند استعمالها لمدة ١٢ ساعة.

– يحتاج اعتماد هذا البديل إلى بحوث تجريبية.

ب. (Sulfuryl Fluoride): هذا البديل مسجل ومستخدّم في الاتحاد الأوروبي،

١٥٢

والولايات المتحدة، ويعرف بأنه معقم للإنشاءات، ويتميز بما يأتي:

- فعال (ذو مجال واسع) وقليل المتبقيات.
- فعال في كل أطوار الحشرات باستثناء مرحلة البيض، فيكون أقل فاعلية.
- يحتاج إلى مدة طويلة للمعاملة؛ ولذلك يعدّ غير عملي في التعقيم.
- يمكن أن يستخدم في ضغط منخفض لتقليل مدة التعريض.

ج. ((MAS) Modified Atmosphere Storage)

- تستخدم الحرارة في تخزين أنواع عديدة من التمور، مثل المجهول، فهو يخزن في درجة حرارة ١٨س-٥؛ ممّا يقلّل من فرصة تشكّل السكر، وانفصال جلد الثمرة عن اللب.
- القليل من البحوث تدرس أثر تعديل الظروف المحيطة في نوعية التمور.
- ثاني أكسيد الكربون يؤجّل تلون التمور باللون البني، وتشكّل السكر على نحو فعال، ويزيد من العمر الافتراضي للتمور.
- تتطلب هذه التقنية بحوثاً ودراسات لكي تعتمد على نطاق تجاري.

## مهارات البحث والاتصال

ابحث في شبكة الإنترنت أو النشرات الزراعية، عن مشروع التخلص التدريجي من غاز بروميد الميثيل من القطاع الزراعي الذي ينفذ بين وزارة البيئة والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، واعرّض ما تتوصل إليه عن طريق برمجية العروض التقديمية، وناقشه مع زملائك.

## التقييم

- ١- أيّ مناطق الأردن مناسبة لزراعة النخيل؟ لماذا؟
- ٢- صف كيفية إجراء عملية خفّ الثمار في النخيل.
- ٣- متى تجرى عملية التلقيح في النخيل؟ ما الهدف منها؟
- ٤- لماذا لا تقطف العناقيد الثمرية في النخيل دفعة واحدة؟

١٥٣

## النتائج الخاصة

– يكثر نباتات النخيل بالفسائل.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التعلم عن طريق النشاط/ التدريب

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (١-٢٠) كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تزيل التربة حول قاعدة النخلة عند موضع اتصال الفسيلة بالأم.
- المجموعة الثانية: تزيل السعف الخارجي، وتقصير السعف الباقي.
- المجموعة الثالثة: تربط السعف بوساطة حبل أو قطعة خيش.
- المجموعة الرابعة: تضع العتلة في موضع الاتصال بينها وبين النبات الأم، وتطرق على العتلة بالمطرقة بأقل عدد ممكن من الطرقات وتحركها في أكثر من موضع.
- المجموعة الخامسة: تضع الفسيلة بعد فصلها في مكان مظلل، وتغطي منطقة الجذور بالخيش، وترش منطقة الجذور يومياً بالماء، وتطلي منطقة الجرح بمادة مطهرة.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.
- يجيب المعلم عن تساؤلات الطلبة في أثناء العمل.
- يعرض المعلم الإجابة الصحيحة.
- تكليف مقرر كل مجموعة إرجاع الأدوات والمواد إلى مكانها.

## تكاثر نباتات النخيل بالفسائل

## النتائج

التمرين  
(١-٢٠)

يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:  
– تكثر نباتات النخيل بالفسائل.

المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

● بستان نخيل. ● عتلة. ● مطرقة.

## الرسوم التوضيحية

## خطوات العمل والنقاط الحاکمة



الشكل (١): إزالة التربة من حول قاعدة النخلة.



الشكل (٢): وضع العتلة في موضع الاتصال بينها وبين النبات الأم.

- ١- إزالة التربة من حول قاعدة النخلة عند موضع اتصال الفسيلة بالأم، كما في الشكل (١).
- ٢- إزالة السعف الخارجي، وتقصير السعف الباقي.
- ٣- ربط السعف بوساطة حبل، أو قطعة خيش.
- ٤- وضع العتلة في موضع الاتصال بينها وبين النبات الأم، كما في الشكل (٢).

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الضروك الفردية

#### علاج

#### إثراء

- تكليف بعض الطلبة تكثير نباتات النخيل بالفسائل، باستخدام ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء.
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٧٩).

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

- كتاب الإنتاج النباتي - المستوى الثاني.

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- طه عبدالله نصر، إكثار أشجار الفاكهة / القواعد العلمية والأساليب العصرية، مكتبة المعارف الحديثة، الإسكندرية، ٢٠٠٣ م.

#### للطالب



الشكل (٣): الطَّرْقُ على العتلة بالمطرقة.



الشكل (٤): الفسيلة بعد الفصل.

- ٥- اطرق على العتلة بالمطرقة بأقل عدد من الطرقات، وحركها في أكثر من موضع، كما في الشكل (٣).
- ٦- ضع الفسيلة بعد الفصل في مكان ظليل، كما في الشكل (٤).
- ٧- غط منطقة الجذور بالخيش.
- ٨- رُبْ منطقة الجذور يوميًا بالماء.
- ٩- اطلب منطقة الجرح بمادة مطهرة.

### أخطاء شائعة

## النتائج الخاصة

- يزرع الفسائل في الأرض الدائمة.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التعلم القائم على الأنشطة/ التعلم التعاوني.

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات

التمرين (١-٢١)، كما يأتي:

● المجموعة الأولى : تغطس الفسائل في محلول ماء ومبيد فطري وحشري بضع ثوان.

● المجموعة الثانية: تجهز حفرة أبعادها (١م × ١م × ٧٠سم).

● المجموعة الثالثة: تخلط السماد العضوي المختمر بالرمل بنسبة (١:١)، وتضع كمية منه في أرضية الحفرة، وترويه بالماء، وتتركها حتى تجف قبل الزراعة، وتقلّم أطراف جذور الفسيلة الكبيرة والمتكسرة والمصابة.

● المجموعة الرابعة: تضع الفسيلة في الجورة على نحو قائم، وتردم حولها خليط السماد البلدي والرمل والتربة، وترص حولها جيدًا بالأقدام لتثبيتها، وتزرع الفسائل بحيث يكون أكبر قطر لها بمحاذاة سطح الأرض، وتغطي سعف الفسيلة بالخيش أو السعف.

● المجموعة الخامسة: تروي الفسائل، وبخاصة خلال الأيام الأولى من زراعتها، وتزيل الخيش من حول الفسيلة عند اعتدال الأحوال الجوية وقد يُبقى حتى يدفعه السعف الجديد.

- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.

- يجيب المعلم عن تساؤلات الطلبة في أثناء العمل.

- يعرض المعلم الإجابة الصحيحة.

- تكليف مقرر كل مجموعة إرجاع الأدوات والمواد إلى مكانها.

يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:

- تزرع فسائل التخليل في الأرض الدائمة

المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

\* بستان نخيل. \* عتلة. \* مطرقة.

الرسوم التوضيحية

خطوات العمل والنقاط الحاكمة



الشكل (١): تغطيس الفسائل في محلول يحتوي على ماء، ومبيد فطري، وحشري.



الشكل (٢): تجهيز حفرة أبعادها ١م × ١م × ٧٠سم.

١- غطس الفسائل في محلول يحتوي على ماء، ومبيد فطري، وحشري، بضع ثوان، كما في الشكل (١).

٢- تجهز حفرة أبعادها ١م × ١م × ٧٠سم، واتركها تتهوى أيامًا عدّة، كما في الشكل (٢).

٣- اخلط السماد العضوي المختمر مع الرمل بنسبة ١ : ١، وضع كمية منه في أرضية الجورة، انظر الشكل (٣).

٤- اربو الحفرة بالماء قبل الزراعة، واتركها حتى تجف.

٥- قلّم أطراف جذور الفسيلة الكبيرة، والمتكسرة، والمصابة.

٦- ضع الفسيلة في الجورة على نحو قائم، واردم حولها خليط السماد البلدي والرمل والتربة، ورضّ التراب حولها جيدًا بالأقدام، لتثبيتها، كما في الشكل (٤).

٧- ازرع الفسائل بحيث يكون أكبر قطر لها بمحاذاة سطح الأرض.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى



### مراعاة الضروك الفردية

#### علاج

#### إثراء

- تكليف الطلبة زراعة الفسائل في الأرض الدائمة باستخدام ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء.
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٨٠).

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسى

- كتاب الإنتاج النباتى - المستوى الأول.

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- Hartman, H., Kester, D., Davies, F. and Genev, R. Plant propagation : principles and practices, 7th edition . 2002.

#### للطالب

٨- غطّ سعف الفسيلة بالحيش أو السعف، كما في الشكل (٥)، والشكل (٦).

٩- اربو الفسائل، وبخاصة خلال الأيام الأولى من الزراعة، واحرص على بقاء التربة رطبة خلال هذه المدة، كما في الشكل (٧).

١٠- أزل الحيش من حول الفسيلة عند اعتدال الأحوال الجوية، أو أبقه حتى يدفعه السعف الجديد، انظر الشكل (٨).

الشكل (٣): خلط السماد العضوي المختمر مع الرمل.



الشكل (٥): تغطية الفسيلة بالسعف.



الشكل (٤): وضع الفسيلة في الجورة على نحو قائم.

١٥٧



الشكل (٧): ربّي الفسائل.



الشكل (٦): تغطية سعف الفسيلة بالحيش.



الشكل (٨): إزالة الحيش من حول الفسيلة.

١٥٨

- يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:
- تصف نباتات النخيل نباتيًا.
  - تميز نباتات النخيل نباتيًا.
  - تحدد طبائع الحمل والإزهار في نخيل البلح.

المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

\* نباتات نخيل البلح.

الرسوم التوضيحية

خطوات العمل والنقاط الحاكمة

تفحص نباتات نخيل البلح، كما في الشكل (١)، ولاحظ ما يأتي:

١- الساق:

- أ - أهو متفرع أم غير متفرع؟
- ب - هل تتكون حوله حلقات؟
- ج - هل تظهر على الساق بقايا أعناق الأوراق المفصولة بترتيب حلزوني؟
- ٢- الأوراق: مركبة وشكلها مروحي.



الشكل (١): شجر نخيل.

١٥٩

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التعلم عن طريق الأنشطة/ التدريب

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (٢٢-١) كما يأتي:

- المجموعة الأولى: تفحص نباتات نخيل البلح، وتلاحظ الساق: هل هي متفرعة أم غير متفرعة؟ هل تتكون حولها حلقات؟ هل تظهر على الساق بقايا أعناق الأوراق المفصولة؟ كيف تترتب بقايا أعناق الأوراق المفصولة على الساق؟
  - المجموعة الثانية: تفحص نباتات نخيل البلح، وتلاحظ الأوراق، من حيث نوعها، وشكلها.
  - المجموعة الثالثة: تفحص نباتات نخيل البلح، وتلاحظ النورات، وتحدد وجود النورات المذكرة والنورات المؤنثة، وتلاحظ أن النبات يحمل نوعًا واحدًا منها، وتبين نوع الأزهار.
  - المجموعة الرابعة: تفحص نباتات نخيل البلح، وتلاحظ أن البراعم الزهرية في الأشجار المذكرة أو المؤنثة تحمل جانبيًا في الأوراق.
  - المجموعة الخامسة: تفحص نباتات نخيل البلح، وتلاحظ الثمار، ستجد أنها متعددة الأشكال والألوان والحجوم، والبذرة كبيرة في معظم الأصناف.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.
- يجيب المعلم عن تساؤلات الطلبة في أثناء العمل.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الضروقات الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف الطلبة رسم الأجزاء النباتية التي تفحصوها وتدوين اسم كل جزء على الرسم.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٨١)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم


#### للمعلم

- George.A.Cquaah.Horticulture Principles and practices.  
Pearson Prentice Hall. 2005

#### للطالب

- حسين العروسي، الأطلس النباتي، مكتبة الإسكندرية، ٢٠٠١ م.
- حسين العروسي، المملكة النباتية، مكتبة الإسكندرية، ١٩٩٩ م.
- حسين محمد العروسي، النبات العام، مكتبة المعارف، ٢٠٠٠ م.
- عبد العزيز البيومي، أساسيات علم النبات، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٢ م.
- محمود محمد جبر وآخرون، أساسيات علم النبات العام: الشكل الظاهري، والتركيب التشريحي، تقسيم المملكة النباتية، وظائف أعضاء النبات، ط ١، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠١ م.

٣- البورات كما في الشكل (٢): حدّد وجود البورات المذكرة والبورات المؤنثة، لعلك تلاحظ أن النبات يحمل نوعًا واحدًا منها، ما نوع الأزهار في النبات الموجود أمامك؟



الشكل (٢): البورات في النخيل.

٤- البراعم الزهرية: في الأشجار المذكرة أو المؤنثة تحمل جانبيًا في آباط الاوراق.  
٥- الثمار، كما في الشكل (٣): متعددة الأشكال والألوان والحجم، والبذرة كبيرة في معظم الأصناف.



١٦٠



الشكل (٣): الثمار في النخيل.

#### التقويم

- ١- لماذا لا تنفّرع ساق النخيل؟
- ٢- ما نوع الجنس في نباتات النخيل؟

١٦١

## النتائج الخاصة

- يصف العنب نباتياً.
- يتعرّف طبائع الإزهار والإثمار في العنب.
- يوضح المقصود بالبراعم الثمرية المركبة.
- يتعرّف الاحتياجات المناخية للعنب.
- يصف التربة الملائمة للعنب.
- يتعرّف طرق تكثير العنب (التكثير البذري، التكثير بالعقل الساقية المتخشبة).

## المفاهيم والمصطلحات

البراعم الثمرية المركبة.

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بتوظيف خبرات الطلبة السابقة وطرح الأسئلة الآتية: ما اسم الجنس الذي يتبع العنب له؟ ما اسم الفصيلة التي يتبع العنب لها؟ ما الاسم العلمي للعنب؟ كم عدد أنواع الأعناب التي يشملها الجنس (Vitis)؟ ما أكثر أنواع العنب انتشاراً في العالم؟ ما أهمية الأعناب الأمريكية؟ مناقشة إجابات الطلبة، وتدوين الصحيح منها على السبورة.

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرّف طبائع الإزهار والإثمار في العنب يعرض المعلم الشكل (١-٥٣)، ثم يقسم الطلاب إلى مجموعات، ويهيئ البيئة الصفية المناسبة للعمل، ويكلفهم ما يأتي:
- المجموعة الأولى: تحدد نوع البراعم الزهرية في العنب وأماكن حمل البراعم الثمرية (العيون).

● المجموعة الثانية: توضح المقصود بالبراعم الثمرية المركبة.

● المجموعة الثالثة: تحدد مواقع البراعم المثمرة في العنب.

● المجموعة الرابعة: تبحث عن إجابة السؤال الآتي: ما أهمية اختلاف مواقع

البراعم الخصبية في القصبية عند التلقيح؟

- يعرض منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.

- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.

- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

## التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة

- التمهيد للحصة: ينفذ المعلم جلسة مناقشة المناخ والتربة الملائمة لنمو العنب وإنتاجه، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما الاحتياجات المناخية الملائمة لنمو العنب وإنتاجه؟ لماذا يفضل العنب الصيف الحار الجاف؟ ما مميزات الأعناب التي تنتج في المناطق

## سابقاً العنب

يتبع العنب الجنس (Vitis)، والفصيلة (Vitaceae)، ويشمل الجنس (Vitis) سبعة أنواع من الأعناب، في مقدمتها العنب الأوروبي، واسمه العلمي (Vitis vinifera)، وهو أهم أنواع العنب من حيث الانتشار عالمياً، ومن حيث عدد أصنافه المعروفة، وتحتل أهمية هذا النوع من العنب إذا عرفنا أن ٩٠٪ من العنب المنتج عالمياً، وبخاصة في أوروبا والشرق الأوسط، يعود إلى أصناف تابعة له. وبالإضافة إلى هذا العنب يوجد بعض أصناف العنب الأمريكية التي انتشرت انتشاراً محدوداً يكاد يقتصر على أمريكا الشمالية، وتعود أهمية الأعناب الأمريكية إلى وجود أنواع مهيمنة عديدة منها، تمتاز بمقاومتها لحشرة الفيلوكسيرا، أو للنيماطودا، أو لكليهما.

## الإزهار والإثمار

تحمل البراعم الثمرية (العيون) في العنب جانبيًا على العقد في نموات (فروع) الموسم السابق، وتفتح في الربيع، فينتج منها نموات خضرية تحمل أوراقاً، وعناقيد زهرية، ومخاليق، كما في الشكل (١-٥٣).



الشكل (١-٥٣): طبيعة الحمل في العنب.

① نوع البراعم الثمرية في العنب: البراعم في العنب براعم مركبة، ويسمى البرعم مركباً، لأنه يتكون غالباً من ٣ براعم، ينمو في العادة البرعم الأوسط، ويبقى البرعمان الجانبيان في حالة توقف، ما لم يتعرض الأوسط إلى أي تلف، وقد تفتح البراعم الثلاثة معاً.

## مفاهيم

البراعم الثمرية المركبة (Compound buds): تعد هذه البراعم مركبة؛ لأن كلًا منها يحتوي عددًا من البراعم، ولكن البرعم الوسطي هو الذي ينمو، ثم ينتج منه غصن، كما في العنب، وهو الذي يحمل الأوراق، والمخاليق، والعناقيد الزهرية.

ذات الصيف البارد نسبيًا؟ ما أثر الرطوبة الجوية المرتفعة والأمطار صيفاً في الأعناب؟ ما كميات الأمطار التي لا بد من توافرها سنوياً في مناطق زراعة الأعناب في الأردن؟ ما نوع التربة التي تنمو أصناف العنب فيها؟ لماذا يفضل عند اختيار موقع زراعة الأعناب تجنب التربة الطينية الثقيلة، والأراضي ذات التهوية المحدودة، وكذلك التي تحتوي نسبة عالية من الملوحة؟ مناقشة إجابات الطلبة، وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرّف طرق التكثير في العنب يقدم المعلم عرضاً توضيحياً لهذه الطرق مستعيناً بالجدول (١-٩)، ثم يقسم الطلاب إلى مجموعات ويهيئ البيئة الصفية المناسبة لعمل، ويكلف الطلبة ما يأتي:

● المجموعة الأولى: تدرس طريقة التكثير البذري للعنب من حيث الأهداف، وتبحث عن أسباب عدم استخدام هذه الطريقة تجارياً في تكثير العنب.

● المجموعة الثانية: تدرس طريقة التكثير بالعقل الساقية المتخشبة من حيث عمرها، وزراعتها، والمسافات بين الخطوط، وعددها وطولها.

- تعرض المجموعات النتائج وتجري مناقشة لاستخلاص الاجابات الصحيحة وتدوينها على السبورة.



## مراعاة الضرووق الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، سوغيرها)، وذلك لتعرّف طبائع الإزهار والإثمار في العنب، ثم عرض النتائج على زملائهم.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٨٢)
- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: قائمة رصد (١-٨٣)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

– كتاب الإنتاج النباتي – المستوى الأول.

### مصادر التعلم

#### للمعلم

– سلام أيوب، الدليل الفني لتطعيم الأشجار المثمرة، المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٦م.

#### للطالب

☺ مواقع البراعم المثمرة في العنب: تختلف مواقع البراعم المثمرة باختلاف الأصناف، كما يأتي:

- تحمل البراعم المثمرة بعيداً عن قاعدة القصبة، كما في صنف العنب الزيني، والعنب النباتي.
- تحمل البراعم المثمرة قريباً من قاعدة القصبة، وتعرف حينئذ بأنها براعم قاعدية خصبة، كما في صنف العنب السلطي، والعجلوني.

فكر ما أهمية اختلاف مواقع البراعم الخصبة في القصبة عند التقليم؟

### المناخ

لإنتاج كميات كبيرة ذات جودة عالية من محصول العنب، لا بدّ من توافر صيف طويل ودافئ، ويفضل الصيف الحار الجاف، لأنّ ذلك يرفع نسبة السكر في العنبات. أمّا المناطق ذات الصيف البارد نسبياً فنتج أعناقاً ترتفع فيها نسبة الحموضة، وتقلّ فيها نسبة السكر، وتؤدي الرطوبة الجوية المرتفعة، والأمطار صيفاً إلى انتشار الأمراض التي تضرّ بالثمار والأجزاء الخضرية. ولأنّ معظم الأعناب في الأردن تعتمد على مياه الأمطار، فإنه لا بدّ من توافر الأمطار في حدود ٤٠٠-٥٠٠ ملم سنوياً في تلك المناطق.

### التربة

تنمو أصناف العنب في أنواع مختلفة من التربة يغلب أن تكون رملية إلى طينية، وعميقة إلى سطحية، ويفضل عند اختيار الموقع تجنب التربة الطينية الثقيلة، والأراضي ذات التهوية المحدودة، وكذلك التي تحتوي نسبة عالية من الملوحة.

### طرق التكثير

يكثر العنب بالطرق الآتية:

- ☺ التكثير اليدوي: تجري هذه الطريقة في محطات البحوث؛ لإنتاج أصناف جديدة بالتهجين؛ ولتحسين النبات، ولا تستخدم لأغراض تجارية.
- ☺ العقل الساقية المتخشبّة: تؤخذ العقل من قصبات عمرها سنة واحدة، وطولها ٢٠-٣٠ سم، على ألا يقل عدد البراعم في كلّ عقلة عن اثنين، وترزع العقل مباشرة في أرض المشتل على خطوط، أو أوعية. وهناك عملية تسمى تكليس العقل قبل زراعتها

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى



## النتائج الخاصة

- يتعرف طرق تكثير العنب (الترقيد، التركيب المنضدي).
- يتعرف مسافات الزراعة المناسبة في بساتين العنب.

## المفاهيم والمصطلحات

الترقيد، تركيب المنضدي

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- التمهيد للدرس وتوزيع الطلبة في مجموعات العمل، وتحديد مهامها كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تدرس تكثير العنب بالترقيد، وتبين المقصود بالترقيد، وتحدد الموعد المناسب لتكثير العنب بالترقيد، وتفسر عدم التوصية باتباع هذه الطريقة في تكثير أصناف العنب المحلية.
- المجموعة الثانية: تدرس تكثير العنب بالتركيب المنضدي، وتحدد سبب التسمية، وتوضح المقصود بالتركيب المنضدي، وتحدد أكثر طرق التركيب المنضدي استعمالاً، مع ذكر السبب.
- المجموعة الثالثة: تزور إحدى محطات وزارة الزراعة، بهدف التعرف ما يأتي:
  - طرق تكثير العنب المختلفة، وكيفية إجراء التركيب المنضدي، الأصول المستخدمة في التكاثر، المنشآت المستخدمة في عملية التكاثر، ثم تعرض ما تتوصل إليه وتناقشه بإشراف المعلم.
- المجموعة الرابعة: تدرس الجدول (١-٩)، ثم تجيب عن الأسئلة الآتية: حدد الأصول التي ينصح باستخدامها عند زراعة أشغال العنب في الأراضي الجافة (المطرية). حدد الأصول التي يجب استخدامها عند زراعة أشغال العنب في الأراضي المروية. استشارك مزارع يرغب في زراعة بستان عنب في أراضيه التي تحتوي نسبة كلس مرتفعة، فماذا تشير عليه لحل هذه المشكلة؟
- استشارك مزارع يرغب في زراعة بستان عنب في أراضيه المصابة بالنيماتود، فماذا تشير عليه؟ حدد الأصول المقاومة للنيماتود، والأصول الحساسة له، والأصول المقاومة للفيلوكسرا، والأصول الحساسة للفيلوكسرا.
- يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

في أرض المشتل أو الأوعية، إذ توضع العقل في طبقات متبادلة مع الرمل، أو نشارة الخشب، مما يرفع من نسبة نجاح العقل في مرحلة التجذير. وفي حالة الأصناف التي يصعب تجذيرها يمكن تجريح قواعد العقل بالسكين، ومعالمتها بحمض الأندول بيوتريك (IBA)، ولا يوصى باتباع هذه الطريقة في تكثير أصناف العنب المحلية مع أن تطبيقها سهل، ونجاحها مؤكد؛ لأن غراس العنب الناجمة غير مطعومة على أصول العنب الأمريكية المقاومة لحشرة الفيلوكسرا، ولذلك تستخدم هذه الطريقة عند تكثير أصول العنب بالعقل الساقية؛ تمهيداً لتطعيمها بإحدى طرق التطعيم المعروفة.

➤ الترقيد: تجرى عملية الترقيد في نهاية فصل الشتاء، ولا يوصى باتباع هذه الطريقة في تكثير أصناف العنب المحلية؛ لتعرض المجموع الجذري للإصابة بحشرة الفيلوكسرا.

➤ التركيب المنضدي: أكثر طرق التطعيم استعمالاً هي طريقة التطعيم اللساني على المنضدة، وسمي بذلك لإمكانية إجرائه فوق منضدة في فصل الشتاء، إذ تجزأ الأصول (العقل) المراد تطعيمها، التي يبلغ طولها ٢٠-٣٠ سم، والمطاعم التي يتراوح طولها بين ١٠-٥ سم من أصناف العنب المحلية، ثم يُرشق الطعم بالأصل باستخدام التركيب اللساني. وبعد إجراء عملية التركيب اللساني توضع العقل المطعومة في طبقات متبادلة مع نشارة الخشب الرطبة، ومسحوق الفحم في صناديق خشبية، وبعد مدة يلتحم الأصل بالطعم، ويُجذَر الأصل في آن واحد، ثم توضع الصناديق بعد ملئها في غرف مدفأة تتراوح درجة حرارتها بين (٢٠-٢٨ س) مدة شهر؛ لضمان نجاح عملية الترضيد.

## زيارة ميدانية

زر إحدى محطات وزارة الزراعة، لمعرفة ما يأتي:

- ١- طرق تكثير العنب المختلفة.
  - ٢- كيفية إجراء التركيب المنضدي.
  - ٣- الأصول المستخدمة في التكاثر.
  - ٤- المنشآت المستخدمة في عملية التكاثر.
- ثم اعرض ما تتوصل إليه، وناقشه مع زملائك

١٦٤

## التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بتنفيذ المعلم جلسة لمناقشة مسافات الزراعة المناسبة في بساتين العنب مستعيناً بالجدول (١-١٠)، ثم يطرح الأسئلة الآتية: ما العامل الرئيس الذي يعتمد عليه عند اختيار مسافات الزراعة المناسبة في العنب؟ ما العوامل التي يعتمد عليها اختيار مسافات الزراعة المناسبة في العنب؟ كيف تؤثر طبيعة نمو الأصل والصنف المطعم عليه، وعمق التربة، وخصوبتها، وتوافر مياه الري، عند اختيار مسافات الزراعة المناسبة في العنب؟ كيف تؤثر طرق تربية العنب الآتية (رأسية، قصيبة أو كردونية، معرشات، أو دعامات على حرف (T)، زاحفة) في تحديد مسافات الزراعة؟ مناقشة إجابة الطلبة وتدوين الصحيح منها على السبورة.

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

- تكليف الطلبة، تصميم عرض تقديمي من عشر شرائح عن طرق تكثير العنب الموجودة في الأردن باستخدام برمجية العروض التقديمية.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٨٤)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

- خليل جرن، دليل المرشد الزراعي في تربية وتقليم الأشجار المثمرة، مديرية الإرشاد الزراعي، عمان، ٢٠٠٧م.

### للطالب

يبين الجدول (٩-١) الأصول المقاومة لكل من الفيلوكسرا والنيماٹودا.  
الجدول (٩-١): الأصول المقاومة لكل من الفيلوكسرا والنيماٹودا.

الرقم	الأصل	المقاومة للفيلوكسرا	المقاومة والنيماٹودا	ملاحظات
١	سانت جورج St George	++	x	يتحمل الجفاف، ولذلك يصلح للزراعة في الأراضي الجافة
٢	جانزين Ganzin	++	x	حساس للنيماٹودا، ويصلح للأراضي المروية والعميقة الخالية من النيماٹودا
٣	٩٩-ر 99-R	++	x	حساس للنيماٹودا، ويتحمل الجفاف، ونسبة الكلس المرتفعة في التربة
٤	تلكياي ٥ Teleki 5A	++	x	يتحمل نسبة كلس مرتفعة في التربة
٥	١٦١٣ 1613	+	++	
٦	دوج ريج Dog ridge	+	++	قوي النمو، ويصلح للأراضي الحفيفة وقليلة الخصوبة
٧	سولت كريك Salt Creek	+	++	قوي النمو، ويصلح للأراضي الرملية الحفيفة
٨	هارموني Harmony	+	++	
٩	ب-١١٠٣ P 1103	++	++	يتحمل نسبة الكلس المرتفعة في التربة
١٠	ب-٤١ B 41	++	++	يتحمل نسبة الكلس المرتفعة في التربة

++ مقاومة عالية + مقاومة متوسطة x عدم وجود مقاومة

### نشاط (١٠-١)

- ادرس الجدول (٩-١)، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:
- ١- حدّد الأصول التي ينصح باستخدامها عند زراعة أشغال العنب في الأراضي الجافة (المطرية).
  - ٢- حدّد الأصول التي يجب استخدامها عند زراعة أشغال العنب في الأراضي المروية.
  - ٣- استشارك مزارع يرغب في زراعة أراضيها التي تحتوي نسبة كلس مرتفعة بالعنب، فبمّ تشير عليه لحل هذه المشكلة؟
  - ٤- استشارك مزارع يرغب في زراعة أراضيها المصابة بالنيماٹودا بالعنب، فبمّ تشير عليه لحل هذه المشكلة؟
  - ٥- حدّد الأصول المقاومة للنيماٹودا، والأصول المقاومة للفيلوكسرا، والأصول الحساسة لهما.

١٦٥

## مسافات الزراعة

يعتمد اختيار مسافات الزراعة المناسبة في العنب بالدرجة الأولى على طريقة التربية، ولكن هناك عوامل أخرى، مثل طبيعة نمو الأصل، والصف المفضل عليه، وعمق التربة، وخصوبتها، وتوافر مياه الري. وفي ما يأتي مسافات الزراعة التي يمكن اتباعها في بساتين العنب، حسب طريقة التربية.

الجدول (١٠-١): مسافات الزراعة التي يمكن اتباعها في بساتين العنب حسب طريقة التربية.

مسافات الزراعة	طريقة التربية
٢-١ م x ٣-٢,٥ م	رأسية
١,٥ م x ٢-٣ م	قصية أو كردونية
٢,٥ م x ٣-٤ م	معرشات أو دعامات على حرف T
٢-٣ م x ٣-٤ م	زاحفة

## عمليات الخدمة

- تشمل عمليات خدمة بساتين العنب عدداً من العمليات البستانية، أهمها:
- ١- الحرق والعزق: تحرق الأرض في مناطق زراعة العنب المطرية مرتين: الأولى تبدأ مع نهاية فصل الخريف؛ لتهيئة الأرض لاستقبال مياه الأمطار، والثانية تبدأ مع نهاية فصل الشتاء؛ للتخلص من الأعشاب الشتوية، أما الأعشاب الربيعية والصفيفية فيُتخلص منها باستخدام المبيدات العشبية، وتُعزق الأعشاب النامية حول الأعناب عزقاً يدوياً باستخدام أدوات العزق المعروفة.

## مهارات البحث والاتصال

ابحث في شبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية، عن أنواع لأعشاب العريضة الأوراق، والأعشاب الرفيعة الأوراق المعمرة الحولية... التي توجد في بساتين العنب، وبيّن طرق مكافحتها، واعرض ما تتوصل إليه عن طريق برمجية العروض التقديمية، وناقشه مع زملائك.

١٦٦

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يصف عمليات الخدمة الآتية: (الحرق والعزق، والتسميد، والري، والتقليم الإثماري) في بساتين العنب.
- يصف عمليتي الحرق والعزق في بساتين العنب.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرف عمليات الخدمة اللازمة لبساتين العنب، يقدم المعلم عرضاً توضيحياً يتضمن أهم هذه العمليات مستعيناً بالأشكال (١-٥٤) و(١-٥٥) و(١-٥٦)، ثم يقسم الطلبة إلى خمس مجموعات، ويكلف أعضاء كل مجموعة ما يأتي:

- المجموعة الأولى: تدرس عملية التسميد لبساتين العنب في الأراضي المطرية من حيث الموعد المناسب لإضافة الأسمدة العضوية والأسمدة النيتروجينية، ومعدل كميات الأسمدة العضوية والأسمدة النيتروجينية التي يجب إضافتها، وتجب عن السؤال الآتي: ما العلاقة بين عدم استجابة بساتين العنب المباشرة لإضافة الأسمدة النيتروجينية وتقليمه السنوي على نحوٍ شديد؟
- المجموعة الثانية: تدرس عملية تسميد بساتين العنب في الأراضي المروية من حيث الموعد المناسب لإضافة الأسمدة النيتروجينية، وعدد دفعات إضافة الأسمدة النيتروجينية، ومعدل كميات الأسمدة النيتروجينية التي يجب إضافتها، وأعراض نقص العناصر الغذائية في بساتين العنب.
- المجموعة الثالثة: تدرس عملية ريّ بساتين العنب من حيث معدل كميات مياه الريّ (م/٣) (دوم) في المناطق المروية من الأردن خلال موسم النمو، وأهمية استخدام أصول العنب التي تتحمل الجفاف في المناطق المرتفعة من الأردن التي تعتمد على مياه الأمطار، وعملية التقليم الإثماري في الغراس المرباة حسب الطريقة الرأسية مستعينة بالشكل (١-٥٤)، وتحديد عمر الغراس التي يُجرى لها التقليم الإثماري، ثم تلخص خطوات عملية التقليم الإثماري للغراس المرباة تربية قصبية بالشكل (١-٥٥)، وتلخص خطوات عملية التقليم الإثماري للغراس المرباة تربية رأسية، وتدرس عملية التقليم الإثماري في الغراس المرباة تربية قصبية بالشكل (١-٥٥)، وتلخص خطوات عملية التقليم الإثماري في الغراس المرباة تربية طريقة الكردون المزدوج مستعينة بالشكل (١-٥٦)، وتلخص خطوات عملية التقليم الإثماري للغراس

ملحق أدوات التقويم (١-٨٥).

## الملاحق

## التسميد

١. الأراضي المطرية: تضاف الأسمدة العضوية إلى الأراضي المطرية بمعدل ٢-٣ طن /دوم، وتخلط بالتربة عند إجراء الحرثة الأولى. أما الأسمدة النيتروجينية فتضاف عادة مع نهاية فصل الخريف، أو بداية فصل الربيع بمعدل ٥٠ كغ/دوم من سماد سلفات الأمونيوم، أو ٣٠ كغ/دوم من سماد ترات البوتاسيوم. وقد تضاف الأسمدة النيتروجينية بمعدل ٢٥ غم من سلفات الأمونيوم لكل شجرة إلى الأراضي المتوسطة الخصوبة، أو بمعدل ٣٥ غم/شجرة من سلفات الأمونيوم إلى الأراضي الفقيرة، وتُعزى عدم الاستجابة السريعة للأسمدة النيتروجينية المضافة إلى بساتين العنب جزئياً إلى شدة التقليم السنوي المتبع في العنب.
٢. الأراضي المروية: تضاف الأسمدة النيتروجينية بمعدل ٥٠ كغ/دوم (من سماد سلفات الأمونيوم، أو ٣٠ كغ/دوم من سماد ترات البوتاسيوم) على ثلاث دفعات كما يأتي:

- أ. الدفعة الأولى مع نهاية فصل الشتاء.
- ب. الدفعة الثانية في منتصف فصل الربيع.
- ج. الدفعة الثالثة في أوائل فصل الصيف.

العناصر الغذائية وأعراض نقصها في بساتين العنب:

١. عنصر البوتاسيوم: تظهر أعراض نقص البوتاسيوم على صورة بقع سوداء في نصل الورقة مع اصفرار أنسجتها وموتها.
٢. عنصر الحارصين (الزنك): تعرف أعراض نقص الحارصين في العنب باسم الورقة الصغيرة، نظراً إلى صغر حجم الأوراق، ويعالج نقص الحارصين برش الأعناب بأحد الأسمدة الورقية المحتوية على ذلك العنصر.

الريّ: تروى بساتين العنب المزروعة في المناطق المروية من الأردن في بعض المناطق المرتفعة والشرقية والأغوار، وتتراوح كميات مياه الريّ خلال موسم النمو بين ٤٠٠-٥٠٠ م/دوم. أما في المناطق المرتفعة التي تعتمد على مياه الأمطار فقط، فيكتفى بما يسقط من مياه الأمطار، وهنا تظهر أهمية استخدام أصول العنب التي تتحمل الجفاف، مثل: سانت جورج (St. George)، وأصل (R-٩٩).

١٦٧

## المرباة حسب طريقة الكردون المزدوج.

- المجموعة الرابعة: تزور إحدى مزارع العنب التي تربي فيها أشجار العنب تربية كردونية، وتعدّ تقريراً عن كيفية إجرائها، ومزايا هذه الطريقة وعيوبها، ثم تعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية وتناقشه مع الطلاب.
- يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها)، عن عمليات الخدمة في بساتين العنب، ثم عرض ما تتوصل إليه على زملائهم.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: سجل وصف سير التعلم (١-٨٥).

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

### للمعلم

– عواد حسين، ماجدة بهجت، الخصائص العامة للحاصلات البستانية بعد الحصاد وعلاقتها بالتكنولوجيات المستخدمة في التداول بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية ستامفورد آنكتكت – الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٧م.

### للطالب

٢٠ **التقليم الإثماري:** طوّر الإنسان منذ القدم طرائق عديدة لتربية غراس العنب، وفي ما يأتي أهم هذه الطرائق:

التربية الرأسية، والتربية القصبية، والتربية الكرديونية، وهنالك أنواع عدّة من التربية الكرديونية، منها: الكرديون الأحادي، والكرديون المزدوج، والكرديون المتعدد الطبقات. ١. تقليم الإثمار في الغراس المرثاة حسب الطريقة الرأسية، كما في الشكل (١-٥٤): تبدأ هذه المرحلة عندما تبلغ الغراس (٣-٤) سنوات من العمر، وتتلخص عملية التقليم في الخطوات الآتية:

- اختيار قصبية، أو قصبيتين مناسبتين من حيث الموقع، وقوة النمو على كل ذراع رئيس، وتقصير كل منهما إلى (٢-٤) عيون. ويجب أن تكون هذه القصبيات قريبة-ما أمكن- من رأس الغرسة؛ لتجنب وصول ما ستحملة من عنقايد ثمرية إلى الأرض.
- اختيار قصبية واحدة على الأقل على كل من الأذرع الرئيسة، وتقصيرها بإبقاء عين واحدة؛ بهدف استخدام الفرع الذي ينتج من هذه العين لأغراض إنتاجية، أو لتعويض الأذرع الرئيسة إذا ما تعرضت الأخيرة للتلف.
- إزالة الفروع غير المرغوب فيها، سواء أكانت من الأصل، أو من الساق، دون مستوى رأس الغرسة.



الشكل (١-٥٤): تقليم الإثمار في الغراس المرثاة حسب الطريقة الرأسية.

١٦٨

٢. تقليم الإثمار في الغراس المرثاة تربية قصبية، كما في الشكل (١-٥٥): يتلخص

تقليم الإثمار في الغراس المرثاة تربية قصبية في الخطوات الآتية:

- اختيار القصبيتين الإثماريتين للموسم القادم، وتقصير كل منهما، بإبقاء (٨-١٢) برعمًا حسب قوة نموها، وربطها إلى سلك.
- تقصير بعض القصبيات إلى برعم لتصبح دائرة تجديدية للموسم القادم، ويفضل أن تكون هذه القصبيات قريبة إلى رأس الغرسة.
- إزالة الفروع غير المرغوب فيها جميعها أينما وجدت.



الشكل (١-٥٥): تقليم الإثمار في الغراس المرثاة تربية قصبية.

٣. تقليم الإثمار في الغراس المرثاة تربية حسب طريقة الكرديون المزدوج، كما

في الشكل (١-٥٦): يتلخص تقليم الإثمار في الغراس المرثاة حسب طريقة الكرديون المزدوج في الخطوات الآتية:

- إزالة الفروع غير المرغوب فيها جميعها عن ساق الغرسة، أو تلك التي تنمو من الأصل في أثناء موسم النمو.
- إزالة القصبيات المتجهة إلى الأسفل.
- تقليم القصبيات الجانبية بإبقاء (٣-٤) عيون، حسب الصنف، وقوة نمو كل منها؛ لتصبح دوائر ثمرية.
- التأكد من ربط الكرديون الرئيس.
- تقصير بعض القصبيات الموجودة على الأذرع الثانوية إلى عين واحدة؛ لتعطي قصبية جديدة تحمل محصول السنة التالية.

١٦٩





الشكل (١-٥٦): تقليم الإثمار في العراس المرئاة حسب طريقة الكردون المزدوج.

## زيارة ميدانية

زر إحدى مزارع العنب التي تربي فيها أشجار العنب تربية كرونية، وأعد تقريراً عن كيفية إجرائها، ومزايا هذه الطريقة وعيوبها، واعرض ما تتوصل إليه، وناقشه مع زملائك.

١. الآفات: تصاب أشجار العنب بآفات عديدة، أهمها: عفن الثمار الأسود أو الرمادي، والبياض الزغبي، والبياض الدقيقي، والتدرن البكتيري، وموت القصب، وعتة ثمار العنب، وخنفساء ذبابة العنب، ودودة جذور العنب، ودودة ورق العنب، وبقّ العنب الدقيقي، وحلم العنب، والفيلوكسرا.

٢. الأصناف: كما في الشكل (١-٥٧): تنتمي أصناف العنب الشائعة محلياً جميعها إلى مجموعة الأصناف الأوروبية، وهذه الأصناف تحتوي على بذور داخل الثمرة، وفي ما يأتي وصف لأهم هذه الأصناف:

١. سلطي خضاري: يعدّ من أكثر أصناف العنب انتشاراً في الأردن، غراسه قوية النمو، غزيرة الإنتاج، وثماره كبيرة خضراء ومتراصة، مصفرة اللون، والعنقود متوسط إلى كبير الحجم، ينضج في تموز-أيلول، وتقليم هذا الصنف دوائر قصيرة من (٢-٤) عيون، وهو قليل الحساسية لمرض البياض الدقيقي.
٢. دراويشي: غراسه قوية النمو، وإنتاجها منتظم، والثمرة كبيرة تكاد تكون أسطوانية الشكل، سوداء اللون، والعنقود كبير الحجم، وساقه قصيرة جداً،

١٧٠



سلطي خضاري.



تومسون سيدلس (بناتي).



الزيني.



الخلواني.

١٧٢

لمرض البياض الدقيقي.

- المجموعة الرابعة: تبحث في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، أو النشرات الزراعية عن أصناف العنب العالمية العديمة البذور وصفاتها، وتعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية، وتناقشه مع الطلاب.

## النتائج الخاصة

- يتعرّف أكثر الآفات شيوعاً في بساتين العنب.
- يتعرّف أهم أصناف العنب الموجودة في الأردن.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للحصة: ينفذ المعلم جلسة لمناقشة أبرز الآفات شيوعاً في بساتين العنب، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما أكثر الأمراض شيوعاً في بساتين العنب؟ ما أكثر الحشرات التي تهاجم بساتين العنب؟ مناقشة إجابة الطلبة، وتدوين الصحيح منها على السبورة.

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرّف أصناف العنب الشائعة محلياً، يعرض المعلم الشكل (١-٥٧)، ثم يكلف الطلبة ضمن المجموعات ما يأتي:

- المجموعة الأولى: تدرس صنف سلطي خضاري من حيث قوة نمو الغرسة، وإنتاجها، وحجم الثمرة، ولونها، ومواصفات العنقود (الحجم، وتراص الثمار)، ومواعيد النضج، وكيفية تقليم الدواير، والحساسية لمرض البياض الدقيقي.
- المجموعة الثانية: تدرس صنف دراويشي من حيث قوة نمو الغرسة، وإنتاجها، وحجم الثمرة، وشكلها، ولونها، ومواصفات العنقود/ الحجم، وتراص الثمار)، ومواعيد النضج، وكيفية تقليم الدواير، والحساسية لمرض البياض الدقيقي. وتدرس صنف زيني من حيث قوة نمو الغرسة، وإنتاجها، وحجم الثمرة، وشكلها، ولونها، ومواصفات العنقود (الحجم، وتراص الثمار)، ومواعيد النضج، وكيفية تقليم الدواير، والحساسية لمرض البياض الدقيقي.
- المجموعة الثالثة: تدرس صنف خلواني من حيث قوة نمو الغرسة، وإنتاجها، وحجم الثمرة، وشكلها، ولونها، ومواصفات العنقود/ الحجم، وتراص الثمار)، ومواعيد النضج، وكيفية تقليم الدواير، والحساسية لمرض البياض الدقيقي، وتكلف دراسة صنف بلوطي من حيث قوة نمو الغرسة، وإنتاجها، وحجم الثمرة، وشكلها، ولونها، ومواصفات العنقود (الحجم، وتراص الثمار)، ومواعيد النضج، وكيفية تقليم الدواير، والحساسية

## الملاحق

ملحق أدوات التقويم (١-٨٦).



### مراعاة الضرووق الفردية

#### علاج

#### إثراء

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: قلم وورقة
- أداة التقويم: اختبار (١ - ٨٦)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- ملك أبو زينة وآخرون، دليل المواصفات القياسية الأردنية للفاكهة الطازجة، وزارة الزراعة، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.
- محمد البدور، مسنات الحيايري، تقدير خسائر فاقد ما بعد الحصاد لبعض محاصيل الخضار والفواكه، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.
- رابندارات طاغور، بديع حقي (مترجم)، جني الثمار، دار العلم للملايين، بيروت، ٢٠٠٠م.

#### للطلاب

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

وتتضح ثماره في منتصف تموز، ويمتد إلى أواخر آب، وتقليمه دوائر قصيرة، وذلك بإبقاء (٢-٤) عيون، وهو قليل الحساسية لمرض البياض الدقيقي.

٣. زيني: الغرسة قوية النمو، وإنتاجها متوسط وغير منتظم، والثمرة كبيرة، أسطوانية الشكل، مدببة - إلى حد ما - باتجاه القمة، خضراء - ذهبية اللون، والعنقود متوسط إلى كبير الحجم، وثماره مترابطة، وينضج خلال تموز، ويمتد إلى أواخر أيلول، وتقليمه دوائر متوسطة، وذلك بإبقاء (٤-٦) عيون، وهو حساس جداً لمرض البياض الدقيقي.

٤. حلواني: الغرسة متوسطة النمو، والثمرة كبيرة، كروية الشكل، حمراء اللون، والعنقود مفكك، ينضج خلال آب، ويمتد إلى تشرين الأول، وتقليمه دوائر متوسطة، أي بإبقاء (٣-٦) عيون.

٥. بلوطي: الغرسة قوية النمو، غزيرة الإنتاج، والثمرة متوسطة إلى كبيرة، أسطوانية الشكل، سوداء اللون، والعنقود متوسط الحجم، وثماره غير مترابطة، ينضج من آب - أيلول، وتقليمه دوائر قصيرة، بإبقاء (٢-٤) عيون، وينصح به لأغراض الزراعة في الحدائق المنزلية.

٦. الأصناف العالمية العديمة البذور: تشمل كلاً من الأصناف الآتية: بيرليت، وسوبريور سيدلس، وتوميسون سيدلس، وفليم سيدلس، ورميلي سيدلس، ودي لايت، وسيتورن.

٧. الأصناف العالمية البذرية: إمبرور، وأوليفت بلانش، وجولدن موسكات، ويتس، وموسكات الإسكندرية.

٨. أهم الأصناف الشائعة لاستعمال الزبيب: البناتي، وبلاك كورنيت، وفيسنا، وموسكات الإسكندرية.

#### قصية للبحث

يتوافر في الأردن العديد من أصناف العنب المحلية والعالمية، ابحث في شبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية عن هذه الأصناف وصفاتها، واعرض ما توصل إليه، وناقشه مع زملائك.

١٧١



دراويشي.



البلوطي.



دابوقي.



فحصي.



بيرلت.



شامي.

١٧٣


● المجموعة الخامسة: تبحث في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، أو النشرات الزراعية عن أصناف العنب العالمية البذرية وصفاتها، وأهم أصناف

الزبيب الشائعة الاستعمال، وصفاتها وتعرض ما توصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية وناقشه مع الطلاب.

- يقدم منسق كل مجموعة ما توصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.

- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.

- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح موحد لدى الطلبة جميعهم.



موسكات الإسكندرية

الشكل (١-٥): أصناف العنب الشائعة عملياً .

٣. **النضج والجني:** تحتاج أصناف عنب المائدة كي تنضج ثمارها إلى مدة تتراوح بين

١٢٠-٢٠٠ يوم من بدء تفتح الأزهار إلى حين قطفها، وفي ما يأتي علامات

النضج:

١. ارتفاع نسبة السكر في الثمار، وانخفاض نسبة الأحماض.
٢. تغير لون الثمار: الأصناف البيضاء يتغير لونها تدريجياً من الأخضر إلى الأصفر، أما الأصناف الحمراء فإن لونها يتغير من الأخضر إلى الأحمر أو الأسود.
٣. تغير لون الساق التي تحمل العنقود (العنق) من الأخضر إلى البني.
٤. انخفاض درجة صلابة الثمار.

أ. جني المحصول: تجمع العناقيد باحتراس بواسطة مقصات خاصة، بعد التأكد من نضجها ومناسبتها للاستعمال (استهلاك مباشر، أو تخزين)، ويوضع العنقود بعد قطفه في سلة ذات يد يحملها العامل، وتتسع لـ ٨-١٠ كغ. وعند امتلاء السلة تنقل العناقيد بحرص إلى صناديق كبيرة، سعتها تتراوح بين ٤٥-٥٠ كغ، وتنقل بواسطة عربات النقل. ولما كانت عناقيد العنب لا تنضج جميعها في موعد واحد، فإنه يفضل جني المحصول على دفعتين، أو ثلاث دفعات، أسابيع عدّة. وتتبع عادةً طريقة الحصاد الميكانيكي للعنب المعدّ للتصدير، بمعدل ٥ طن/ساعة.

ب. الجمع والتعبئة: قد تجمع الثمار وتعبأ في البستان مباشرة، وذلك بواسطة

١٧٤

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### النتائج الخاصة

- يصف عمليتي نضج ثمار العنب وجنيها.

### المفاهيم والمصطلحات

الترقيد، التركيب المنضدي

### السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

### التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- تعرّف عمليتي نضج ثمار العنب وجنيها يعرض المعلم فيلماً لتوضيح عمليتي

نضج ثمار العنب وجنيها، ثم يكلف الطلبة ضمن المجموعات ما يأتي:

- المجموعة الأولى: تدرس علامات نضج ثمار العنب، وعملية جني المحصول.
  - المجموعة الثانية: تدرس مراحل تداول الثمار التي تشمل الفرز والتدريج والتعبئة، وغيرها)، وأنواع صناديق التعبئة المستخدمة وحجومها.
  - المجموعة الثالثة: تدرس عمليات التبريد المسبق لعناقيد العنب، وتبخيرها بثاني أكسيد الكبريت.
  - المجموعة الرابعة: تدرس طرق تخزين عنب المائدة بالتبريد.
  - المجموعة الخامسة: تبحث في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، أو النشرات الزراعية عن المواصفات القياسية الأردنية لثمار العنب، والمواصفات الأوروبية لثمار العنب، وتعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية وناقشه مع الطلاب.
- يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح موحد لدى الطلبة جميعهم.

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

- تكليف بعض الطلبة تكثير عدد من أصناف العنب بطريقة الترقيد الهرمي، باستخدام ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.

مجموعات من العمال، في كل منها عاملان، أحدهما يقوم بالقطاف، والآخر ينظف العناقيد من الحبات الخضراء، والمهشمة، والجافة وغيرها، ثم توضع العناقيد مباشرة في الصناديق، بحيث تكون أعناقها إلى الأعلى. وتنجز هذه العملية على منضدة صغيرة متنقلة، وبعد الانتهاء من تعبئة العناقيد تُرسل مباشرة إلى السوق، من أجل الاستهلاك المحلي، أو تبرد إذا كانت معدة للتصدير. أما الطريقة الأكثر اتباعًا فهي الجمع في صناديق تتراوح سعتها بين ١٢-١٤ كغ، وبعد امتلائها تفرغ في صناديق، سعة كل منها ٢٥ كغ، بحيث تكون الأعناق إلى الأعلى، ثم تنقل مباشرة إلى بيوت التعبئة؛ كي يبدأ العمال بتنظيفها وتعبئتها في صناديق.

ج. التبريد المسبق لعناقيد العنب: يُجرى التبريد عند نقل الثمار إلى مسافات بعيدة، بهدف تثبيط التنفس، وتأخير نمو الفطريات، ولمنع جفاف هيكل العنقود، وتشقق الثمار.

د. تبخير العنب بثاني أكسيد الكبريت: تُجرى عملية التبخير بوساطة ثاني أكسيد الكبريت لصناديق العنب المخصصة للشحن إلى مسافات بعيدة، أو تلك المخصصة للتخزين؛ بهدف القضاء على الفطريات المسببة لتعفن الثمار.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: الملاحظة
- أداة التقويم: السجل القصصي (١-٨٧).

١٧٥

#### التقويم

- ١- ارسم برعم عنب مركبًا، غير مفتوح، مبيّنًا أسماء الأجزاء على الرسم.
- ٢- بين كيف تؤثر الحرارة والرطوبة الجوية في محصول العنب.
- ٣- ناقش العوامل التي تعتمد عليها مسافات الزراعة في غراس العنب.
- ٤- عدّد ثلاثة أمراض، وثلاث حشرات ضارة تصيب العنب.
- ٥- علّل: لا ينصح باستعمال طريقة الترقيد أو العقل في تكثير أصناف العنب المحلية.

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

#### مصادر التعلّم

#### للمعلم

- حسين العروسي، المملكة النباتية، مكتبة الإسكندرية، ١٩٩٩ م.
- حسين محمد العروسي، النبات العام، مكتبة المعارف، ٢٠٠٠ م
- محمود محمد جبر وآخرون، أساسيات علم النبات العام: الشكل الظاهري، والتركيب التشريحي، تقسيم المملكة النباتية، وظائف أعضاء النبات، ط ١، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠١ م.

١٧٦

#### للطالب

- حسين العروسي، الأطلس النباتي، مكتبة الإسكندرية، ٢٠٠١ م

تمرين (٢٣-١): تكثير نباتات العنب بالترقيد البسيط  
تمرين (٢٤-١): تقليم شجيرات العنب تقليماً إثمارياً

## النتائج الخاصة

- تختار الفروع المناسبة للتكثير بالترقيد البسيط.
- تجري عملية الترقيد البسيط.
- تحدد الموعد المناسب لتقليم شجيرات العنب تقليماً إثمارياً.
- تحدد طبيعة الحمل في صنف العنب المراد تقليمه.
- تقلم شجيرات العنب تقليماً إثمارياً.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التعلم عن طريق النشاط/التدريب

- تقسيم الطلاب إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (٢٣-١) كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تختار النباتات والفروع المناسبة للتكثير بالترقيد البسيط.
- المجموعة الثانية: تجري عملية الترقيد البسيط.
- المجموعة الثالثة: تفصل النباتات الجديدة عن الأمهات وتزرعها.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.
- يجيب المعلم عن تساؤلات الطلبة في أثناء العمل.
- يعرض المعلم الإجابة الصحيحة.
- تكليف مقرر كل مجموعة، إرجاع الأدوات والمواد إلى مكانها.

التعلم عن طريق النشاط/التدريب

- تقسيم الطلاب إلى مجموعات وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (٢٤-١) كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تحدد الموعد المناسب لتقليم شجيرات العنب تقليماً إثمارياً.
- المجموعة الثانية: تحدد طبيعة الحمل في صنف العنب المراد تقليمه.
- المجموعة الثالثة: تقلم شجيرات العنب تقليماً إثمارياً.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.
- يجيب المعلم عن تساؤلات الطلبة في أثناء العمل.

تكثير نباتات العنب بالترقيد البسيط

النتائج

التمرين  
(٢٣-١)

- يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:
- تختار النباتات والفروع المناسبة للتكثير بالترقيد البسيط.
- تجري عملية الترقيد البسيط.
- تفصل النباتات الجديدة عن الأمهات وتزرعها.

المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

● نباتات عنب. ● مشبك معدني على شكل (٨). ● برفة. ● سكين مقص تقليم.

الرسوم التوضيحية

خطوات العمل والنقاط الحاسمة



(١)



(٢)



(٣)

الشكل (١): خطوات إجراء الترقيد البسيط.

١٧٧

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف مجموعة من الطلبة ما يأتي:

- ترقيد نباتات عنب محددة، باستخدام ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.
- تقلم شجيرات العنب تقليماً إثمارياً، باستخدام ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٨٨)
- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٨٩)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

للمعلم

للطالب

- ١- ما الوقت المناسب لإجراء عملية الترقيد البسيط؟
- ٢- يفضل جرح الجزء المرقد، أو إزالة حلقة عرضها (٣مم) من القلف قبل تثبيته في الحفرة، علل ذلك.
- ٣- ما دلالات نجاح الترقيد البسيط؟

### التقويم الإثماري لشجيرات العنب

التراجمات	التمرين (١-٢٤)
يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادراً على أن:	
– تحدد الموعد المناسب للتقليم الإثماري لشجيرات العنب.	
– تقلم شجيرات العنب تقليماً إثمارياً.	
المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات	
• مقصات تقليم. • منشار تقليم. • سلم مزدوج (سبية). • عجيبة تقليم (ماسك). • شجيرات عنب.	
خطوات العمل والنقاط الحاكمة	الرسوم التوضيحية
١- حدد طبيعة الحمل في الصنف المراد تقليمه.	
٢- قصّر القصبات إلى دوائر ثمرية قصيرة، يحتوي كل منها على (٤-٥) براعم (عيون) في الأصناف التي تكون براعمها القاعدية في القصبية خصبة (مثمرة)، أما في الأصناف التي تكون براعمها القاعدية غير خصبة، فإن القصبات تقصّر إلى دوائر ثمرية طويلة، يحتوي كل منها على (١٠-١٥) براعماً.	
٣- حافظ على الفروع في التربية الرأسية، وحاول أن تجد أخرى نامية، عليها براعم؛ لتقصيرها إلى برعم واحد، يسمى دائرة استبدالية.	
٤- حافظ على الكردونات في التربية الكردونية، انظر الشكل (١).	
٥- حافظ على القصبات، واستبدل بالقديمة أخرى جديدة.	
٦- أزل أي نموات على الساق غير مرغوب فيها، بالإضافة إلى النموات التي تخرج من تحت سطح الأرض، وبخاصة الأصل البرّي.	
	الشكل (١): كردون العنب.

– ما الأهداف التي يجب أن يحققها التقويم الإثماري لشجيرات العنب؟



## النتائج الخاصة

- يصف نباتات العنب نباتيًا.
- يميز نباتات العنب نباتيًا.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم عن طريق النشاط/التدريب

- تقسيم الطلاب إلى مجموعات وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (١-٢٥) كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تتفحص شجيرات العنب، وتلاحظ ما يأتي:
  - الشجرة من حيث حجمها، وشكلها، ولون القلف.
  - المجموعة الثانية: تتفحص أوراق العنب، وتلاحظ ما يأتي: نوعها، حافاتها، وجود الفصوص، طول العنق، النصل، وجود الزغب على النصل السفلي، وجود المحاليق.
  - المجموعة الثالثة: تتفحص البراعم في العنب، وتلاحظ ما يأتي: نوعها، عددها، موعد تفتحها.
  - المجموعة الرابعة: تتفحص أزهار العنب، وتلاحظ نوعها.
  - المجموعة الخامسة: تتفحص ثمار العنب، وتلاحظ ما يأتي:
    - نوعها، ووجود العصير، ووجود البذور، وعددها أصنافها، وشكل الثمرة، ولونها.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.
- يجب المعلم عن تساؤلات الطلبة في أثناء العمل.
- يعرض المعلم الإجابة الصحيحة.
- تكليف مقرر كل مجموعة إرجاع الأدوات والمواد إلى مكانها.

## تمييز نباتات العنب

التمرين  
(١-٢٥)

## النشاطات

يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:

- تصف نباتات العنب نباتيًا.
- تميز نباتات العنب نباتيًا.


المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

● شجيرات عنب. ● عدسة مكبرة يدوية. ● سكين.

## الرسوم التوضيحية

## خطوات العمل والنقاط الحاكمة

تفحص شجيرات العنب، ولاحظ ما يأتي:



- ١- حجم الشجرة: كبير
- ٢- الشكل: متسلسلة أو زاحفة، وتبدو قائمة عند تربيتها
- ٣- لون القلف: بني
- ٤- الأوراق: بسيطة، ومشرشرة الحواف، مقسمة إلى فصوص، عنقها طويل، ونصلها السفلي مغطى بالزغب، ويقابل الأوراق على السيقان محاليق.
- ٥- البراعم: مركبة تتكون من ثلاثة براعم، تفتح أو سطها في الربيع، وتفتح الأخران عند تعرض الأوسط للمضرب.
- ٦- الأزهار: إما كاملة (خنثى)، وإما وحيدة الجنس، تحمل في نورات.
- ٧- الثمار: عنبية من النوع البسيط، عصيرية، بداخلها ٢-٤ بذور، باستثناء الأصناف الخالية من البذور، يختلف شكل الثمرة من الكروي إلى البيضاوي، لونها أبيض، أو أحمر داكن، أو أسود.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

– يرسم الطلبة الأجزاء النباتية التي تفحصوها، ويدونون أسماء الأجزاء على الرسم.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (٩٠)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

– كتاب الإنتاج النباتي – المستوى الثاني.

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- Childers, N., Modern fruit science . U.S. Library of the Congress, ninth edition . 1983.
- .. and 2. Eagle Wood Cliffs., plant Science, Growth, Development, Utilization of Cultivated Plant. New Jersey: Printice-Hall Inc.1991

#### للطالب

- فهمي شتات ، بساتين التفاحيات واللوزيات والعنب والزيتون، وزارة الزراعة، عمان، ١٩٩٥م.
- فهمي شتات وآخرون، أشجار الفاكهة، ط٢، جامعة القدس المفتوحة عمان الأردن، ٢٠٠٦م.

### التقويم

- ١- ارسم في دفترك رسماً توضيحياً تبين فيه الأجزاء النباتية التي تفحصتها، ودون ملاحظاتك في دفتر التدريب العملي.
- ٢- ارسم برعم عنب غير متفتح، مبيناً أسماء الأجزاء على الرسم.
- ٣- ما معنى ثمرة عنب؟
- ٤- صف أوراق العنب.
- ٥- ماذا تسمى النموات الرفيعة التي تقابل أوراق العنب؟

### أخطاء شائعة

## النتائج الخاصة

- يصف نبات التين نباتيًا.
- يتعرّف طبائع إزهار التين وإثماره.
- يوضح المفاهيم الآتية: محصول الدافور، وسايكونيوم، وثمره حسلة.
- يصف ثمرة التين نباتيًا.
- يتعرّف أنواع التين المختلفة.
- يقارن بين أنواع التين المختلفة.

## المفاهيم والمصطلحات

محصول الدافور، وسايكونيوم، وثمره.

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- ما اسم العائلة التي ينتمي لها التين؟ ما الاسم العلمي للتين؟ ما تصنيف التين حسب طبيعة نمو الأشجار من حيث تساقط الأوراق؟ ما الوطن الأصلي للتين؟ ما أكثر مناطق زراعة التين في العالم؟ ما أكثر الدول إنتاجًا للتين؟ كم يبلغ إنتاجها السنوي بالطن؟ مناقشة إجابات الطلبة، وتدوين ما هو صحيح على السبورة.

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- لتعرّف طبائع إزهار التين وإثماره، يعرض المعلم الشكلين (١-٥٨) و(١-٥٩)، ثم يقسم الطلاب إلى خمس مجموعات، ويكلف أعضاء كل مجموعة ما يأتي:

- المجموعة الأولى: تدرس طبائع إزهار التين وإثماره، وتجيّب عن الأسئلة الآتية:

■ كم يبلغ عدد المحاصيل التي تنتجها شجرة التين في السنة؟

■ ماذا تُسمّى محصول التين الأول، متى ينتج، ومتى تنضج ثماره؟

■ أين تحمل براعم المحصول الربيعي للتين؟ لماذا لا يستفاد كثيرًا من محصول التين الأول؟ ماذا يُسمّى محصول التين الثاني؟ متى ينتج؟

■ متى تنضج ثماره؟ أين تحمل براعم التين في المحصول الصيفي؟

■ ماذا تمتاز ثماره؟

● المجموعة الثانية: تقارن بين محصول التين الربيعي والصيفي من حيث مكان حمل البراعم الثمرية، وموعد إنتاجه، وموعد نضجه، وحجم ثماره، وحلاوة الثمار، ومدى الإفادة منه.

● المجموعة الثالثة: تدرس ثمرة التين، وذلك بعمل مقطع طولي في ثمرة التين، وتعرّف الأجزاء الآتية: الفرع الذي يحمل الثمرة، الحامل

## ثامنًا / التين

ينتمي التين إلى العائلة التوتية (Moraceae)، واسمه العلمي (*Ficus carica*). والتين شجرة متساقطة الأوراق، موطنها الأصلي غرب آسيا، تكثُر زراعتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وبخاصة إيطاليا وأسبانيا اللتان تنتجان (٨٧٩ ألف طن)، وهو يمثل ثلثي إنتاج العالم، وتزرع في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وتنتج منه مايقرب من ٤٢ ألف طن سنويًا.

## الإزهار والإثمار

تنتج شجرة التين محصولين في السنة، أحدهما ربيعي، يعرف بالدافور، تنضج ثماره في بداية فصل الصيف، ولا يستفاد من المحصول الأول كثيرًا، لأن ثماره غير جيدة مع أنها كبيرة الحجم، فحلاوتها قليلة، ويتساقط قسم منها. والآخر هو المحصول الصيفي العادي (الرئيس)، تنضج ثماره في أواخر الصيف، وهي صغيرة نسبيًا مقارنة بمحصول الدافور، إلا أنه يفوقه جودة؛ بسبب حلاوة ثماره. وتحمل البراعم الثمرية للمحصول الربيعي جانبيًا على نموات الموسم السابق، في حين تحمل براعم المحصول الصيفي أيضًا جانبيًا، ولكن على النموات الموسمية (الطرود الصيفية الباكورية)، كما في الشكل (١-٥٨).



الشكل (١-٥٨): طبيعة الحمل في التين.

● ثمرة التين: تعدّ ثمرة التين مركبة، وهي حامل ثمري خمي يسمى سايكونيوم، في داخله تجويف متصل بالخارج بوساطة فتحة تسمى العين عند قمة الثمرة، وهذه الفتحة مغطاة بحراشف. ويحمل التجويف الأزهار المونثة فقط (في أنواع التين العادي)، أو المونثة والمذكورة، كما هو الحال في أنواع التين البرّي، وتعرف الثمرة

١٨٢

الشمري، التخت اللحمي، تجويف التخت، ثمرة من زهرة مونثة، ثمرة من زهرة مذكرة، أزهار مذكرة، حراشف.

- المجموعة الرابعة: تتعرّف أنواع التين العادي من حيث كيفية عقد الثمار، وجود البذور، أهم أصنافه، وتعرّف تين (سان بيدرو) الأبيض والتين الأزميري من حيث كيفية إنتاج المحصول الأول والمحصول الثاني، وأهم أصنافه.
- المجموعة الخامسة: تتعرّف تين كابري وكيفية استخدامه لتلقيح أنواع التين الأخرى.

- يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.

- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.

- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

### مراعاة الضرووق الفردية

#### علاج

#### إثراء

- يوجه بعض الطلبة إلى البحث في أحد كتب البستنة الشجرية المتوفرة في مكتبة المدرسة عن أنواع التين المختلفة، ثم عرض ما يتوصلون إليه على زملائهم.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٩١)

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

- كتاب الإنتاج النباتي - المستوى الثاني.

#### مصادر التعلم

##### للمعلم


- مجلة المهندس الزراعي، العدد الخاص بالمؤتمر الزراعي الوطني الثاني العدداً (٦٩-٧٠)، نقابة المهندسين الزراعيين، عمان، الأردن، حزيران، ٢٠٠١م.

- George.A.Cquaah.Horticulture Principles and practices.  
Pearson Prentice Hall. 2005.

##### للطالب

- خليل جرن، دليل المزارع السنوي، وزارة الزراعة، عمان، الأردن، ٢٠٠٨م.  
- محمد زين، الموسوعة الزراعية: الفاكهة والأشجار المثمرة، دار الطريق للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٠م.

الواحدة منها بالحسلة، انظر الشكل (١-٥٨) الذي يظهر مقطعاً طوليًّا في ثمرة التين.



- أ - جزء الفرع الذي يحمل الثمرة.
- ب - الحامل الثمري.
- ج - الثخت اللحمي.
- د - تجويف الثخت.
- هـ - ثمرة من زهرة مؤنثة.
- و - أزهار مذكرة.
- ز - حراشف.

الشكل (١-٥٩): طبيعة الحمل في التين.

أنواع التين: يمكن تقسيم التين إلى أربعة أنواع، كما يأتي:

١. التين العادي: تعقد ثماره بكريًّا من دون الحاجة إلى عملية الإخصاب، لذا فإن ثماره عديمة البذور، ومن أصنافه تين كادوتا، وميشن، وأدرياتك، والتركي البني، بالإضافة إلى أصناف التين المحلية (الزراقي، والبياضي، والموازي، والخضاري،... إلخ).
٢. تين سان بيدرو الأبيض: ينتج في المحصول الأول ثمار الدافور، من دون تلقيح أو إخصاب، ولكن يحتاج المحصول الثاني إلى تلقيح أزهاره، كما هي الحال في نوع التين الأزميري.

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يحدّد الاحتياجات المناخية لأشجار التين.
- يصف التربة الملائمة لنمو وإنتاج التين.
- يتعرّف طرق تكثير التين.
- يتعرّف مسافات الزراعة المناسبة لأشجار التين.
- يصف عمليات الخدمة اللازمة لبساتين التين.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

– التمهيد للدرس: ينفذ المعلم جلسة لمناقشة الاحتياجات المناخية الملائمة لنمو أشجار التين وإنتاجها، والتربة الملائمة لنمو التين وإنتاجه. ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما أنواع أشجار التين وفق المناخ الملائم لنموها وإثمارها؟ كم تبلغ احتياجات أشجار التين من ساعات برودة الشتاء لكسر طور السكون؟ ما المناخ الملائم لنمو أشجار التين وإثمارها؟ أين تنتشر زراعة التين في الأردن؟ ما نوع التربة المثلى لأشجار التين؟ ما خصائص التربة المثلى لأشجار التين؟ ما أثر التربة القلوية في أشجار التين في السنوات الأولى من زراعتها؟ مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

– لتعرّف طرق تكثير التين يقدم المعلم عرضاً تقديمياً يتضمن أكثر الطرق شيوعاً لتكثير التين، ثم يقسم الطلاب إلى مجموعات، ويهيئ البيئة الصفية المناسبة للعمل، كما يأتي:

- المجموعة الأولى: تعدد طرق تكثير التين.
- المجموعة الثانية: تلخص الخطوات المتبعة لتكثير التين بالعقل الساقية المتخشبة.
- المجموعة الثالثة: تبحث في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، أو النشرات الزراعية عما يأتي: أسباب انتشار تكثير التين تجارياً بالعقل الساقية المتخشبة، طرق تكثير التين الأخرى (الترقيد، التطعيم، وغيرها) من حيث: المزايا والعيوب، ثم تعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية وتناقشه مع الطلاب.

– يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.

– الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.

– يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

## التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

– التمهيد للحصة: ينفذ المعلم جلسة لمناقشة مسافات الزراعة، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما العوامل التي تحدد مسافات الزراعة اللازمة في بساتين التين؟ ما مسافات زراعة غراس التين في الأراضي المستوية؟ ما طريقة الزراعة المتبعة في زراعة غراس

٣. التين الأزميري: ينتج ثماراً في المحصول الأول، ويتكون المحصول الثاني عند تلقيح الأزهار المؤنثة داخل السيكونيوم من حبوب لقاح من تين كبري، إذ تقوم حشرة البلاستوفاجا بنقله داخل الثمرة عن طريق فتحة العين، وبعد إتمام عملية التلقيح، تتكون داخل السيكونيوم ثمرات صغيرة ذات بذور حية.
٤. تين كبري: ينتج ثماراً لا تصلح للأكل، بل يستخدم لتلقيح أنواع التين الأخرى.

## ٢ المناخ

احتياجات أشجار التين إلى برودة الشتاء لكسر طور السكون النسبي تكاد تكون معدومة، أو قليلة جداً، إذ تبلغ (٢٠٠ ساعة)، مع أنها من أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق، وهي تتحمل درجات حرارة منخفضة شتاء تصل إلى تحت الصفر المئوي. يمكن زراعة التين في المناطق شبه الجافة المتميزة بالصفيف الطويل الجاف نسبياً، والشتاء الدافئ، وتنتشر زراعته في الأردن في محافظة العاصمة، وإربد، وعجلون، واللقاء، وهي تعتمد جميعها على مياه الأمطار.

## ٣ التربة

أفضل أنواع التربة لزراعة غراس التين هي الطينية والغرينية والمتوسطة الخفيفة الحصية، على أن تكون غير قلوية، لأنها تسرع نموها الخضري، وبخاصة في السنوات الأولى من زراعتها، وتؤخر إثمارها، ويمكن زراعتها في الأراضي الكلسية.

## ٤ طرق التكاثر

يمكن تكثير أشجار التين بطرق عدّة، منها التكاثر بزراعة البذور، والتكاثر بالعقل أو بالتطعيم، ويمكن اللجوء إلى طريقة الترقيد، وتعّد طريقة التكاثر بالعقل الخشبية أكثر الطرق استعمالاً وانتشاراً. وفي ما يأتي الخطوات المتبعة لتكثير التين بالعقل الساقية المتخشبة:

١. تؤخذ العقل أثناء موسم التقليم الشتوي من ثمرات عمرها (٢-٣) سنوات، وطولها (٢٥-٤٠) سم.
٢. يمكن الاستعانة بمنظم النمو أندول بيوتريك (IBA)؛ للمساعدة على سرعة التجذير.
٣. تجمع العقل في حزم، وتخزن في خنادق خاصة، أو غرف من طبقات متبادلة من الرمل، أو الشارة المرطبة بالماء لمدة أربعة أسابيع.
٤. تنقل العقل إلى المشتل، وتررع على خطوط، ويعنى بها.

التين في المناطق المنحدرة والجبلية؟ مناقشة إجابة الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

– لتعرّف عمليات الخدمة اللازمة لبساتين التين يقدم المعلم عرضاً تقديمياً يتضمن أكثر الطرق شيوعاً لتكثير التين، ثم يقسم الطلاب إلى مجموعات، ويهيئ البيئة الصفية المناسبة للعمل، كما يأتي:

- المجموعة الأولى: تدرس عمليتي الحرث والعزق من حيث عدد مرات الحرث، أهداف عملية الحرث.
  - المجموعة الثانية: تدرس عملية تسميد أشجار التين من حيث استجابة التين للسماد النيتروجيني، معدل السماد النيتروجيني (كغ/دونم)، وموعد إضافة الأسمدة العضوية.
  - المجموعة الثالثة: تدرس عملية ريّ التين من حيث أسباب عدم ريّه في الأردن، واستجابة التين للريّ التكميلي في سنوات الجفاف، وأثر الريّ التكميلي في الثمار ونمو الأشجار.
  - المجموعة الرابعة: تدرس عملية تقليم في التين من حيث اختلاف احتياجاته إلى التقليم باختلاف الأصناف، وأهداف عملية تقليمه.
- يقدم منسق كل مجموعة ما توصلت إليه مجموعته في عرض تقديمي.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح موحد لدى الطلبة جميعهم.



## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

- يوجه بعض الطلبة إلى البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عمّا يأتي:
- تأثير درجات الحرارة في أشجار التين، ثم عرض ما يتوصلون إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية .
- كتابة تقرير يتضمن أثر درجة الحموضة في جاهزية عناصر التربة للامتصاص في بساتين التين.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء.
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٩٢).

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

- كتاب الإنتاج النباتي - المستوى الثاني.

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- طه عبدالله نصر، إكثار أشجار الفاكهة / القواعد العلمية والأساليب العصرية، مكتبة المعارف الحديثة، الإسكندرية، ٢٠٠٣ م .

#### للطالب

### فضية للبحث

يكثر التين تجاريًا في المشاتل بالعقل الساقية المتخشبة، ابحث في شبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية عمّا يأتي:

- ١- أسباب انتشار تكثير التين تجاريًا بالعقل الساقية المتخشبة.
- ٢- طرق تكثير التين الأخرى (الترقيد، والتطعيم،... إلخ) من حيث: المزايا والعيوب. واعرض ما توصل إليه، وناقشه مع زملائك .

### مسافات الزراعة

تتراوح مسافات الزراعة بين ٦-١٢ مترًا في الأراضي المستوية، أما في المناطق المنحدرة والجبلية فيزرع على خطوط الكنتور بمسافات تختلف باختلاف الميول في خطوط الكنتور.

### عمليات الخدمة

تشمل عمليات خدمة التين ما يأتي:

- ١- الحرث والعزق: تحرق الأرض وتعرق، وبخاصة الأراضي البعلية.
- ٢- التسميد: يستجيب التين للسماد النيتروجيني، فتضاف (١٠ كغ) نيتروجين/دوم، ويفضل إضافة الأسمدة العضوية في نهاية فصل الخريف.
- ٣- الري: لا يروى التين؛ لأن معظم أشجاره مزروعة في المناطق المرتفعة التي تعتمد على مياه الأمطار، إلا أنه يستجيب للري التكميلي، وبخاصة في سنوات الجفاف، إذ يساهم الري في تحسين جودة الثمار ونمو الأشجار.
- ٤- التقليم: تختلف احتياجات التين إلى التقليم باختلاف الأصناف، فهناك أصناف تحتاج إلى تقليم جائر، مثل صنف (كادوتا) و(التركي البني)، وأخرى تكتفي بتقليم خفيف، مثل صنف (مشن) الذي لا يثمر إذا قلم تقليمًا جائرًا، أو قُصرت فروعه. ويمكن القول بأن الحاجة إلى تقليم أشجار التين (في معظم الأصناف) التي وصلت إلى حجمها النهائي من التقليم قليل نسبيًا، ويمكن أن تقلم هذه الأشجار تقليمًا خفيفًا غير جائر مرة كل سنة، لأن التقليم الشتوي الجائر يقلل المحصول الأول والمحصول الكلي للشجرة. ويهدف التقليم الإنمائي إلى:

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يتعرّف أكثر الآفات شيوعاً في بساتين التين.
- يتعرّف أهم أصناف التين الموجودة في الأردن.
- يصف عمليتي نضج ثمار التين وجنيها.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للحصة: ينفذ المعلم جلسة لمناقشة أبرز الآفات شيوعاً في بساتين التين، ويمكن توجيه الأسئلة الآتية: ما أكثر الأمراض شيوعاً في بساتين التين؟ ما أكثر الحشرات التي تهاجم أشجار التين؟ مناقشة إجابة الطلبة وتدوين الإجابات الصحيحة على السبورة.

## التعلم التعاوني / العرض التوضيحي

- تعرّف أهم أصناف التين الموجودة في الأردن، يعرض المعلم الشكل (١-٦٠)، ثم يكلف الطلبة ضمن المجموعات تنفيذ ما يأتي:

- المجموعة الأولى: تدرس صنف التين الخضاري، والسوادي من حيث الشكل واللون ومواعيد النضج.

- المجموعة الثانية: تدرس أصناف التين الموازي، والبياضي، والعجلوني، والزراقي من حيث الشكل واللون ومواعيد النضج.

- المجموعة الثالثة: تزور بستاناً مزروعاً بأشجار التين، وتعدّ تقريراً يشتمل على ما يأتي: أصناف التين المتوفرة وصفاتها، ثم تعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية وتناقشه مع الطلاب .

- يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.

- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.

- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح موحد لدى الطلبة جميعهم.

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- تعرّف عمليتي نضج ثمار التين وجنيها يقدم المعلم عرضاً توضيحياً عمليتي نضج ثمار التين وجنيها، ثم يكلف الطلبة ما يأتي:

- المجموعة الأولى: تحدد مواعيد نضج ثمار التين تبعاً للصنف والموقع.

- المجموعة الثانية: تحدد علامات نضج الثمار.

النموات الضعيفة على الأجزاء الداخلية من الشجرة، وللحصول على ثمار عالية الجودة.

٢. تجديد النموات السنوية.

٣. إزالة السرطانات، منعاً للتزاحم وتعدد سيقان الشجرة.

٤. إزالة الفروع غير المرغوب فيها، والمريضة، والمكسورة.

٥. الآفات: تصاب أشجار التين بأفات عديدة، أهمها: الديدان الثعبانية (النيماطودا)، ومرض ترقش الأوراق الفيروسي، وصدأ التين، وعفن الثمار، وحشرة البحر الأبيض المتوسط القشرية، وحلم التين، والعنكبوت الأحمر، وحشرة التين الشمعية، وحقار ساق التين، وذباب ثمار التين.

٦. الأصناف: كما في الشكل (١-٥٩): تتبع أصناف التين في الأردن نوع التين العادي، وأصناف التين المحلية كثيرة، وتختلف تسميتها من منطقة إلى أخرى، وتختلف أشكالها، وألوانها، ومواعيد نضجها، وأهم هذه الأصناف: الخضاري، السوادي، الموازي، البياضي، العجلوني، والزراقي، وغيرها.



عجلوني.

عسالي.

زراقي.

الشكل (١-٦٠): بعض أصناف التين الشائعة محلياً.

## زيارة ميدانية

زر بستاناً مزروعاً بأشجار التين، وأعدّ تقريراً يشتمل على ما يأتي:

١- أصناف التين المتوفرة، وصفاتها.

٢- الآفات المنتشرة في البستان.

٣- عمليات الخدمة المتبعة.

واعرض ما تتوصل إليه، وناقشه مع زملائك .

## ● المجموعة الثالثة: تصف عملية جني ثمار التين، ومراحل

تداول الثمار التي تشمل: الفرز، والتدريج، والتعبئة، وغيرها.

- يقدم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.

- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.

- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى

الطلبة جميعهم.

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

– يكلف بعض الطلبة ما يأتي:

- تصميم عرض تقديمي من خمس شرائح عن أكثر الآفات شيوعاً في بساتين التين.
- البحث في المصادر المتاحة باستخدام برمجية العروض التقديمية (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن أهم أصناف التين الموجودة في الأردن، ثم عرض النتائج على زملائهم.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: مراجعة الذات
- أداة التقويم: سجل وصف سير التعلم (٩٣-١)
- استراتيجية التقويم: قلم وورقة
- أداة التقويم: اختبار قصير (٩٤-١)
- استراتيجية التقويم: الملاحظة
- أداة التقويم: التقويم المعتمد على الأداء (٩٥-١)

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

- كتاب الإنتاج النباتي – المستوى الأول.

#### مصادر التعلم

##### للمعلم

- Hartman, H., Kester, D., Davies, F. and Geneve, R. Plant propagation : principles and practices, 7th edition . 2002.

##### للطالب

### النضج والجنين: توضح ثمار التين أواخر شهر أيار حتى شهر تشرين الأول، وذلك تبعاً للصنف والموقع، ومن أهم علامات نضج الثمار ما يأتي:

١. تصبح الثمار طرية وحلوة المذاق.
٢. وصول الثمار إلى حجمها الطبيعي.
٣. تغير لون الثمار من الأخضر إلى الأخضر المائل إلى الصفرة، أو من الأخضر إلى الأسود... إلخ.

جنين المحصول: تقطف الثمار للاستهلاك الطازج عند بداية طراوتها قبل اكتمال تلونها باللون المميز للصنف، وفي حالة استخدامها للتجفيف؛ تترك على الشجرة مدة طويلة؛ كي تفقد أكبر قدر ممكن من الماء قبل سقوطها، ثم تجمع وتوضع في صوان، وتجفف في أشعة الشمس مدة ٤-٥ أيام. ويعطي كل ٣ كغ من الثمار الطازج كيلواً غراماً واحداً من الثمار الجافة، ويمكن تخزينها مدة تتراوح بين ٦-٨ أشهر.

وأفضل الأوقات لجنين ثمار التين هي ساعات الصباح الباكر، نظرًا إلى أن الثمار الناضجة تكون طرية، لذا يجب جنيها بكل عناية وحذر.

وفي أثناء عملية الجني تفصل الثمار المصابة أو المشققة عن الثمار السليمة، وتوضع الأخيرة في صناديق خاصة، في طبقة، أو طبقتين في كل صندوق. ويمكن تخزين ثمار التين مدة أسبوع، أو أسبوعين في غرف تبريد درجة حرارتها في حدود الصفرة، ورطوبتها (٨٥٪-٩٠٪).

#### التقويم

- ١- اكتب الاسم العلمي للتين، واسم الفصيلة التي يتبعها.
- ٢- صف ثمرة التين نباتيًا مستعينًا بالرسم.
- ٣- اذكر أشهر ثلاث طرق لتكثير التين.
- ٤- ضع مخططًا لعمليات الخدمة اللازمة لأشجار التين.

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- تختار الفروع المراد أخذ عقل منها.
- تحضر عقلاً ساقية متخشبة.
- تعامل العقل الساقية المتخشبة بهرمونات التجذير المناسبة.
- تزرع العقل الساقية المتخشبة في المشتل

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- تقسيم الطلاب إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (١-٢٦)، كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تختار الفروع المراد أخذ عقل منها.
- المجموعة الثانية: تحضر عقلاً ساقية متخشبة.
- المجموعة الثالثة: تعامل العقل الساقية المتخشبة بهرمونات التجذير المناسبة.
- المجموعة الرابعة: تزرع العقل الساقية المتخشبة في المشتل.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.
- مناقشة إجابات الطلبة، وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.
- يعرض المعلم الإجابة الصحيحة.
- تكليف مقرر كل مجموعة إرجاع الأدوات والمواد إلى مكانها.

تكاثر نباتات التين بالعقل الساقية المتخشبة

التمرين  
(١-٢٦)

النتائج

- يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:
- تختار الفروع المراد أخذ عقل منها.
  - تحضر عقلاً ساقية متخشبة.
  - تعامل العقل الساقية المتخشبة بهرمونات التجذير المناسبة.
  - تزرع العقل الساقية المتخشبة في المشتل.

المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

«أمهات من أشجار التين. «صناديق. «أحواض تجذير. «هرمون تجذير. «وسط زراعي مناسب. «مقص تقليم.

الرسوم التوضيحية

خطوات العمل والنقاط الحاكمة



الشكل (١): عقلة متخشبة

- ١- اختر فروعًا عمرها سنة، وقطرها (١-٣سم) من الأشجار المرغوب فيها (الأمهات).
- ٢- قصّ الفروع إلى عقل، طول كل منها (١٥-٦٠سم).
- ٣- قصّ الطرف العلوي للعقل قصًا مائلًا فوق البرعم الطرفي بـ (١-٢سم)، وقصّ الطرف السفلي للعقلة قصًا مستويًا تحت العقدة مباشرة، انظر الشكل (١).
- ٤- اغمس قواعد العقل في هرمون التجذير، ثم تخلص من الكميات الزائدة بهزّ العقلة.
- ٥- اغرس العقل في خطوط المشتل على أبعاد (٢٥سم) تقريبًا على نحو مائل، بحيث يبقى برعم واحد، أو اثنان فوق سطح التربة، انظر الشكل (٢). أما في حالة وضعها في صناديق للتجذير فقط فتزرع على أبعاد ٢-٣سم، ثم تنقل.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الضرووق الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف بعض الطلبة تكثير بعض نباتات التين بالعقل الساقية المتخشبة باستخدام ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.

### استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم: التقييم المعتمد على الأداء
- أداة التقييم: سلم تقدير (١-٩٦)

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي


#### مصادر التعلم

#### للمعلم

- George.A.Cquaah.Horticulture Principles and practices.  
Pearson Prentice Hall. 2005.

#### للطالب

– سلام أيوب، الدليل الفني لتطعيم الأشجار المثمرة، المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٦م.



الشكل (٢): طريقة زراعة العقل في أتلام المشتل.

٦- حافظ على رطوبة التربة لمنع جفاف العقل.

#### التقييم

- ١- ما مواصفات العقلة الخشبية الجيدة؟
- ٢- علّل:
  - أ - تقصّ العقلة المتخشبة قصّاً مائلاً من أعلى.
  - ب - يفضل زراعة العقل في المشتل على نحوٍ مائل.
- ٣- حدّد مكونات الخلطة (الوسط الزراعي) المناسبة لتجذير العقل في المشتل.
- ٤- يمكن تجذير العقل في صناديق خاصة تحتوي على وسط زراعي مناسب؛ كالرمل، فأيهما تفضل: هذه الطريقة، أم تجذير العقل في المشتل؟ ولماذا؟

### أخطاء شائعة



## النتائج الخاصة

- تصف نباتات التين نباتيًا.
- تميز نباتات التين نباتيًا.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (١-٢٧)، كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تتفحص أشجار التين من حيث حجمها النهائي، وطريقة انتشار فروعها.
- المجموعة الثانية: تتفحص أوراق التين من حيث حجمها، وطولها، وعرضها، ووجود فصوص، وعددها، وطول العنق، وصفات الحافة، وهل النصل أملس، أم مغطى بالزغب؟ ومقارنة كمية الزغب على سطحي الورقة.
- المجموعة الثالثة: تتفحص الأزهار من حيث وجود التويج، وموقع وجود الزهرة، ونوع العقد.
- المجموعة الرابعة: تتفحص الثمار من حيث شكلها، وتركيبها، وموقع الثميرات، وهل توجد الثمرة في إبط الورقة، أم على عقدة مقابل الورق؟
- المجموعة الخامسة: تتفحص فرع التين، وتحدد طبيعة حمل التين المسمى دافور والحمل في محصول التين الثاني.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.
- يجيب المعلم عن تساؤلات الطلبة في أثناء العمل.
- يعرض المعلم الإجابة الصحيحة.
- تكليف مقرر كل مجموعة إرجاع الأدوات والمواد إلى مكانها.

## تمييز نباتات التين

التمرين  
(١-٢٧)

## النتائج

- يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:
- تصف نباتات التين نباتيًا.
- تميز نباتات التين نباتيًا.

## المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

\* أشجار تين. \* سكين. \* عدسة مكبرة يدوية.

## الرسوم التوضيحية

## خطوات العمل والنقاط الحاكمة



١- تفحص أشجار التين، ولاحظ ما يأتي:

- حجمها النهائي: كبير، ما طريقة انتشار فروعها؟
- الأوراق: كبيرة، طولها يتراوح بين (١٠-٢٠ سم)، وعرضها يماثل طولها تقريبًا، مجزأة إلى فصوص، عددها (٣-٥)، عنقها طويلة وحافتها مشرشرة من غير انتظام. هل النصل أملس، أم مغطى بالزغب؟ قارن بين كمية الزغب على سطحي الورقة.
- الأزهار: تخلو من التويج، وتوجد في داخل تجويف الثمرة المشتم، وتعد بكثرة.
- الثمار: كثرة الشكل، مركبة من ثميرات عدّة، توجد داخل تجويف متشحم، أين توجد الثمرة؟ هل توجد في إبط الورقة، أم على عقدة مقابل الورق؟

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف الطلبة ما يأتي:

- رسم الأجزاء النباتية التي تفحصوها على الرسم.
- تدوين أسماء عمل مقطع عرضي في ثمار التين، وتعرف أجزائه.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٩٧)

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

– كتاب الإنتاج النباتي – المستوى الأول.

#### مصادر التعلم

للمعلم

#### للطالب

– سلام أيوب، الدليل الفني لتطعيم الأشجار المثمرة، المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٦م.

٢- تفحص فرع التين، ولاحظ:

- وجود ثمار على طول الفرع الذي عمره سنة، يتضح أن الحمل في التين المسمى دافور يكون جانبيًا على فروع عمرها سنة.
- وجود الثمار على طول الفرع الذي عمره أقل من سنة (فرع النمو الحالي)، يتضح أن الحمل في التين (المحصول الثاني) يكون جانبيًا على فروع عمرها أقل من سنة.

#### التقويم

- ١- ارسم في دفترك رسمًا توضيحيًا يبين الأجزاء النباتية التي تفحصتها، ودون ملاحظاتك في دفتر التدريب العملي.
- ٢- ارسم مقطعًا عرضيًا في ثمرة التين، واكتب أسماء الأجزاء على الرسم.
- ٣- صف أوراق التين.
- ٤- حدّد طبيعة حمل الثمار في التين.
- ٥- كيف تعقد ثمار التين؟

### أخطاء شائعة

## النتائج الخاصة

- يصف الفراولة نباتيًا.
- يتعرّف مجموعات الفراولة.
- يقارن بين مجموعات الفراولة المستديمة الإثمار الفراولة التي تثمر في حزيران.
- يصف طرق تكثير الفراولة.
- يتعرّف مواعيد زراعة الفراولة.
- يتعرّف الاحتياجات الحرارية الفراولة.
- يصف عمليات زراعية الفراولة.
- يتعرّف طرق زراعة الفراولة.
- يتعرّف مسافات زراعة الفراولة وكميات التقاوي اللازمة.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر/أسئلة وأجوبة

– طرح الأسئلة الآتية:

- ما اسم العائلة التي ينتمي لها نبات الفراولة؟ ما الاسم العلمي للفراولة؟ هل تصنف الفراولة من أشجار الفاكهة أم من محاصيل الخضراوات؟ علّل إجابتك. لماذا توصف الفراولة بأنها نبات عشبي معمر؟ لماذا كان نبات الفراولة الفاكهة الوحيدة التي تتأثر أزهارها بطول النهار ودرجات الحرارة؟
- مناقشة إجابات الطلبة وتدوين الصحيح منها على السبورة.

التعلم التعاوني/العمل الجماعي

- لتعرّف مجموعات الفراولة، وطرق تكثيرها، ومواعيد زراعتها، واحتياجاتها الحرارية، والعمليات الزراعية اللازمة لها، وطرق زراعتها، ومسافات الزراعة وكميات التقاوي، يعرض المعلم فيلمًا توضيحيًا، ثم يكلف الطلبة ضمن المجموعات ما يأتي:

- المجموعة الأولى: تدرس مجموعات الفراولة المستديمة الإثمار والفراولة التي تثمر في حزيران، وتجيّب عن الأسئلة الآتية: متى تبدأ الفراولة المستديمة الإثمار بالإثمار؟ متى تبدأ فراولة إثمار حزيران بالإثمار؟ لماذا تحتاج أصناف الفراولة المستديمة الإثمار والفراولة التي تثمر في حزيران إلى برودة الشتاء؟ لماذا تتأخر الفراولة المستديمة الإثمار عن الإزهار عند زراعتها في المناطق الدافئة؟ ما أثر ارتفاع درجات الحرارة في الفراولة التي تثمر في حزيران؟ ما أكثر

## تاسنًا

## الفراولة

اسمها العلمي (*Fragaria spp*)، وتنتمي إلى الفصيلة الوردية (Rosaceae). لا يتفق العاملون في البستنة على الصنف الذي تنتمي إليه الفراولة، فبعضهم يعدّها من أشجار الفاكهة، وآخرون يلحقونها بمحاصيل الخضراوات. وتوصف الفراولة بأنها نبات عشبي معمر (Herbaceous perennial)، وهي الوحيدة من نباتات الفاكهة التي تتأثر أزهارها بطول النهار ودرجات الحرارة.

## ١ مجموعات الفراولة

توجد مجموعتان من الفراولة، هما:

١ فراولة مستديمة الإثمار (Ever-bearing): تنتج أزهارًا في أثناء النهار الطويل والقصير معًا، أي أنها تحمل مرة أخرى في الصيف، وتحتاج أصناف الفراولة المستديمة إلى برودة أشدّ لكسر الطور نفسه، وتتأخر في الإزهار عند زراعتها في المناطق الدافئة. وبصورة عامة تزرع أصنافها، مثل: جينفا (Geneva)، وأوجالالا (Ogallala)، وأزرارك بيوتي (Ozark Beauty)، وجيم (Gem) في الحدائق المنزلية.

٢ فراولة إثمار حزيران (June-bearing): تبدأ البراعم الزهرية بالتكوّن عندما يقصر النهار، وتنخفض درجات الحرارة، ويبدأ إثمارها في أشهر كانون الثاني، وشباط، وآذار. وعندما يطول النهار، وترتفع درجات الحرارة تبدأ النباتات بتكوين المذادات الزاحفة (Runners)، أو (Stolons)، أي أن النبات يتوقف عن النموّ الزهري، ويبدأ بالنموّ الخضري. تحتاج الفراولة إلى برودة الشتاء لكسر طور سكون إثمار حزيران، وتزرع أصنافها، مثل: تيوجا (Tioga)، وشاستا (Shasta)، وجارديان (Guardian)، وفريزنو (Fresno)، وشكسان (Shuksan) على نطاق تجاري. وهناك مجموعة من الفراولة لا يتأثر إزهارها أبدًا بطول النهار، وتسمّى فراولة النهار المحايدة (Day-neutral strawberry).

فكر هل تعرف اسم فاكهة غير الفراولة يتأثر إزهارها بطول النهار؟

## ٢ تكثير الفراولة

تُكثّر الفراولة بزراعة الأنسجة وبالمذادات الزاحفة التي كوّنّها النبات، إذ تجزأ إلى نباتات، كلٌّ منها يحتوي ورقين إلى ثلاث، وجذورًا وبرعمًا طرفيًا، وبراعم جانبية في أباط الأوراق.

١٩٢

أصناف الفراولة المستديمة الإثمار انتشارًا؟ ما أكثر أصناف الفراولة المثمرة في حزيران انتشارًا؟ هل تستطيع ذكر اسم فاكهة غير الفراولة يتأثر إزهارها بطول النهار؟

- المجموعة الثانية: تدرس إكثار الفراولة من حيث طرق الإكثار، كيفية الإكثار بالمذادات الزاحفة.
- المجموعة الثالثة: تحدد مواعيد زراعة أصناف الفراولة ذات النهار القصير، وذات النهار المعتدل في مناطق الأردن المختلفة.
- المجموعة الرابعة: تدرس الاحتياجات الحرارية للفراولة.
- المجموعة الخامسة: تزور بستانًا مزروعًا بنباتات الفراولة، وتعدّ تقريرًا يشتمل على ما يأتي: العمليات الزراعية للفراولة، طرق زراعتها، مسافات الزراعة وكميات التقاوي، ثم تعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية، وتناقشه مع الطلاب.

- يقدّم منسق كل مجموعة ما تتوصل إليه مجموعته في عرض تقديمي.
- الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.
- يقدم المعلم التغذية الراجعة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم.

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف بعض الطلبة تنفيذ ما يأتي:

- إعداد تقرير يتضمن مجموعات الفراولة المستديمة الإثمار و فراولة حزيران، وذلك بالبحث في شبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية عن ذلك، ثم عرض ما يتوصلون إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية.
- البحث في الشبكة الإنترنت، أو النشرات الزراعية عن مواعيد زراعة الفراولة في مناطق الأردن المختلفة، ثم عرض ما يتوصلون إليه.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٩٨)
- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٩٩)

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

#### مصادر التعلم

#### للمعلم

- إنتاج محصول الفراولة بأسلوب المكافحة المتكاملة، إعداد مشروع المكافحة المتكاملة، عمان، الأردن، ١٩٩٩م.

#### للطالب

- إنتاج محصول الفراولة بأسلوب المكافحة المتكاملة، إعداد مشروع المكافحة المتكاملة، عمان، الأردن، ١٩٩٩م.

#### ٣ مواعيد الزراعة

تعتمد زراعة الفراولة على الصنف، كما يأتي:

- الأصناف ذات النهار القصير: تزرع في الأغوار من تشرين الأول-كانون الأول، وفي المناطق الشفاغورية من منتصف كانون الثاني-منتصف حزيران.
- الأصناف ذات النهار المعتدل: تزرع من حزيران-آب

#### ٤ الاحتياجات الحرارية

يتراوح المجال الحراري المناسب للنمو الحضري للفراولة بين ٢٠-٢٧°س، أما المجال الحراري المناسب للنمو الزهري فيتراوح بين ١٤-١٨°س.

#### ٥ العمليات الزراعية

تحث الأرض حرثاً عميقاً، ثم تربص التربة وتنعم، وتعمم، وتقام المصاطب بارتفاع ٤٠-٦٠ سم، ويسط الممش، ثم تزرع المصاطب. ويجب على المزارع أن يتابع عمليات العرق والتعشيب، ويزيل المدادات التي تضعف نمو النبات الأصلي، والأوراق الجافة، والأوراق المصابة بالآفات.

#### ٦ طرق الزراعة

تزرع الفراولة بوصفها محصولاً حوثياً بإحدى الطرق الآتية:

- زراعة الشتلات التي سبق تخزينها في درجة حرارة تبلغ ١-٢ إلى ٢-٣، لمدة ٧-٨ شهور، تزرع الشتلات في شهر آب على خطوط تروى بالغمر من دون تعقيم التربة، أو استعمال الممش، أو الأنفاق البلاستيكية.
- زراعة الشتلات الطازجة: تزرع الشتلات في منتصف أيلول ومنتصف تشرين الأول على مصاطب مرتفعة تروى بالتنقيط، ثم تعقم التربة، ويستعمل الممش أو الأنفاق البلاستيكية.

#### ٧ مسافات الزراعة وكمية التقاوي

تكون الزراعة في أربعة خطوط في كل مصطبة، يبعد كل خط منها عن الآخر مسافة ٢٠ سم، وتترك مسافة ١٥ سم بين كل خط من الخطين الجانبيين وحافة المصطبة. وتكون الشتلة على مسافة ٢٥-٣٠ سم بين النباتات في الخط الواحد، مع جعل حفر الزراعة متبادلة في الخطوط المتجاورة. وتتحدد المسافات بين النباتات في الخط بالصنف المزروع، ومدى قوة نموه الحضري، وتتراوح كثافة الزراعة بين ٨١٥٥-١٠٦٢٥ شتلة للدونم، بمتوسط قدره ٩٣٩٠ شتلة للدونم عندما تكون المسافة بين المصاطب المتجاورة ٥٠ سم، وينخفض إلى

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يصف التربة المناسبة لنمو الفراولة وإنتاجها.
- يتعرف عمليات الخدمة (الري، التسميد) اللازمة لبساتين الفراولة.
- يتعرف أهم أصناف الفراولة الشائعة محلياً.
- يتعرف أكثر الآفات شيوعاً في بساتين الفراولة.
- يصف عمليتي نضج لثمار الفراولة وجنيها.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- تعرف التربة المناسبة لنمو الفراولة وإنتاجها، وعمليات الخدمة اللازمة لبساتين الفراولة، وأهم أصناف الفراولة الشائعة محلياً، وأكثر الآفات شيوعاً في بساتين الفراولة، وعمليات نضج ثمار الفراولة وجنيها يعرض المعلم فيلماً توضيحياً، ثم يكلف المعلم الطلبة ضمن المجموعات ما يأتي:
- المجموعة الأولى: تدرس التربة المناسبة لنمو الفراولة وإنتاجها من حيث أنواع التربة المناسبة لزراعة الفراولة، والرقم الهيدروجيني المناسب لذلك.
- المجموعة الثانية: تدرس عملية ري نباتات الفراولة من حيث العوامل التي يعتمد عليها برنامج الري، وكمية مياه الري اللازمة لتوفير الرطوبة الأرضية.
- المجموعة الثالثة: تدرس تأثير مكان الإنتاج وطريقة الإنتاج والصنف ونظام الري وقوام التربة ومدى خصوبتها، وبرامج التسميد الموصى بها في محصول الفراولة.
- المجموعة الرابعة: تبحث في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، أو النشرات الزراعية عن أهم أصناف الفراولة الشائعة محلياً، وتعرض ما تتوصل إليه باستخدام برمجية العروض التقديمية وتناقشه مع الطلاب.
- المجموعة الخامسة: تبحث عن أكثر الآفات شيوعاً في بساتين الفراولة، وتصف عمليتي نضج ثمار الفراولة وجنيها من حيث التغيرات المصاحبة لنضج ثمار الفراولة، وجنيها وحصادها.
- تقديم التغذية الراجعة من قبل المعلم للتوصل إلى فهم صحيح وموحد لدى الطلبة جميعهم، ثم يعرض مقررهم المجموعات ما تتوصل إليه كل مجموعة في عرض تقديمي. الاستماع إلى آراء المجموعات الأخرى.

٨٩٠ شتلة/دوتم تقريباً عندما تكون المسافة بين المصاطب المتجاورة ٦٠سم.

## ٨ التربة المناسبة

تعُد الأراضي الطميّة الخفيفة والرملية أفضل لأرض لزراعة الفراولة، أمّا الأراضي الكلسية، أو الرديئة التهوية والتصريف، أو الموبوءة بالنيماتودا، أو فطريات الذبول، أو الحشائش المعمرة فهي غير مناسبة. ويفضل أن تتراوح درجة الحموضة pH بين ٥,٥-٦,٥.

## ٩ الري

تحتاج الفراولة إلى كميات كبيرة من مياه الريّ العالية الجودة التي لا يزيد تركيز الأملاح فيها على ٧٠٠-٩٠٠ جزء في المليون. أمّا البرنامج المتبع في ريّ الفراولة فإنه يعتمد على نسبة الرطوبة الأرضية، فكلّما انخفضت في الحيز الذي تنمو فيه الجذور إلى نحو ٥٠-٦٠٪ من الرطوبة عند الشعة الحقلية فإنه يلزم ريّ النباتات. وتتراوح كمية مياه الريّ التي تلزم لإعادة الرطوبة الأرضية إلى السعة الحقلية بين ١٠م<sup>٢</sup> للهكتار في الأراضي الرملية الخشنة و١٧م<sup>٢</sup> في الأراضي الرملية المتوسطة القوام، وحتى ٢٩م<sup>٢</sup> للهكتار في الأراضي الرملية الناعمة.

## ١٠ التسميد

تختلف برامج التسميد الموصى بها لمحصول الفراولة باختلاف مكان الإنتاج، وطريقته، والصنف، ونظام الريّ، وقوام التربة، ومدى خصوبتها.

## ١١ الأصناف الشائعة محلياً

شاندرلر، وأوزوجراند، وأونر، وتني، وفستفال، وفنتانا، وسي سكيب.

## ١٢ الآفات

تصاب الفراولة بالعديد من الآفات، منها:

① الأمراض: العفن الرمادي، وأمراض الذبول (الذبول الفيوزاري، والذبول الفرتسيليومي، وعفن الجذور الأحمر)

② الآفات الحشرية والحيوانية: العنكبوت الأحمر ذو النقطتين، وبرقات جُغل السكرابيد، والمنّ (منّ القطن، ومنّ الخوخ، ومنّ البطاطا، ومنّ جذور الفراولة).

## ١٣ نضج الثمرة

تكون الثمرة خضراء اللون عند بداية العقد، ثم تتحول تدريجياً إلى اللون الأبيض، ثم تتلون جزئياً باللون الوردي، ثم باللون الأحمر، ثم تتزايد مساحة الجزء الملون تدريجياً. ويبدأ



### مراعاة الضرووق الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف مجموعة من الطلبة البحث عن المشكلات والمعوقات التسويقية التي تواجه إنتاج الفراولة في الأردن، ووضع الحلول المقترحة التي يمكن تطبيقها على المستويين العام والخاص.

### استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم: مراجعة الذات
- أداة التقييم: سجل وصف سير التعلم (١-١٠٠)
- استراتيجية التقييم: قلم وورقة
- أداة التقييم: اختبار قصير ملحق (١-١٠١)
- استراتيجية التقييم: الملاحظة
- أداة التقييم: السجل القصصي (١-١٠٢)

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

#### مصادر التعلم

#### للمعلم

– عواد حسين، ماجدة بهجت، الخصائص العامة للحاصلات البستانية بعد الحصاد وعلاقتها بالتكنولوجيات المستخدمة في التداول بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية ستامفورد آنكتكت – الولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠٠٧م.

#### للطالب

التلون بالطرف القمي للثمرة نحو الطرف القاعدي، وتعتمد طول مدة التلون، أو قصرها منذ تفتح الأزهار حتى نضج الثمرة على درجة الحرارة، فهي تتراوح بين ٢٦-٣٨ يوماً. أما التغيرات المصاحبة لنضج ثمار الفراولة فهي:

- ١- زيادة الحجم: يتمثل في زيادة حجم الخلايا، وتضخم الفجوات العسارية.
- ٢- زيادة نسبة الرطوبة.
- ٣- نقص الصلابة.
- ٤- زيادة نسبة المواد الصلبة الذاتية الكلية.
- ٥- زيادة كبيرة في نسبة السكريات التي تشكل ٧٠-٨٠٪ من المواد الصلبة الذاتية.
- ٦- نقص الحموضة المعايرة.
- ٧- تكون الصبغات الأنثوسيانينية الحمراء.
- ٨- تمثيل المركبات العطرية المتطايرة المسؤولة عن النكهة المميزة.

#### الجني والحصاد

تؤثر درجات الحرارة في عملية الجني والحصاد، ويكون الجني والحصاد يوماً بعد يوم، أو كل ثلاثة أيام، أو يومياً خلال وفرة الإنتاج في المساحات الكبيرة. وينبغي أن يكون في الصباح الباكر بعد زوال الندى من النباتات؛ حتى لا تنتشر الأمراض من النباتات المصابة إلى السليمة في أثناء مرور العمال إلى الحقل. تقطف الثمرة مع جزء من العنق يبلغ طوله نصف سم، ويجب ألا يحمل العامل أكثر من ثمرتين في يده في أثناء الجني والحصاد.

#### التقييم

- ١- تصنف نباتات الفراولة إلى مجموعتين، اذكرهما.
- ٢- وضح كيفية تكثير الفراولة بالمذادات الزاحفة.
- ٣- حدّد المواعيد المناسبة لزراعة أصناف الفراولة ذات النهار القصير في كل من:
  - أ - غور الأردن.
  - ب - المناطق الشفاغورية.
- ٤- اذكر التغيرات المصاحبة لنضج ثمار الفراولة.

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## النتائج الخاصة

- يفصل المدادات المناسبة عن الأم.
- يزرع مدادات الفراولة.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتهيئة البيئة الصفية المناسبة للعمل لتنفيذ خطوات التمرين (٢٨-١) كما يأتي:
- المجموعة الأولى: تفكك التربة حول نباتات الفراولة الأم.
- المجموعة الثانية: تفصل المدادات عن الأم.
- المجموعة الثالثة: تنقل الأشتال وتزرعها في الأرض الدائمة.
- المجموعة الرابعة: تروي النباتات بعد زراعتها.
- يتابع المعلم عمل المجموعات، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقوم أداءهم.
- يجيب المعلم عن تساؤلات الطلبة في أثناء العمل.
- يعرض المعلم الإجابة الصحيحة.
- تكليف مقرر كل مجموعة إرجاع الأدوات والمواد إلى مكانها.

## تكثير نباتات الفراولة بالمدادات

التمرين  
(٢٨-١)

## النتائج

- يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:
- تفصل المدادات المناسبة عن النباتات الأم.
- تزرع مدادات الفراولة.

## المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

\* مدادات فراولة. \* وسط زراعي. \* منقاش. \* مقصّ تقليم.

## الرسوم التوضيحية

## خطوات العمل والنقاط الحاكمة



الشكل (١): تكثير نبات الفراولة بالمدادات.

- ١- فكك التربة حول نباتات الفراولة الأم، لتشجيع نمو الجذور على العقد، انظر الشكل (١).
- ٢- افصل المدادات عن النباتات الأم حينما تصل إلى حجم كاف، أي عندما يبلغ طول المجموع الخضري ٨-١٠ سم.
- ٣- انقل هذه الأشتال، وازرعها في الأرض الدائمة.
- ٤- ارو النباتات بعد الزراعة.

## التقويم

- ١- كيف تشجع سيقان نباتات الفراولة على تكوين جذور؟
- ٢- حدّد مواصفات مدادات الفراولة المناسبة للتكثير.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف عدد من الطلبة تكثير نباتات الفراولة بالمدادات، باستخدام ما يلزم من مواد وأدوات وتجهيزات متوافرة.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (١-٣)

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- ملك أبو زينة وآخرون، دليل المواصفات القياسية الأردنية للفاكهة الطازجة، وزارة الزراعة، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.
- محمد البدور، مسنات الحيارى، تقدير خسائر فاقد ما بعد الحصاد لبعض محاصيل الخضار والفواكه، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.
- رابندارات طاغور، بديع حقي (مترجم)، جني الثمار، دار العلم للملايين، بيروت، ٢٠٠٠م.

#### للطالب

### أخطاء شائعة



# الوحدة الثانية

البستنة الخضرية



النتائج الخاصة

- يتعرف المناخ والتربة الملائمين لزراعة البندورة.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالبندورة.
- يوضح طرق الزراعة الملائمة لمحصول البندورة.
- يحدد مسافات زراعة محصول البندورة.
- يحدد مواعيد زراعة البندورة في ضوء احتياجاتها المناخية.
- يتعرف العمليات اللازمة لإنتاج محصول البندورة.

المفاهيم والمصطلحات

الترقيع، الخف، العزق، الري.

السلامة المهنية

استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بتوظيف خبرات الطلبة السابقة وطرح الأسئلة الآتية:
  - ما الاسم العلمي للبندورة؟ ما العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج البندورة؟
  - ما التربة الملائمة لزراعة البندورة؟ هل تختلف مواعيد الزراعة من منطقة إلى أخرى؟ كيف يمكن تحديد مسافات الزراعة؟ فيم تختلف طريقة زراعة البندورة زراعة مطرية عن الزراعة المروية؟
- تناقش المعلم المجموعات للتوصل إلى الإجابات الصحيحة ثم يدونها على السبورة.
- التعلم التعاوني / العمل الجماعي
- تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتحديد الأدوار والزمن اللازم على النحو الآتي:
  - المجموعة الأولى: البحث عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة في نمو البندورة ( قضية بحث).
  - عرض نتائج البحث ومناقشته بتوجيه المعلم.
  - المجموعة الثانية: البحث عن تأثير شدة الإضاءة في نبات البندورة (قضية بحث)،
  - عرض النتائج ومناقشتها بإشراف المعلم.
  - المجموعة الثالثة: توضيح المقصود بالمصطلحات الآتية: الترقيع، الخف، العزق، الري، التسميد.
  - تنظم المجموعة نتائج عملها وتعرضه وتناقشه.
  - المجموعة الرابعة: البحث عن أهمية عملية الترقيع ( قضية بحث )، وعرض نتائج البحث.
  - تنظم المجموعة نتائج عملها وتعرضه وتناقشه.

الملاحق

ملحق اجابات الأسئلة (١)، ملحق أدوات التقييم (٢-١).

الفصيلة الباذنجانية Solanaceae

أولاً

تضم هذه الفصيلة أجناساً وأنواعاً كثيرة مزروعة في مختلف مناطق العالم، ومن أهم محاصيل الخضراوات التي تتبع الفصيلة الباذنجانية: البندورة، والباذنجان، والبطاطا، والفلفل.

١ البندورة (Tomato)

الاسم العلمي: (*Lycopersicon esculentum*)

تزرع البندورة على نطاق واسع في العالم، وفي الأردن بلغت مساحة الزراعة في المناطق الزراعية جميعها (١٤٨ ألف) دوتم تقريباً، وقد بلغ معدل الإنتاج (٧٩٣ ألف) طن لعام ٢٠٠٩. وتتميز البندورة بقيمتها الغذائية العالية، ودخول ثمارها في غذائنا اليومي.

نشاط (١-٢)

شارك زملاءك في كتابة تقرير عن الأهمية الغذائية للبندورة.

١ المناخ: تعدّ البندورة من الخضراوات الصيفية، وتحتاج إلى موسم دافئ، طويل، خالٍ من الصقيع، وتتأثر بالعوامل المناخية الآتية:

فكر بما أن البندورة من الخضراوات الصيفية فكيف تزرع شتاءً في الأغوار؟

١. الحرارة: تتراوح درجة الحرارة المناسبة لإنتاج محصول جيد بين (١٨ - ٢٨)°، ويلائمها تفاوت درجات الحرارة بين الليل والنهار، بنحو ٦°، وتؤثر درجة الحرارة في أطوار نموها كما يأتي:
  - أ. مرحلة إنبات البذور: إن درجة الحرارة الدنيا للتربة اللازمة لإنبات البذور هي ١٠° س، والمثلى ٣٠° س.
  - ب. مرحلة نمو النبات: تحتاج إلى درجة حرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩° س.

قضية للبحث

إن ارتفاع درجة الحرارة عن ٢٩° س في مرحلة نمو النبات يؤثر في نمو البندورة، ابحث عن هذه التأثيرات باستخدام المصادر المعرفية المتاحة (كتب، شبكة الإنترنت، ...)، ثم اعرض ما تتوصل إليه من معلومات عن طريق برمجية معالجة النصوص، وناقشه مع زملائك.

١٩٩

المنطقة	الزراعة المكشوفة	الزراعة المحمية
المرتفعات والبادية	٤/١ - ٤/٣٠	٤/١٥ - ٤/١
الشفاء غورية	٣/١٥ - ٣/١	٨/١٥ - ٨/١
الأغوار	١/١٩ و ٩/١	١٢/١٥ - ١١/١

٢ طرق الزراعة وكمية التقاوي: تزرع أشتال البندورة في الأراضي المكشوفة والبيوت المحمية عندما يكون عمر الشتلة ٤-٦ أسابيع، وبعد تقسيبها تزرع بطريقتين:

١. الزراعة المطرية (البعليّة): وتكون في الأراضي المكشوفة، وفي المناطق المرتفعة التي تعتمد على تساقط الأمطار، إذ تزرع الأشتال في أتلام، وتترك مسافة بينها تتراوح بين ١٠٠ - ١٥٠ سم، أما المسافة بين النباتات فتبدأ من ٥٠ - ٨٠ سم، ويحتاج الدوتم إلى ١٥٠٠ شتلة تقريباً.
٢. الزراعة المروية: تزرع الأشتال في مصاطب مغطاة بالبلاستيك الأسود (الملش)، وتترك مسافة بين المصاطب من ٧٠ - ٨٠ سم، وبين النباتات ٤٠ سم في البيوت المحمية والحقول المكشوفة. ويمكن الزراعة في أتلام، من دون استخدام الملش الأسود، بحيث تكون المسافة بينها ٦٠ - ٨٠ سم، وبين النباتات ٥٠ سم، باستخدام الري السطحي، وتتراوح حاجة الدوتم بين ٢٥٠٠ شتلة إلى ٣٥٠٠ شتلة.

٣ عمليات الخدمة بعد الزراعة: تحتاج البندورة إلى عمليات الخدمة الآتية:

١. الترقيع: تعاد زراعة الجور التي لم تنجح فيها الأشتال من الصنف المزروع نفسه بعد أسبوع من الزراعة، وقد قُلت الآن هذه العملية؛ بسبب التقنيات الحديثة للتشتيل؛ كالزراعة في صواني التشتيل، ومعاملة الأشتال بمواد شمعية.

فكر لماذا يجب عدم تأخير إجراء عملية الترقيع؟

٢. الخفّ: لا تجرى هذه العملية في حالة الزراعة بواسطة الأشتال إلا إذا زرعت البذور في الحقل مباشرة، فيترك نبات واحد في كلّ جورة.
٣. العزق: تجرى هذه العملية؛ لتخلص من الأعشاب؛ ولتفكيك سطح التربة وتهويتها، وتجميع التراب حول ساق البندورة المدفون في التربة في حالة الزراعة في أتلام من التلم المقابل، وتسمى هذه العملية بالترقيد (التحسين)

٢٠١

- تدوير المجموعات من قبل المعلم وتنظيم النتائج وعرضها لتوحيد فهم صحيح لدى الطلبة جميعهم.

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

- تكليف مجموعة الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن أضرار ارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها على محصول البندورة، ثم عرض النتائج ومناقشتها.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (٢ - ١).

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

- محمود القصرأوي، فؤاد قواسمة، الزراعة المحمية، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.

### للطالب

- محمود القصرأوي، الحضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

جـ. مرحلة عقد الأزهار: للحصول على ثمار كبيرة الحجم، وزيادة نسبة العقد يجب أن تكون درجة الحرارة معتدلة ليلاً بين ١٥ - ٢٠ °س، أما انخفاضها عن هذا المعدل ليلاً يؤدي إلى موت حبوب اللقاح، ويؤدي ارتفاعها ليلاً عن ذلك إلى تساقط الأزهار.

د. مرحلة نضج الثمار وتلوّنها: إن أفضل درجة حرارة لتكوين اللون المرغوب في ثمار البندورة هي بين ١٢ - ٢٤ °س. أما إذا ارتفعت عن ٢٩ °س فإن ذلك يؤدي إلى زيادة نسبة الحموضة والمواد الصلبة، ويقلل تلوّن الثمار.

٢. الضوء: البندورة نبات محايد للضوء، أي أن أزهارها لا تتأثر بطول النهار، أو قصره، ولكنها تتأثر بشدة الإضاءة. ويكون التأثير في صفات الثمار، ولونها، وغمّ النبات، ويرجع سبب اللون في ثمار البندورة إلى وجود مادتي الليكوبين (Lycopene)، والكاروتين (Carotene). وتكوين لون طبيعي لا بد من توافر ١٢ ساعة إضاءة وحرارة معاً لإنتاج محصول جيد.

### قضية للبحث

تأثر البندورة بشدة الإضاءة، ابحث عن هذه التأثيرات في غمّ نبات البندورة وثمارها باستخدام المصادر المعرفية المتاحة: (كتب، شبكة الإنترنت، ٠٠٠٠)، ثم اعرض ما تتوصل إليه من معلومات، ثم ناقشه مع زملائك.

٣. الرطوبة الجوية: تحتاج البندورة إلى رطوبة نسبية معتدلة تبلغ (٥٠ - ٧٠٪)، إذ إن ارتفاع الرطوبة الجوية مع زيادة درجات الحرارة يؤدي إلى انتشار الأمراض الفطرية، أما إذا انخفضت الرطوبة عن ٣٥٪ فإن ذلك يضعف النمو، ويجعل الأوراق باهتة، بسبب تساقط الأزهار.

التربة: تنجح زراعة البندورة في مدى واسع من أنواع الأراضي الرملية إلى الطينية الثقيلة، الجيدة التصريف والتهوئة، الخالية من مسببات المرضية، ويتراوح رقم الحموضة (pH) المناسب بين (٦ - ٦,٥)، وينصح باتباع دورة زراعية رباعية تخلو من أي محاصيل الفصيلة الباذنجانية؛ للمحافظة على خصوبة التربة، وتقليل انتشار الأمراض فيها.

مواعيد الزراعة: يختلف موعد الزراعة باختلاف الظروف الجوية السائدة وطريقة الزراعة، سواء أكانت مكشوفة أم محمية، وتزرع أشتال البندورة في الأردن حسب المواعيد الآتية:

٢٠٠

تتميز البندورة بأن جذورها سطحية، أي أنها تنتشر بالقرب من سطح التربة، لذا يجب أن يكون العزق سطحيًا حتى لا تتضرر الجذور.

### قضية للبحث

تعدّ عملية الترقيع من عمليات الخدمة المهمة في البندورة، ابحث عن فوائد هذه العملية باستخدام المصادر المعرفية المتاحة: (كتب، شبكة الإنترنت، ٠٠٠٠)، ثم اعرض ما تتوصل إليه من معلومات، وناقشه مع زملائك.

٤. الري: تزرع الأشتال بوجود الماء، وتروى النباتات بعد يومين من الزراعة، ثم ينظم الري كل ٣ - ٤ أيام لتثبيت الجذور في الأرض، وتطول فترات الري بعد ذلك بمعدل كل ٧ - ١٠ أيام، وذلك لمساعدة الجذور على التعمق والانتشار في التربة، ولتعزيز النمو الخضري الزائد، مما يؤثر في عقد الأزهار، ثم تروى ريثاً معتدلاً حسب الحاجة والحالة الجوية، بشرط ألا تجفّ التربة، ولكن يقلل الري في الحالات الآتية:

أ. بداية تفتح الأزهار حتى عقدها منعاً لتساقط الأزهار.

ب. نضج الثمار، حتى لا يتأخر نضجها، وتقلّ جودتها وتزداد احتمالية إصابتها بالأمراض.

أما في الزراعة البعلية فتزرع البندورة في المناطق التي يكون معدل سقوط الأمطار فيها ٣٠٠ ملم فأكثر، فتروى الأشتال عند الزراعة فقط.

٥. التسميد: تعدّ البندورة من النباتات المجهددة للتربة، وتستجيب للتسميد بالاسمدة الكيميائية، إذ تضاف ٣ أطنان من السماد العضوي (البلدي) المختمر عند إعداد الأرض للزراعة، أما بالنسبة إلى الأسمدة الكيميائية فتضاف للدوتم الواحد على النحو الآتي:

أ. ١٠ - ١٢ كغم نيتروجين N، تضاف على دفعات بعد أسبوعين من الزراعة.

ب. ٢٢ كغم فسفور P، تضاف عند الزراعة.

ج. ١٢ - ١٤ كغم بوتاسيوم K، تضاف عند الزراعة.

٢٠٢

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر، صفحة (١٩٩)

- تزرع داخل البيوت المحمية.

فكر، صفحة (٢٠١)

- حتى لا يكون هناك تفاوت بين النباتات داخل الحقل، وليكون موعد جني النباتات متماثلاً.

## النتائج الخاصة

- يتعرّف عملية تسليق نبات البندورة.
- يذكر أهم الأصناف الشائعة محلياً لنبات البندورة.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب نبات البندورة.
- يصف علامات نضجها لتحديد موعد الجني.

## المفاهيم والمصطلحات

التسليق ، النضج

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر / العمل في الكتاب المدرسي

- يمهّد المعلم للدرس ويقسّم الطلبة إلى مجموعات عمل ويحدد المهام والزمن اللازم على النحو الآتي:

- المجموعة الأولى: تدرس الشكل ( ٢ - ١): تسليق البندورة في البيوت المحمية، وتجيّب عن الأسئلة الآتية: كيف تسليق البندورة على الجبال؟ هل تجرى هذه العملية للنباتات ذات النمو المحدود؟ من أين تزال النموات الجانبية؟

- تنظم المجموعة نتائج عملها وتعرضه وتناقشه.

- المجموعة الثانية: تبحث في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) عن أصناف البندورة التي تزرع في الأردن، ثم عرض النتائج بوساطة شريحة عرض تقديمي.

- المجموعة الثالثة: تبحث في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) عن أكثر الآفات التي تهاجم البندورة في الأردن، ثم عرض النتائج وتناقشها.

التدريس المباشر / أسئلة وأجوبة

- يمهّد المعلم للدرس، ويهيء البيئة الصفية ويجري جلسة مناقشة محصول البندورة من حيث التسليق، والأصناف، والآفات، والنضج والجني، وي طرح الأسئلة الآتية:

- لماذا يسليق نبات البندورة؟ وفي أيّ مرحلة؟ ما طريقة تسليقها؟ وما شروطها؟
- ما أصناف البندورة التي تزرع في الأردن؟
- ما الآفات التي تهاجم محصول البندورة؟
- ما مراحل نضج البندورة؟ ومتى تقطف ثمارها؟
- مناقشة الطلبة للتوصل إلى الإجابات الصحيحة ثم تدوينها على السبورة.

## نشاط (٢-٢)

شارك زملائك في إعداد تقرير عن أنواع الأسمدة التي يستخدمها المزارع في الأردن لتسميد البندورة، وطرق إضافتها إلى النبات.

٦. التسليق: تجرى هذه العملية لأصناف البندورة غير المحدودة النمو التي تزرع في البيوت المحمية، إذ يربى النبات على أسلاك يصل ارتفاعها إلى ١٨٠ سم، ويقلم النبات المراد تسليقه بإبقاء ساق واحدة، وتزال النموات الجانبية التي تنمو من إبط الأوراق؛ لينطلق النبات إلى أعلى. وتعدّ هذه الطريقة من طرق الزراعة المكثفة التي تعطي محصولاً كبيراً مبكراً للنضج، عالى الجودة، لما تمتاز به من سهولة خدمة النبات عند القطف، وزيادة التهوية؛ مما يقلل من احتمال إصابتها بالأمراض، انظر الشكل (٢-١).



الشكل (٢-١): تسليق البندورة في البيوت المحمية.

٣. الأصناف: هناك مجموعة كبيرة من بذور البندورة تزرع في الأردن، منها ما يزرع في الأراضي المكشوفة، مثل: بتول، ومايسترو، وأزمير، وجرانديلا، و٦١٦، ودانيا،

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف مجموعة من الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن أصناف التفاح الذاتية الإثمار، وغير ذاتية (خلطية الإثمار)، ثم عرض ما تتوصل إليه ومناقشته مع زملائهم.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم تقدير (٢ - ١).

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

#### مصادر التعلم

##### للمعلم

– محمود القصرأوي، فؤاد قواسمة، الزراعة المحمية، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.

##### للطالب

– محمود القصرأوي، الخضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

وجميعها بذور هجينة، أما التي تزرع في البيوت المحمية فهي مثل تيتان، ونيوتن.

➤ **الآفات:** تصاب البندورة بكثير من الآفات، منها:

١. الأمراض: اللفحة المبكرة والمتأخرة، وذبول البادرات، والذبول الفيوزاري، وتعد أوراق البندورة الفيروسي.
٢. الحشرات: مثل الذبابة البيضاء، ودودة ثمار البندورة، والمن، وكلب الماء (المالوش، أو الحفار).
٣. الديدان الثعبانية (النيماتودا)
٤. الهالوك

➤ **النضج والجني:** تحتاج البندورة منذ الزراعة حتى نضجها إلى ما يقرب من ٦٠ -

٩٠ يوماً حسب الصنف، ونوع التربة، والظروف الجوية، وموعد الزراعة، وتقطف ثمارها في إحدى مراحل النضج الآتية:

١. طور النضج الأخضر والأبيض: تكون الثمار مكتملة النمو الطبيعي، ولونها أخضر مبيض، وتقطف في هذه الحالة من أجل التصدير إلى الخارج للأسواق البعيدة، إذ تكتسب اللون الأحمر في أثناء النقل، وتقطف أيضاً في هذا الطور من أجل التخليل.
  ٢. طور بداية التلوين (الأصفر): يبدأ اللون الأحمر بالظهور، وتقطف لتسويقها في الأسواق المحلية.
  ٣. طور تمام النضج (الأحمر): تقطف وهي صلبة ومتماسكة لتسويقها في الأسواق المحلية؛ للتصنيع، أو الطبخ.
- بعد أن تقطف البندورة تفرز، وتدرج، وتعبأ في صناديق مناسبة.

#### ٢ الباذنجان Eggplant

الاسم العلمي: (*Solanum melongena*)

بلغت المساحة المزروعة من الباذنجان في الأردن لعام ٢٠٠٩م (٢٩ ألف) دوتم، انتجت ١١٦ ألف طن تقريباً، وهو من الخضراوات المهمة لاحتواء ثماره على الألياف المفيدة غذائياً، ويستخدم في الطهو والمخللات والمربيات.

٢٠٤

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى



## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة الباذنجان.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة من نبات الباذنجان.
- يوضح الطرق الملائمة لزراعة الباذنجان.
- يحدد مسافات الزراعة المناسبة لنبات الباذنجان.
- يحدد مواعيد زراعة الباذنجان في ضوء احتياجاته المناخية.
- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاج الباذنجان.
- يذكر أهم أصناف الباذنجان الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب الباذنجان.
- يصف علامات نضج الباذنجان لتحديد موعد جنيه.

## المفاهيم والمصطلحات

الترقيع، العزق، النضج.

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر / أسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بتنفيذ المعلم جلسة لمناقشة محصول الباذنجان، ثم توجيه الأسئلة الآتية:
- ما الاسم العلمي للباذنجان؟ ما العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج الباذنجان؟
- ما التربة الملائمة لزراعة الباذنجان؟ هل تختلف مواعيد زراعته من منطقة إلى أخرى؟ كيف يمكن تحديد مسافات زراعته؟ وضح طريقة زراعة الباذنجان في الزراعة المكشوفة والمحمية؟
- مناقشة الإجابات، ثم تدوين الإجابة الصحيحة على السبورة.
- تكليف الطلبة البحث عن أثر الصقيع في الباذنجان (قضية بحث).
- التعلم التعاوني / العمل الجماعي
- يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات عمل، ويوزع المهام عليها على النحو الآتي:
- المجموعة الأولى: توضح مفهومي الترقيع والعزق.
- المجموعة الثانية: تصمّم برنامجاً لري الباذنجان وتسميده.
- المجموعة الثالثة: تعرض أهم أصناف الباذنجان التي تزرع في الأردن، وأكثر الآفات التي تهاجمه.
- المجموعة الرابعة: تشرح علامات نضجه.
- يعرض مقرر كل مجموعة نتائج عمل مجموعته أمام الطلبة، ثم يناقش ما يتوصلون إليه بإشراف المعلم، ثم تدوين النتائج على السبورة.

وجميعها بذور هجينة، أما التي تزرع في البيوت المحمية فهي مثل تيتان، ونيوتن.

الآفات: تصاب البندورة بكثير من الآفات، منها:

١. الأمراض: اللّفحة المبكرة والمتأخرة، وذبول البادرات، والذبول الفيوزاري، وتجعد أوراق البندورة الفيروسي.
٢. الحشرات: مثل الذبابة البيضاء، ودودة ثمار البندورة، والمّ، وقلب الماء (المالوش، أو الحفار).
٣. الديدان الثعبانية (النيماتودا)
٤. الهالوك

النضج والجني: تحتاج البندورة منذ الزراعة حتى نضجها إلى ما يقرب من ٦٠ -

٩٠ يوماً حسب الصنف، ونوع التربة، والظروف الجوية، وموعد الزراعة، وتقطف ثمارها في إحدى مراحل النضج الآتية:

١. طور النضج الأخضر والأبيض: تكون الثمار مكتملة النمو الطبيعي، ولونها أخضر مبيض، وتقطف في هذه الحالة من أجل التصدير إلى الخارج للأسواق البعيدة، إذ تكسب اللون الأحمر في أثناء النقل، وتقطف أيضاً في هذا الطور من أجل التخليل.
٢. طور بداية التلوين (الأصفر): يبدأ اللون الأحمر بالظهور، وتقطف لتسويقها في الأسواق المحلية.
٣. طور تمام النضج (الأحمر): تقطف وهي صلبة ومتماسكة لتسويقها في الأسواق المحلية؛ للتصنيع، أو الطبخ.

بعد أن تقطف البندورة تفرز، وتدرّج، وتعبأ في صناديق مناسبة.

## الباذنجان Eggplant

الاسم العلمي: (*Solanum melongena*)

بلغت المساحة المزروعة من الباذنجان في الأردن لعام ٢٠٠٩م (٢٩ ألف) دونم، أنتجت ١١٦ ألف طن تقريباً، وهو من الخضراوات المهمة لاحتواء ثماره على الألياف المفيدة غذائياً، ويستخدم في الطهو والمخلّلات والمربيات.

٢٠٤

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر صفحة (٢٠٥)

- يمكن زراعته في التربة الرملية الخفيفة .

فكر صفحة (٢٠٦)

- بأثارة الطبقة السطحية للتربة، فتغلق المسامات ويمنع تبخر الماء.



## مراعاة الضروك الفردية

### علاج

– تكليف بعض الطلبة كتابة تقرير عن أسباب الطعم المرّ في الباذنجان، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

### إثراء

– تكليف بعض الطلبة، تصميم عرض تقديمي من ثلاث شرائح عن مفهوم الدورة الزراعية باستخدام برمجية العروض التقديمية.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

– استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء

– أداة التقويم: سلم التقدير اللفظي (٢-٢)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

– محمود القصرأوي، فؤاد قواسمة، الزراعة المحمية، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.

### للطالب

– محمود القصرأوي، الحضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

١ المناخ: الباذنجان نبات صيفي يحتاج إلى موسم نموّ طويل حار، وتلائمه درجات حرارة تتراوح بين (٢٧-٣٣) س°، ويحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة في أطوار نموه الأولى، وإلى درجة حرارة معتدلة لعقد أزهاره وتلون ثماره.

### مهارات البحث والاتصال

يتأثر الباذنجان بالصقيع أكثر من البندورة والفلفل، ابحث في أضرار الصقيع على الباذنجان باستخدام المصادر المعرفية المتاحة (كتب، شبكة الإنترنت، ٠٠٠٠)، ثم اعرض ما توصل إليه من معلومات عن طريق برمجية العروض التقديمية، وناقشه مع زملائك.

٢ التربة: تنجح زراعة الباذنجان في التربة الطينية الرطبة العميقة الخصبة المفككة، الجيدة الصرف والتهوية، وينصح باتباع دورة زراعية رباعية، كما في البندورة.

فكر يتميز الباذنجان بموسم نموّ طويل، فكيف يمكن الحصول على إنتاج مبكر؟

مواعيد الزراعة: تنجح زراعة الباذنجان في الأردن كما في الجدول الآتي:

المنطقة	الزراعة المكشوفة	الزراعة المحمية
المرتفعات والبادية	٤ - ٦	١٥ / ٣ - ٤ / ١
الشفافغورية	٣ / ١٥	١٥ / ٢ - ٣ / ١٥
الأغوار	٨ / ١٥	١٥ / ١٠ - ١١ / ١٥

٣ طرق الزراعة وكمية التفاوي: تصبح أشتال الباذنجان جاهزة للزراعة عندما يبلغ طولها ١٥ سم تقريباً، وتزرع في الأتلام، وتقدر المسافة بين الخطوط بـ ٧٥ سم، وبين الشتل ٣٠ سم في الزراعة المكشوفة، أما في الزراعة المحمية فتزرع على خطوط الري في المساطب المغطاه بالملش الأسود على أبعاد ١٠٠ سم بين الخطوط، و ٥٠ سم بين الشتل، ويلزم ٢٥ غم من البذور لإنتاج أشتال تكفي لزراعة دونم واحد.

٤ عمليات الخدمة بعد الزراعة:

يحتاج الباذنجان إلى عمليات الخدمة الآتية:

١. الترقيع: تجرى العملية بوجود الماء بعد أسبوع إلى أسبوعين من الزراعة.
٢. العزق: تعزق الأرض؛ لإزالة الأعشاب، وتحسين قدرة التربة على الاحتفاظ

٢٠٥

بالرطوبة؛ وخليط السماد الكيميائي؛ وتجميع التراب حول سيقان النبات في الزراعة المكشوفة لتدعيمها. وفي بداية النمو يكون العزق عميقاً ثم يقل حتى بداية الإزهار، فيصبح سطحيّاً، ويوقف عندما تغطي النباتات سطح التربة، ويكون قلع الأعشاب باليد فحسب.

فكر كيف يحسن العزق قدرة التربة على الاحتفاظ بالرطوبة؟

٣. الري: تزرع الأشتال دائماً بوجود الماء، وتروى بعد يومين من الزراعة، ثم تنظم ريّات غزيرة على فترات بعيدة حتى بداية الإزهار، وخلال فترة عقد الثمار ونموّها تروى ريّاً خفيفاً على فترات متقاربة، لأنّ انقطاع الماء في هذا الوقت يؤدي إلى تساقط الأزهار والعقد الحديث، وظهور الطعم المرّ في الثمار.
٤. التسميد: الباذنجان من النباتات المجهدة للتربة، مثل البندورة، لذا يجب الاهتمام بعملية التسميد.

١ الأصناف: هناك أصناف عديدة، منها المحلي، مثل البلدي، والبتيري، وهناك أصناف أجنبية، مثل بلاك كنج، وبلاك شنتا، وجالاكسي ف١، وهي بذور هجينة.

٢ الآفات: يصاب الباذنجان بالعديد من الآفات الزراعية، أهمها:

١. الأمراض: مثل البياض الدقيقي.
٢. الحشرات: مثل حفار ساق الباذنجان، والذبابة البيضاء، والمن، وتطاط الأوراق.
٣. النيما تودا
٤. العنكبوت الأحمر

٣ النضج والجني: تقطف الثمار بقصّ أعناقها عند قاعدة الكأس بعد ثلاثة أشهر من الزراعة، عندما تصل إلى الحجم واللون المناسبين للتسويق، وهي لا تزال طرية، وقبل تمام نضجها، ولا تترك ثمار الباذنجان إلى تمام النضج، حتى لا تتلف أنسجتها، وتتصلب بذورها، ويصبح لونها بنيّاً، وطعم ثمارها لاذعاً، ولونها برونزياً، وهذا كله يؤثر في النبات، ويسبب له الضعف، ويقفل من تكوّن ثمار جديدة. ويبلغ إنتاج الدونم في الزراعة المحمية ١٢ طنّاً تقريباً، أي خمسة أضعاف الزراعة في أتلام.

٢٠٦

## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة البطاطا.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة من البطاطا.
- يوضح الطرق الملائمة للبطاطا لزراعته.
- يحدد مسافات زراعة البطاطا.
- يحدد مواعيد زراعة البطاطا في ضوء احتياجاتها المناخية.
- يتعرّف أبرز الآفات التي تصيب البطاطا.
- يصف علامات نضج البطاطا لتحديد موعد جنيها.

## المفاهيم والمصطلحات

التحضير

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر / الأسئلة والأجوبة

- التمهيد للدرس يربط التعلم السابق بالتعلم اللاحق وطرح الأسئلة الآتية:
- أين تنتشر زراعة البطاطا في الأردن؟ ما الاسم العلمي للبطاطا؟ ما العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج البطاطا؟ ما التربة الملائمة لزراعة البطاطا؟ هل تختلف مواعيد الزراعة من منطقة إلى أخرى؟ كيف يمكن تحديد مسافات الزراعة؟ وضح طريقة زراعة البطاطا.
- تكليف الطلبة البحث عن أثر ارتفاع الحرارة في البطاطا (قضية بحث)،
- تكليف الطلبة البحث عن سبب فشل إنبات درنات البطاطا (قضية بحث).
- مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.
- التعلم التعاوني / العمل الجماعي
- التمهيد للدرس وتوظيف خبرات الطلبة السابقة، ثم تقسيمهم إلى مجموعات عمل على النحو الآتي:
- المجموعة الأولى: توضح مفهوم الترقيع والعزق ومفهوم التحضيرين وفوائده.
- المجموعة الثانية: تصمّم برنامجاً لري البطاطا وتسميدها.
- المجموعة الثالثة: تعرض أبرز الأصناف التي تزرع في الأردن وأكثر الآفات التي تهاجم البطاطا وتنفذ نشاط (٢ - ٣).
- عرض نتائج المجموعات ومناقشتها وتصويبها وتلخيصها وتدوين الإجابات الصحيحة على السبورة.

## البطاطا Potato

الاسم العلمي: (*Solanum tuberosum*)

يعدّ محصول البطاطا أكثر المحاصيل إنتاجاً في العالم، وتنتشر زراعتها في الأردن في مناطق الأغوار والسهول والبادية، وبلغت مساحة الزراعة لعام ٢٠٠٩م (٥٦ ألف) دونم أنتجت ٢٠٦ آلاف طن.

المناخ: البطاطا نبات شتوي لا يتحمل الصقيع، وتتأثر بالعوامل المناخية الآتية:

١. الحرارة: تحتاج البطاطا في النصف الأول من حياتها خلال إنبات الدرنات وتكوين المجموع الخضري إلى درجات حرارة مرتفعة تبلغ ٢٤س°. أما في النصف الثاني من حياتها خلال تكوين الدرنات فتحتاج إلى نهار قصير ودرجات حرارة معتدلة تبلغ ١٨س° نهاراً، و١٢س° ليلاً.

## قضية للبحث

ابحث عن تأثير ارتفاع الحرارة عن ٣٠س° ليلاً وانخفاضها عن ٥س° في درنات البطاطا، باستخدام المصادر المعرفية المتاحة: (كتب، شبكة الإنترنت، ٠٠٠٠)، ثم اعرض ما تتوصل إليه من معلومات، وناقشه مع زملائك.

٢. الضوء: تحتاج البطاطا إلى نهار طويل في النصف الأول من حياتها، ونهار قصير في النصف الثاني من حياتها.

٣. الرطوبة الجوية: يلائم البطاطا رطوبة نسبية معتدلة تبلغ ٥٠ - ٧٠٪، أما انخفاضها فيؤدي إلى ضعف النمو الخضري وقلة المحصول.

التربة: تجود زراعة البطاطا في الأراضي الرملية الطينية المفككة التي تحتوي على كميات كافية من المواد العضوية والعناصر الغذائية، الجيدة الصرف والتهوية، وذات رقم حموضة (pH) يبلغ ٥,٢، إذ يقل احتمال إصابتها بالجرب إذا توافر ذلك. ويفضل عدم زراعة البطاطا بعد أي من المحاصيل الباذنجانية، إلا بعد مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات.

## حل المشكلات

يصاب محصول البطاطا في بعض مناطق زراعتها بمرض جرب البطاطا، اقترح حلاً علمياً مناسباً للتخلص من هذه الإصابة.

٢٠٧

وينصح بإضافة مبيد فطري للحفرة قبل الزراعة، للتخلص من بعض أسباب فشل الإنبات، كالعفن.

## قضية للبحث

ابحث عن أسباب فشل إنبات درنات البطاطا، مستخدماً المصادر المعرفية المتاحة: (كتب، أو شبكة الإنترنت، ٠٠٠٠)، ثم اعرض ما تتوصل إليه من معلومات، وناقشه مع زملائك.

٢. العزق: تجرى عملية العزق في حالة الزراعة في أتلام، وتبدأ بعد الإنبات مباشرة بتجميع التراب حول النبات من الجهة المقابلة للتلثم، وتسمى العملية بالتحضير؛ وذلك لحماية الدرنات من أشعة الشمس التي تسبب اخضرارها، ولتشجيع تكوين الريزومات التي ستكون في نهايتها الدرنات؛ مما يزيد من المحصول، بالإضافة إلى فوائد عملية العزق الأخرى، وهي التخلص من الأعشاب، وتفكيك التربة حول الدرنات؛ ليكبر حجمها، وتحفظ رطوبة التربة. ويكون العزق سطحيًا، ثم يقتصر على قلع الأعشاب باليد، عندما تغطي النباتات سطح التربة.

## نشاط (٢-٣)

إن عملية ردم التراب حول البطاطا يحميها من أشعة الشمس، ومن إصابة الدرنات بحشرة معروفة، ابحث عن اسم هذه الحشرة، وتعرّفها أنت وزملائك.

٣. الري: بعد زراعة الدرنات بوجود الماء ترك من دون ري حتى تنبت، إلا في حالة جفاف التربة، ثم ينظم الري حسب نوع التربة ومرحلة نمو النبات كما يأتي:
- أ. المرحلة الأولى من حياة النبات: هي مرحلة نمو وتكون مجموع خضري قوي؛ ولذلك يجب توفير كميات مناسبة من الماء خلال هذه المدة، وبخاصة في المراحل النهائية التي يبدأ فيها تكون الدرنات، لأن ذلك يؤثر في عدد الدرنات المتكونة.
- ب. المرحلة الثانية من حياة النبات: كلما تقدم النبات في العمر قلت كمية الري اللازمة، ولكن يجب عدم تعطيش النباتات في هذه المدة؛ لأنها تكون درنات صغيرة الحجم، قليلة الجودة، ويجب إيقاف الري قبل قلع

٢٠٩

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الضرووق الفردية

#### علاج

– تكليف بعض الطلبة كتابة تقرير عن فوائد عملية تحضين البطاطا، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

#### إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن أضرار الزراعة السطحية للبطاطا، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم التقدير اللفظي (٢ - ٣)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

– محمود القصرأوي، فؤاد قواسمة، الزراعة المحمية، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.

#### للطالب

– محمود القصرأوي، الحضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

➤ مواعيد الزراعة: يرتبط موعد الزراعة بدرجة الحرارة السائدة في المنطقة التي يراد الزراعة فيها، لذلك تزرع البطاطا في الأردن في المواعيد الآتية:

المنطقة	موعد الزراعة
المرتفعات والبادية	٢/١ - ٣/١ و ٧/١٥ - ٨/١٥
الشفاعورية	٢/١ - ١٢/١٥
الأغوار	٩/١٥ - ١١/١٥ و ١٢/١٥ - ٢/١

➤ طرق الزراعة وكمية التقاوي: تعتمد طريقة الزراعة على مساحة الأرض المراد زراعتها، وطريقة الري المستخدم، ففي المساحات الكبيرة تستخدم الآلات لزراعة البطاطا، أما في المساحات الصغيرة فتزرع يدوياً في المصاطب أو تلقياً خلف المحراث، وتكون المسافات بين المصاطب المغطاة بالملش الأسود باستخدام الري بالتنقيط من ٧٥ - ١٠٠ سم، وبين النباتات من ٣٠ - ٣٥ سم، وكذلك في الأتلام. وتزرع الدرنات المستنبطة مسبقاً كما في الشكل (٢-٢) على عمق ١٠ - ١٥ سم، بوجود الماء، ولا ينصح بالزراعة السطحية؛ لأنها تقلل من تكوين الدرنات، ولا ينصح بالزراعة العميقة، لأنها تقلل المحصول. ويحتاج الدنوم إلى ما يقرب من ٢٠٠ - ٢٥٠ كغم من تقاوي البطاطا.



الشكل (٢-٢): تنببت درنات البطاطا قبل الزراعة.

➤ عمليات الخدمة بعد الزراعة: تحتاج البطاطا إلى عمليات الخدمة الآتية:

١. الترقيع: تعاد زراعة الحفر التي لم تنبت فيها الدرنات بدرنات جديدة سبق إنباتها،

٢٠٨

المحصول بأسبوعين؛ لأن زيادته قبل النضج تؤدي إلى تكوين نموات خضرية جديدة تقلل من كمية المحصول وصفاته.

٤. التسميد: البطاطا مثل أي محصول في الفصيلة الباذنجانية مجهددة للتربة، ولهذا

تحتاج إلى ٣م ٢ من السماد البلدي المختمر للدنوم، تضاف عند إعداد الأرض للزراعة، وتحتاج إلى أسمدة كيميائية على النحو الآتي:

أ. (٣٠) كغم من النيتروجين N لكل دنوم، تضاف على ثلاث دفعات بدءاً من الأسبوع الثالث من الزراعة.

ب. (٣٠) كغم من الفسفور P لكل دنوم، تضاف عند الزراعة.

ج. (٣٠) كغم بوتاسيوم K لكل دنوم، تضاف عند بدء تكوين الدرنات.

د. الأصناف: يوجد أصناف عديدة من درنات البطاطا تزرع في الأردن، وتختلف في شكلها، ولونها، وحجمها، وقابليتها للتصنيع، منها: سيونت، ودرجا، وديامونت، وأجاكس.



الشكل (٢-٣): درنات بطاطا.

➤ الآفات: تصاب البطاطا بكثير من الآفات، أهمها:

١. الأمراض: الذبول البكتيري (العفن البني)، واللفحة المبكرة والمتأخرة، وعفن

الساق الأسود، والفيوزاريوم، والرايزوكتونيا.

٢. الحشرات: فراشة درنات البطاطا، والمن، والترس، وحفّار ساق الباذنجان.

➤ النضج والجني: يتميز محصول البطاطا بأنه يكون داخل التربة؛ لذا يجب تحديد موعد

٢١٠



## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة الفلفل.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالفلفل.
- يوضح الطرق الملائمة لزراعة نبات الفلفل.
- يحدد مسافات الزراعة المناسبة لنبات الفلفل.
- يحدد مواعيد زراعة الفلفل في ضوء احتياجاته المناخية.
- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاج الفلفل.
- يذكر أهم أصناف الفلفل الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب الفلفل.
- يصف علامات نضج الفلفل لتحديد موعد جنيه.

## المفاهيم والمصطلحات

الترقيع، الحف، العزق، الري.

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر / الأسئلة والأجوبة

- التمهيد للدرس وتوظيف خبرات الطلبة السابقة بطرح الأسئلة الآتية:
  - ما العنصر الغذائي المهم في الفلفل؟ ما الاسم العلمي للفلفل؟ ما العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج الفلفل؟ ما التربة الملائمة لزراعة الفلفل؟ هل تختلف مواعيد زراعته من منطقة إلى أخرى؟ كيف يمكن تحديد مسافات زراعته؟ وضح طريقة زراعة الفلفل؟
  - تكليف الطلبة البحث عن أثر ارتفاع درجات الحرارة في الفلفل ( قضية بحث).
  - مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.
- التعلم التعاوني / العمل الجماعي
  - التمهيد للحصة: ينفذ المعلم جلسة مناقشة عمليات الخدمة، ثم يقسم الطلبة إلى مجموعات عمل، ويكلفها ما يأتي:
    - المجموعة الأولى: توضيح مفهومي الترقيع والعزق ومفهوم تدعيم سيقان الفلفل وفوائده.
    - المجموعة الثانية: تصميم برنامج للري وتسميد الفلفل.
    - المجموعة الثالثة: عرض أهم الأصناف التي تزرع في الأردن، وأكثر الآفات التي تهاجم الفلفل.
    - المجموعة الرابعة: شرح علامات النضج وكيفية معرفة نضج الفلفل.
  - يعرض مقرر والمجموعات المهام التي كلفوا تنفيذها، ثم يناقشها المعلم مع المجموعات الأخرى ويصوبها ويدون الإجابات الصحيحة على السبورة.

## الفلفل Pepper

الاسم العلمي: *(Capsicum frutescens)* الفلفل الحار

(*Capsicum annuum*) الفلفل الحلو

تستعمل ثمار الفلفل مقبلات، طازجة، أو مخللة، أو في صناعة الشطة، وتدخل في الطهي بوصفها عنصراً أساسياً ضمن بعض الوصفات؛ لاحتوائها على عناصر غذائية عالية، مثل فيتامين ج (C). ويزرع الفلفل في الأردن في المناطق جميعها، وقد بلغت المساحة المزروعة به لعام ٢٠٠٩ م (١٩) ألف دونم أنتجت ٤٤ ألف طن.

المناخ: الفلفل نبات صيفي يحتاج إلى موسم نمو طويل ودافئ، ويتأثر بالعوامل المناخية الآتية:

١. الحرارة: تجود زراعة الفلفل في درجة حرارة تتراوح بين ٢٠ - ٣٥ م°، وفي مراحل حياته الأولى يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة؛ ليكون مجموعاً خضرياً كبيراً، وإلى حرارة معتدلة في النصف الثاني من حياته؛ لتكوين الأزهار ونمو الثمار. والفلفل الحار يتحمل ارتفاع الحرارة أكثر من الأصناف الحلوة.

## قضية للبحث

ابحث عن أثر ارتفاع الحرارة أو انخفاضها عن المعدل في الفلفل باستخدام المصادر المعرفية المتاحة: (كتب، أو شبكة الإنترنت،...)، ثم اعرض ما توصل إليه من معلومات، وناقشه مع زملائك.

٢. الضوء: الفلفل من النباتات المحايدة للضوء، إذ يقل عدد الأزهار بزيادة مدة الإضاءة.

٣. الرطوبة الجوية: يحتاج الفلفل إلى جو معتدل الرطوبة من (٥٠ - ٦٠ ٪)، ويتضرر بالجفاف، لأنه يؤدي إلى تساقط الأزهار والثمار.

التربة: تفضل زراعة الفلفل في التربة المتوسطة والثقيلة، على أن تكون عميقة، وغنية بالعناصر الغذائية، وجيدة الصرف والتهوية، وذات رقم حموضة pH يتراوح بين (٦,٥ - ٧). ومن مساويء نبات الفلفل أن جذوره تتخفق بسهولة، وينصح باتباع دورة زراعة رباعية كباقي محاصيل الفصيلة الباذنجانية.

٢١٢

والأصفر، والأخضر): ومن الأصناف التي تزرع في الأردن:

١. أصناف الفلفل الحلو: ريدا، وسونستا أمبروف، وكاليفورنيا ونذر.
٢. أصناف الفلفل الحار: سافران، وسيكبي، وسيف، وسلافه، وفرات، وقرن الغزال (صنف بلدي).



الشكل (٢-٥): فلفل حلو.



الشكل (٢-٤): فلفل حار.

الآفات: يصاب الفلفل بكثير من الآفات، مثل:

١. الأمراض: البياض الزغبي، والبياض الدقيقي، والفحات، وعفن الطرف الزهري.
٢. الحشرات: المنّ كما في الشكل (٢-٦) والذبابة البيضاء، كما في الشكل (٢-٧)، وحفّار ساق الباذنجان، والدودة القارضة.



الشكل (٢-٧): حشرة الذبابة البيضاء.



الشكل (٢-٦): حشرة المنّ.

٢١٤

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن الفصيلة الباذنجانية، وعرض نتائج عملهم ومناقشتها.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: الملاحظة
- أداة التقويم: قائمة رصد (٢ – ٤)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

– محمود القصراري، فؤاد قواسمة، الزراعة المحمية، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.

### للطالب

– محمود القصراري، الحضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

مواعيد الزراعة: كما في الباذنجان

- طرق الزراعة وكمية التقاوي: يلزم لزراعة دونم من أشغال الفلفل كمّية من البذور تتراوح بين ٧٥ - ١٢٥ غم، وعموماً تتشابه زراعة الفلفل والباذنجان، وفي الزراعة المحمية يزرع الفلفل على مصاطب عرضها من ٨٠ - ٩٠ سم، وبين الأشغال ٣٠ سم.
- عمليات الخدمة بعد الزراعة: يحتاج الفلفل إلى عمليات الخدمة الآتية:
  - الترقيع: يجرى للجزور الغائبة بعد أسبوع من الزراعة بوجود الماء.
  - العزق: تجرى هذه العملية منذ بداية المراحل الأولى لنمو الأعشاب بإزالتها كلياً ظهرت، ويكون العزق سطحيّاً؛ حتى لا تتقطع الجذور، ويراعى تدعيم سيقان الفلفل بالتراب خوفاً من تكسرها في أثناء عملية العزق.
  - الريّ: تروى الأشغال بعد يومين من الزراعة، ثم ينظم الريّ كما يأتي:
    - بداية حياة النبات: يكون الريّ معتدلاً؛ لتمكين الجذور من التعمق والانتشار.
    - مرحلة النمو الخضري: تزداد حاجة الفلفل إلى الماء لتكوين مجموع خضري جيّد وقوي؛ ولزيادة مساحة سطح الورقة.

### فكر

يحتاج الفلفل إلى زيادة كمّية الماء في مرحلة النمو الخضري؛ ممّا يزيد من مساحة سطح الورقة؛ ويساعد على أن يكوّن مجموعاً خضريّاً جيّداً، فسر الفائدة من ذلك؟

- ج. مرحلة بداية الإزهار: يقلل الريّ في هذه المرحلة، ولكن لا يحسن تعطيش النبات؛ لأنّ زيادته أو نقصانه يؤدّيان إلى تساقط الأزهار.
- د. مرحلة عقد الثمار: تروى النباتات ريثاً خفيفاً ومتقارباً؛ للمحافظة على جودة الثمار، ويجب المحافظة على رطوبة عالية في التربة في حالة ارتفاع درجات الحرارة عن ٣٥ س°.
- وعموماً يعدّ استخدام طريقة الريّ بالتنقيط لمحاصيل الفصيلة الباذنجانية جميعها مفيداً؛ لأنه يعطي محصولاً أكثر، وثماراً عالية الجودة، مقارنة بطرق الريّ الأخرى.
- ٤. التسميد: كما في البندورة.
- الأصناف: تختلف أصناف الفلفل في شكلها، وحجمها، ولونها (الأحمر، والأبيض،

٢١٣

٣. الحلم الأحمر

٤. الديدان الثعبانية (النيماتودا)

- النضج والجني: تقطف ثمار الفلفل حسب الغرض من استعمالها، فتقطف قبل نضجها وهي خضراء، عندما يكتمل حجمها، وتصبح قشرتها لامعة، للاستهلاك طازجة، أو التخليل، أو الطهي، وتقطف أيضاً عند تمام النضج عندما يصبح لونها حسب لون الصنف المزروع (أصفر، أحمر، أبيض، أخضر). ويبدأ بجمع المحصول بعد ٥٠ - ٦٠ يوماً من الزراعة، ويبلغ إنتاج الدونم في الزراعة المحميّة طناً إلى خمسة أطنان.

### التقويم

- وضّح فوائد إجراء العمليات الزراعية الآتية:
  - عملية التحضين في البندورة.
  - العزق في البطاطا.
  - التسليق في البندورة.
- صمّم برنامجاً لريّ نباتات الفلفل منذ بدء الزراعة حتى النضج.
- علّل ما يأتي:
  - يجب الحذر عند عزق نباتات الفلفل.
  - ظهور الطعم المرّ في ثمار الباذنجان.
  - قطف ثمار الباذنجان قبل تمام النضج.
  - تميز البندورة بأن لها ثلاثة أطوار للنضج، عدّها.
  - وضّح علامات نضج درنات البطاطا.
  - صمّم برنامجاً لتسميد نباتات البطاطا.
  - احسب عدد الأشغال اللازمة لزراعة ٥ دونمات من البندورة، إذا علمت أن مسافة الزراعة بين الأتلام متر واحد، وبين الأشغال ٥٠ سم؟

٢١٥

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر صفحة (١٩٩)

– تزرع داخل البيوت المحمية.

فكر صفحة (٢٠١)

– حتى لا يكون هناك تفاوت بين النباتات داخل الحقل، وليكون موعد الجني متماثلاً.



## النتائج الخاصة

– يصف نباتات الفصيلة الباذنجانية نباتياً.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

● استخدام الأدوات بصورة صحيحة وأمنة.

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- تقسيم الطلبة إلى ست مجموعات، وتكليفها ما يأتي:
- المجموعة الأولى: تتفحص الأوراق وتدوّن الملاحظات.
  - المجموعة الثانية: تتفحص سيقان النباتات وتدوّن الملاحظات.
  - المجموعة الثالثة: تتفحص الأزهار وتدوّن الملاحظات.
  - المجموعة الرابعة: تتفحص الثمار وتدوّن الملاحظات.
  - المجموعة الخامسة: تتفحص البذور وتدوّن الملاحظات.
  - المجموعة السادسة: تتفحص الجذور وتدوّن الملاحظات.
- تدوير عمل المجموعات وتنظيم النتائج وعرضها ومناقشتها بإشراف المعلم.

الوصف النباتي للفصيلة الباذنجانية

التمرين  
(١-٢)

النتائج

يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادراً على أن:  
– تصف نباتات الفصيلة الباذنجانية نباتياً

المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

● سكين. ● مقص تقليم. ● عدسة مكبرة. ● مرشوكي. ● نبات بندورة وباذنجان وبطاطا وفلفل.

الرسوم التوضيحية

خطوات العمل والنقاط الحاکمة

## أولاً: الأوراق

- تفحص الأوراق من حيث:
- ١- نوعها (بسيطة أو مركبة).
  - ٢- نظام ترتيبها على الساق.
  - ٣- شكلها، أو شكل وريقاتها.
  - ٤- ملمسها.

## ثانياً: الساق

تفحص السيقان، من حيث:

- ١- طبيعة النمو.
- ٢- درجة تفرعها، وطبيعة العقد والسلاميات.
- ٣- وجود النورات.
- ٤- تحوراتها.

## ثالثاً: الأزهار

تفحص الأزهار من حيث:

- ١- جنسها.
- ٢- وجودها.
- ٣- لونها.



٢١٦

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الفروق الفردية

علاج

إثراء

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم : الملاحظة
- أداة التقويم : قائمة رصد ( ٢ - ٥ )

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

للمعلم

- محمود القصرأوي، فؤاد قواسمة، الزراعة المحمية، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.

للطالب

- محمود القصرأوي، الخضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.



- رابعًا: الثمار
- تفحص الثمار من حيث :
- ١- نوعها.
  - ٢- لونها.
  - ٣- وجود الكأس بعد القطف.
- خامسًا: البذور
- تفحص البذور من حيث :
- ١- شكلها.
  - ٢- لونها.
  - ٣- ملمسها.
- سادسًا: الجذور
- تفحص الجذور من حيث :
- ١- نوعها.
  - ٢- شكلها، ومدى انتشارها.

### التقويم

- ١ - قارن بين أوراق الفصيلة الباذنجانية من حيث :
  - أ - نوعها (بسيطة أو مركبة).
  - ب- ترتيبها على الساق.
  - ج- شكلها، أو شكل وريقاتها.
  - د - ملمسها.
- ٢ - بين موضع الأزهار في البندورة المحدودة وغير المحدودة النمو.

### أخطاء شائعة

## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة الكوسا.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالكوسا.
- يوضح الطرق الملائمة لزراعة نباتات الكوسا.
- يحدد مسافات الزراعة المناسبة لنباتات الكوسا.
- يحدد مواعيد زراعة الكوسا في ضوء احتياجاتها المناخية.
- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاج الكوسا.
- يذكر أهم أصناف الكوسا الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب الكوسا.
- يصف علامات نضج الكوسا لتحديد موعد جنيها.

## المفاهيم والمصطلحات

نبات وحيد الجنس

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر / اسئلة وأجوبة

- التمهيد للحصة بتنفيذ المعلم جلسة مناقشة نبات الكوسا، ثم يطرح الأسئلة الآتية :
- ما القيمة الغذائية لنبات الكوسا؟ ما المقصود بنبات وحيد الجنس والمسكن؟ ما العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج الكوسا؟ ما التربة الملائمة لزراعة الكوسا؟ هل تزرع الكوسا في معظم أشهر السنة؟ اقترح مسافات زراعة مناسبة للكوسا؟ وضح طريقة زراعة الكوسا. لماذا تجرى عملية ترقيع الكوسا بعد أسبوع من زراعتها؟ ما فوائد عملية العزق؟ علام تعتمد عملية ري الكوسا؟ صمّم برنامجاً لتسميد الكوسا.
- إعطاء فرصة لكل شخص للتفكير .

- مناقشة داخل المجموعة الواحدة للتوصل إلى الإجابة الصحيحة، وتدوينها على السبورة .
- مناقشة جماعية يديرها المعلم للتوصل إلى الإجابات الصحيحة .
- تكليف الطلبة البحث عن أسماء الحشرات الناقلة للأمراض الفيروسية ( قضية بحث ).
- مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة .

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل، وتكليفها ما يأتي :
- المجموعة الأولى: تعرض أهم الأصناف التي تزرع في الأردن وأكثر الآفات التي تهاجمها.
- المجموعة الثانية: تشرح علامات نضج الكوسا، وتبين كيفية الاستدلال عليها.
- يعرض مقرررو المجموعات المهام التي كلفوا تنفيذها.
- تدوين عمل المجموعات وعرض نتائج عملها بإشراف المعلم.

## الملاحق

ملحق أدوات التقويم (٢-٦).

ستناول في هذه الفصيلة محاصيل الخضراوات الآتية: الكوسا، والخيار، والبطيخ، وتضم هذه الفصيلة نحو ٩٦ جنساً، و ٧٥٠ نوعاً، ينتشر أكثرها في المناطق الدافئة. ونباتات هذه الفصيلة لا تقاوم الصقيع، وتتميز بأنها نباتات حولية، وتزرع؛ للاستفادة من ثمارها، ويتبع لها أيضاً نبات الشمام، والفقوس (الفناء)، والقرع.

## ١ الكوسا (Summer Squash)

الاسم العلمي: (*Cucurbita pepo*)

هو من الخضراوات الواسعة الانتشار مع أن قيمتها الغذائية منخفضة، ولكنها غنية بفيتامينات أ (A)، ب (B) و ج (C). ونبات الكوسا وحيد الجنس، ووحيد المسكن، وتلقيحه خلطي بواسطة الحشرات، وبخاصة النحل؛ مما يزيد من الإنتاج، وتستعمل ثمارها في الغذاء، وهي من نوع اللبنة (Pepo). وتزرع في الأردن في المناطق جميعها، وقد بلغت المساحة المزروعة بها لعام ٢٠٠٩ في الأردن (٣٢ ألف دونم) أنتجت ٧٦ ألف طن.

## هل تعلم؟

نبات الكوسا وحيد الجنس والمسكن، أي أنه يحمل أزهاراً مذكرة، وأزهاراً مؤنثة على النبات نفسه.

- ① المناخ: الكوسا من المحاصيل الصيفية، وأنسب درجات حرارة ملائمة لنبات البذور ونمو النبات هي ما بين ٢١ - ٣٥ س°، وإذا انخفضت درجة الحرارة عن ١٥ س° فإن بذورها لا تنبت، ويتوقف نموها.
- ② التربة: تنجح زراعة الكوسا في التربة الغنية الخصبة الجيدة الصرف الخالية من الأملاح، وأنسب درجة حموضة (pH) هي التي تتراوح بين ٦.٥ - ٧.٥.
- ③ مواعيد الزراعة: يمكن زراعة الكوسا في أشهر السنة جميعها، ما عدا الأشهر التي تنخفض فيها درجات الحرارة كثيراً، وفي ما يأتي مواعيد الزراعة الملائمة في كل منطقة :

٢١٨

## ④ عمليات الخدمة بعد الزراعة: تحتاج الكوسا إلى عمليات الخدمة الآتية :

١. الترقيع: تجرى هذه العملية بعد أسبوع من الزراعة، إذ تعاد زراعة الجور الغائبة بالبذور بوجود الماء.
٢. الحف: بما أن الكوسا تزرع بالبذور مباشرة، فهي تحتاج إلى عملية الحف، بإبقاء نبات واحد عندما يبدأ النبات بتكوين الورقة الحقيقية الرابعة، ويجب ريها مباشرة بعد الحف.
٣. العزق: تجرى عملية العزق في حالة الزراعة في أتلام؛ للتخلص من الأعشاب؛ ولتكوين التراب حول الساق؛ لتغطية الجذور، ولتفكيك التربة. ويكون العزق سطحياً، أما عند استعمال المثلش فتزال الأعشاب باليد.
٤. الري: تعتمد كميات الري وأوقاته على درجة حرارة الجو ونوع التربة.

## فكر

يعتمد الري في الكوسا على درجة الحرارة ونوع التربة، بين متى تزداد الحاجة إلى الماء؟ ومتى تقل حسب نوع التربة؟

٥. التسميد: تحتاج الكوسا إلى طنّين من السماد البلدي المختمر للدونم، تضاف عند إعداد الأرض للزراعة، ويلزم كذلك إضافة أسمدة كيميائية في الزراعة المروية للدونم على النحو الآتي :
  - أ. (١١) كغم نيتروجين (N).
  - ب. (٤) كغم فسفور (P).
  - ج. (٩) كغم بوتاسيوم (K).
- تضاف نصف الكمية عند زراعة البذور، والنصف الآخر عند ظهور الورقة الحقيقية الرابعة إلى السادسة، وذلك مع مياه الري، عند استخدام نظام الري بالتنقيط.
- ⑤ الأصناف: هناك أصناف متعدّدة ومعظمها هجينة، منها: بالينا ف ١، و نادين ف ١، وأحلام، وإسكندر، ويوجد أصناف محلية هي البلدي، والبيروتي.
- ⑥ الآفات: تصاب الكوسا بالآفات الآتية :
  ١. الحشرات: المنّ، والذبابة البيضاء.

٢٢٠

### مراعاة الضروك الفردية

#### علاج

– تكليف بعض الطلبة كتابة تقرير عن طرق مكافحة الذبابة البيضاء، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

#### إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن أنواع الأزهار في الخضراوات، ومقارنتها بالفصيلة القرعية، ثم عرض نتائج العمل ومناقشتها.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: الملاحظة
- أداة التقويم: قائمة رصد (٢-٦)

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

#### مصادر التعلم

#### للمعلم

– محمود القصراوي، فؤاد قواسمة، الزراعة المحمية، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.

#### للطالب

– محمود القصراوي، الخضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

المنطقة	موعد الزراعة
المرتفعات والبادية	٨/١٥ - ٣/١٥
الشفاغورية	٩/١ - ٢/١٥
الأغوار	٢/١ - ١٢/١، ١٠/١٥ - ٩/١

ويمكن التبكير في موعد الزراعة عن طريق الزراعة تحت الأنفاق البلاستيكية. طرق الزراعة وكمية التقاوي: تزرع البذور مباشرة في أتلام، أو في مصاطب عرضها من (٨٠-٩٠) سم، والمسافة بين النباتات ٤٠ سم، وتغطي بالملش الأسود بوجود الري بالتنقيط، وتغطي هذه المصاطب بقماش أو شاش أبيض بعد زراعة البذور، فيها لحماية النباتات بعد الإنبات من الإصابة بالحشرات الناقلة للأمراض الفيروسية، وبزال هذا القماش عند البدء بجني المحصول كما في الشكل (٢-٨). ويحتاج الدوتم إلى ما يقرب من ٢٥٠ - ٤٠٠ غم من البذور.



الشكل (٢-٨): قماش الشاش الأبيض لتغطية الكوسا.

#### قضية للبحث

ابحث في أسماء الحشرات الناقلة للأمراض الفيروسية إلى الكوسا، والأضرار التي تسببها هذه الأمراض، باستخدام المصادر المعرفية المتاحة: (كتب، أو شبكة الإنترنت، ٠٠٠)، ثم اعرض ما تتوصل إليه من معلومات، وناقشه مع زملائك.

٢١٩

٢. الأمراض: البياض الدقيقي، والزرغبي، وأمراض الذبول.

٣. العناكب.

النضج والجني: يبدأ جني ثمار الكوسا بعد أربعين يوماً من الزراعة، بواسطة اليد، وباستخدام مقص التقليم، عندما تصل إلى الحجم المناسب، وهو من ٨ - ١٢ سم، وعندما يصبح السطح الخارجي للثمار لامعاً، وقبل أن يسقط تويج الزهرة من الثمرة، كما في الشكل (٢-٩). ويجب عدم تأخير موعد الجني، حتى لا يؤخر ذلك نمو النبات، ويقلل من كمية المحصول، وينتج الدوتم من ٢ - ٤ أطنان.



الشكل (٢-٩): ثمار الكوسا.

٢٢١

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر صفحة (١٩٩)

– تزرع داخل البيوت المحمية.

فكر صفحة (٢٠١)

– حتى لا يكون هناك تفاوت بين النباتات داخل الحقل، وليكون موعد الجني متماثلاً.

## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة الخيار.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالخيار.
- يوضح طرق الزراعة الملائمة لنبات الخيار.
- يحدد مسافات الزراعة المناسبة لنبات الخيار.
- يحدد مواعيد زراعة الخيار في ضوء احتياجاته المناخية.
- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاج نبات الخيار.

## المفاهيم والمصطلحات

التربية، التقليم، التهوية

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التعلم التعاوني / المناقشة

- التمهيد للحصة: ينفذ المعلم جلسة لمناقشة نبات الخيار، ثم يطرح الأسئلة الآتية:
- ما الاسم العلمي للخيار؟ ما العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج الخيار؟
- هل تؤثر نوعية التربة في إنتاج الخيار؟ اقترح المسافات الزراعية المناسبة للخيار.
- وضح طريقة زراعة الخيار في الزراعة المكشوفة والزراعة المحمية.
- هل تختلف عمليات الخدمة بين الزراعة المكشوفة والزراعة المحمية؟
- إعطاء فرصة لكل شخص للتفكير.
- مناقشة جماعية يديرها المعلم للتوصل إلى الإجابات الصحيحة وتدوينها على السبورة.

التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتكليفها ما يأتي:
- المجموعة الأولى: توضح المناخ الملائم لزراعة الخيار.
- المجموعة الثانية: تبين التربة الملائمة لمحصول الخيار.
- المجموعة الثالثة: تبين مواعيد الزراعة الملائمة لمحصول الخيار.
- يعرض مقرر والمجموعات نتائج المهام التي كلفوا تنفيذها.
- مناقشة داخل المجموعة الواحدة للتوصل إلى الإجابة الصحيحة، وتدوينها على السبورة.

## الخيار Cucumber

الاسم العلمي: (*Cucumis sativus*)

يزرع الخيار على نحو واسع، وترجع أهمية زراعته إلى المدة القصيرة التي يعطي فيها إنتاجاً وافراً لاستعمالاته العديدة، طازجاً للأكل، أو في السلطات، أو المخللات. وبلغت المساحة المزروعة به في الأردن لعام ٢٠٠٩ م قرابة (٢٠ ألف) دونم أنتجت ١٩٤ ألف طن.

① المناخ: الخيار محصول صيفي يتأثر بالعوامل المناخية الآتية:

١. الحرارة: تنبت بذور الخيار في درجات حرارة تتراوح بين ١٦ - ٣٥ س°، أما بالنسبة إلى نمو النبات فأفضل درجات حرارة هي ١٨ س° ليلاً، و٢٤ س° نهاراً، ويموت النبات إذا تعرض للصقيع.
٢. الرطوبة الجوية: يفضّل ألا تزيد الرطوبة النسبية على ٨٥٪، والخيار يناسبه الجو الجاف.

فكر ما أضرار ارتفاع الرطوبة الجوية عن ٨٥٪ على الخيار؟

② التربة: تنجح زراعة الخيار في مدى واسع من الأراضي من الرملية إلى الثقيلة، على أن تكون خصبة جيدة الصرف والتهوية، وأفضل درجة حموضة (pH) هي التي تتراوح بين ٥,٥ - ٦,٧. ويزرع الخيار في الأراضي الخفيفة؛ للحصول على إنتاج مبكر، ويزرع في الأراضي الطينية الثقيلة للحصول على إنتاج وافر.

فكر لماذا تعطي زراعة الخيار في التربة الطينية الثقيلة محصولاً وافراً؟

③ مواعيد الزراعة: يزرع الخيار زراعة مكشوفة ومحمية في المناطق المختلفة كما يأتي:

المنطقة	الزراعة المكشوفة	الزراعة المحمية
المرتفعات والبادية	٤/١ - ٨/١٥	٣/١٥ - ٨/١
الشفاعورية	٢/١٥ - ٣/١٥	٨/١٥ - ٢/١٥
الأغوار	٩/١ - ١٠/١	١/١٥ - ١٠/١٥

④ طرق الزراعة وكمية التقاوي: تختلف طريقة الزراعة المكشوفة عن الزراعة المحمية،

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر صفحة (٢٢٢).

- انتشار الأمراض الفطرية .

فكر صفحة (٢٢٢)

- بسبب وجود العناصر الغذائية واحتفاظها بالماء أكثر من التربة الأخرى.



### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

– تكليف بعض الطلبة كتابة تقرير عن العوامل المناخية التي تؤثر في نمو الخيار، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

#### إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن الطرق الحديثة لزراعة الخيار، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: الملاحظة
- أداة التقويم: قائمة رصد (٢-٧)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

– محمود القصرأوي، فؤاد قواسمة، الزراعة المحمية، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.

#### للطالب

– محمود القصرأوي، الخضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

وستتناول كل طريقة وعمليات الخدمة لها، كل على حدة:


١. الزراعة المكشوفة: يزرع الخيار بذورًا، أو أشتالًا على مصاطب، عرضها متر واحد، على أن تكون المسافة بين المصاطب مترًا واحدًا، وبين النباتات ٤٠ سم، ويستخدم الملس بوجود الري بالتنقيط، ويحتاج الدونم إلى ما يقرب من ٢٠٠ - ٢٥٠ غم من البذور، وتحتاج زراعة الخيار المكشوفة إلى عمليات الخدمة الآتية:

أ. الترقيع والخف والعرق: تجرى هذه العمليات كما في أي محصول آخر، إذ يبدأ الترقيع بعد أسبوع من زراعة الجور الغائبة، والخف بترك نبات واحد في الحفرة في حالة الزراعة بالبذور بعد ظهور الورقة الحقيقية الثانية، وتروى مباشرة بعد الخف، أما العرق فيقتصر على إزالة الأعشاب فقط في فتحات الزراعة في الملس.

ب. الري والتسميد: يجب توفير الرطوبة المناسبة باستمرار في أثناء موسم النمو، وخاصة خلال مدة الإزهار؛ لأنَّ النقص في الرطوبة الأرضية في هذه المدة يؤدي إلى نقص كمية الإنتاج. والخيار محصول يستجيب للسماد النيتروجيني؛ ويضاف طنًا من السماد البلدي المختمر عند تجهيز الأرض للزراعة، أما الأسمدة الكيميائية فينصح بإضافة ٧ كغم نيتروجين N، و ١٠ كغم فسفور P، و ٧ كغم بوتاسيوم K، على دفعات، في بداية الإنبات، وبعد الخف، وعند عقد الثمار، وذلك بإذابتها في مياه الري.

٥ الزراعة المحمية (البيوت البلاستيكية): يزرع الخيار في البيوت المحمية بعد حرث الأرض وإضافة السماد البلدي المختمر إليها، وبعد تنعيمها، وتعقيم التربة؛ للتخلص من آفاتنا بإحدى طرق التعقيم التي درستها في كتاب الإنتاج النباتي / المستوى الثاني، كما في الشكل (٢-١٠).

٢٢٣



الشكل (٢-١٠): التعقيم الشمسي للبيوت المحمية.

وبعد الانتهاء من التعقيم يقسم البيت البلاستيكي إلى خمس مصاطب، عرض كل منها (٨٠ - ١٠٠) سم، وتمد عليها أنابيب الري بالتنقيط، ثم تغطى المصاطب بالملس، وتفتح جور الزراعة في الملس، ويزرع صفان في كل مصطبة، وتكون المسافة بين فتحات الزراعة من (٣٠ - ٤٠) سم، وتروى المصاطب قبل الزراعة بيومين، ثم تزرع الأشتال بوجود الماء، ويحتاج الدونم من البيوت المحمية إلى ٣٠٠٠ شتلة تقريبًا من الخيار.

ويحتاج الخيار في هذا النوع من الزراعة إلى عمليات الخدمة الآتية:

١. الترقيع والخف والعرق: تعاد الزراعة بالأشتال أو بالبذور بعد أسبوع من الزراعة بوجود الماء إذا لم تنبت الأشتال المزروعة، ولا تجرى عملية الخف للخيار؛ لأنه لا يزرع في الحفرة إلا بذرة أو شتلة واحدة؛ بسبب ارتفاع سعر البذور. أما عملية العرق فهي محددة بإزالة الأعشاب من جوانب البيت؛ بسبب وجود الملس.
٢. الري والتسميد: تروى المصاطب رية غزيرة بعد الزراعة مباشرة إلى درجة التشبع الكامل، وترك بعد ذلك مدة ٢ - ٣ أسابيع من دون ري؛ لتلأ تدبيل، ولضمان تعمق الجذور؛ وتقليل المسافات (السلامية) بين العقد في ساق الخيار، والحصول على نباتات قوية تنتج محصولًا وافرًا، ثم ينظّم الري حسب الظروف الجوية. أما بالنسبة إلى التسميد فتزداد كمية الأسمدة الكيميائية في البيوت المحمية على الكمية في الزراعة المكشوفة، فضلًا عن إضافة السماد البلدي المختمر.

٢٢٤

## النتائج الخاصة

- يذكر أهم أصناف نبات الخيار الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب نبات الخيار.
- يصف علامات نضج الخيار لتحديد موعد جنيه.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- تقسيم الطلبة إلى ست مجموعات، وتكليفها ما يأتي:
- المجموعة الأولى: تعرض أهم أصناف محصول الخيار التي تزرع في الأردن وأبرز الآفات التي تهاجمه.
- المجموعة الثانية: تشرح علامات النضج، وتبين كيفية الاستدلال عليها.
- المجموعة الثالثة: تبين مفهوم تربية للخيار وأهميتها.
- المجموعة الرابعة: تبين مفهوم التقليم وكيفية إجرائه.
- المجموعة الخامسة: تدرس أهمية التهوية للبيوت البلاستيكية المزروعة بالخيار؟ وكيفية تنفيذ عملية التهوية.
- المجموعة السادسة: تدرس عمليتي نضج ثمار نبات الخيار وجنيها من حيث (مواعيدها، ومواصفات الثمرة، وقطفها) وكميات الإنتاج المتوقعة/دونم في الزراعة المكشوفة والمحمية.
- يعرض مقرر والمجموعات المهام التي كلفوا تنفيذها.
- تدوير عمل المجموعات وتبادل المهام بينها، ثم عرض النتائج ومناقشتها مع المجموعات الأخرى بإشراف المعلم وتصويبها وتدوين الإجابة الصحيحة على السبورة.

وتستخدم الأسمدة المركبة السريعة الذوبان في الماء مع مياه الري بمعدل ٢ كغم لكل بيت، كل ١٠ أيام، وتضاعف الكمية مع بدء جني المحصول.

٣. التربية والتقليم: تربي نباتات الخيار المزروعة في البيوت المحمية رأسياً على خيوط تمتد من سطح الأرض إلى الأسلاك الأفقية التي توجد أعلى خطوط الزراعة، وتربط هذه الخيوط من أسفل بخيط آخر أفقي يوجد على سطح التربة بامتداد خطوط الزراعة، وتوجه النباتات رأسياً على هذه الخيوط من وقت زراعتها حتى نهاية الموسم، كما في الشكل (٢-١١).



الشكل (٢-١١): تربية الخيار وتسليقه في البيوت البلاستيكية.

ويقلّم نبات الخيار بهدف تحقيق توازن بين النمو الخضري والنمو الثمري، للحصول على إنتاج وافر، ولتحسين التهوية بين النباتات، وتسهيل الحركة والحركة اللازمة، كمقاومة الآفات، والجني. ويُجرى التقليم بإزالة الفروع الجانبية جميعها، أو بعضها.

## فكر

لماذا يجب عدم التأخر في إجراء عملية تربية نبات الخيار وتقليمه في البيوت البلاستيكية؟

٤. التهوية: يعدّ نبات الخيار من أكثر النباتات تأثراً بزيادة الرطوبة الجوية في البيوت المحمية، ولذلك تجب تهوية البيوت بمتابعة الري، وإزالة الفروع الجانبية السفلية القريبة من الأرض، وفتح منافذ بين الشرائح البلاستيكية لزيادة التهوية.

٢٢٥

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر صفحة (٢٢٥)

- لكي يسلق بسهولة ولا ينكسر.

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن الفصيلة القرعية، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: الملاحظة
- أداة التقويم: قائمة رصد (٢-٧)

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

#### مصادر التعلم

للمعلم

للطالب

#### قضية للبحث

ابحث عن أهمية تهوية البيوت البلاستيكية المزروعة بالخيار، باستخدام المصادر المعرفية المتاحة: (كتب، أو شبكة الإنترنت،....)، ثم اعرض ما تتوصل إليه، وناقشه مع زملائك.

#### الأصناف: هناك أصناف متعددة منها:

١. الزراعة المكشوفة: بيتا ألفا، وكاترينا، وداما، ونورا.
٢. الزراعة المحمية: تمتاز الأصناف المزروعة في البيوت المحمية بأنها تحمل أزهاراً أنثوية فقط، ولا تحتاج إلى تلقيح، أي أنها تعقد بكرئاً، وهي أصناف هجينة ذات إنتاج عالٍ. ويعتمد السوق الأردني على استيراد هذه البذور باستمرار، ومن هذه البذور: حاتم، وبركة، وقنديل.
٣. الآفات: يجب مكافحة الآفات سريعاً من غير تأخير؛ حتى لا تؤدي إلى تلف المحصول جميعه، وأشهر هذه الآفات:
  ١. الأمراض: كالبياض الدقيقي والزغبي، والعفن البني، وموزايك الخيار، والذبول البكتيري.
  ٢. الحشرات: كالذبابة البيضاء، والمن، والديدان القارضة.
  ٣. العنكبوت الأحمر.
  ٤. اليماتودا.

٣. النضج والجني: يبدأ قطف ثمار الخيار بعد ٤٥ - ٥٥ يوماً من الزراعة عندما يصل طول الثمرة إلى ما يقرب من (١٦ - ١٨) سم، وهي خضراء صلبة بوساطة اليد، عن طريق قصفها من عنقها. ويستمر القطف من شهرين إلى ثلاثة، بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً. ويتراوح إنتاج الدوتم في الزراعة المحمية بين ١٤ - ١٦ طناً، أما في الزراعة المكشوفة فيبلغ طنّين إلى أربعة أطنان.

### أخطاء شائعة

## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة البطيخ.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالبطيخ.
- يوضح طرق الزراعة الملائمة للبطيخ.
- يحدد مسافات الزراعة للبطيخ.
- يحدد مواعيد زراعة البطيخ في ضوء احتياجاته المناخية.

## المفاهيم والمصطلحات

التطعيم

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر / الأسئلة والأجوبة

- التمهيد للدرس بربط التعلم السابق بالتعلم اللاحق، وذلك بطرح الأسئلة الآتية:

- ما الاسم العلمي للبطيخ؟ ما العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج البطيخ؟
  - هل تؤثر نوعية التربة في إنتاج البطيخ؟ اقترح مسافات الزراعة المناسبة للبطيخ.
  - وضح طريقة زراعة البطيخ. ما كمية التقاوي الملائمة لزراعة البطيخ/دونم؟
  - ما المواعيد الملائمة لزراعة البطيخ في الأردن في البيئات المناخية المختلفة؟
- مناقشة إجابات الطلبة، وتدوين الصحيح منها على السبورة.

التعلم عن طريق النشاط/ الزيارة الميدانية

- ينسق المعلم زيارة ميدانية لأحد المشاتل القريبة التي تطعم البطيخ على أصل القرع.

- يشاهد الطلبة عملية التطعيم، وخطوات إجرائها والأدوات المستخدمة في ذلك.

- يستفسر الطلبة من الفنيين عن أهمية كل خطوة من خطوات العملية.

- يوثق الطلبة ذلك في دفتر التدريب العملي.

- يقدم الطلبة في نهاية الزيارة تقريراً علمياً عما شاهدوه، ويناقشون ذلك مع المعلم للتوصل إلى فهم صحيح وموحد للطلبة جميعهم.

## البطيخ Watermelon

الاسم العلمي: (*Citrullus lanatus*)

البطيخ من الخضراوات الصيفية، وهو يعدّ فاكهة الصيف، ثماره حلوة المذاق، وغنية بفيتامينات أ (A)، ب (B) و ج (C). وهو نبات وحيد الجنس، والمسكن، مثل الكوسا، ويحتاج إلى تلقيح خلطي بواسطة الحشرات، وبخاصة النحل. بلغت المساحة المزروعة به لعام ٢٠٠٩م في الأردن ٢٨ ألف دونم أنتجت ١٠٦ آلاف طن.

المناخ: البطيخ مثل بقية خضراوات الفصيلة القرعية حساس للصقيع، يحتاج إلى موسم نمو دافئ، طويل، لا يقل عن أربعة أشهر، لأنه يفضل الجو الحار الجاف، وتراوح درجة حرارة الإنبات بين ٢١ - ٣٥ س°، ولا تنبت البذور عند انخفاض درجة الحرارة عن ١٥ س°، ودرجة الحرارة المثلى لنمو النبات من ٢٥ - ٢٨ س°.

فكر ما أضرار الجو الرطب الحار على البطيخ؟

التربة: تجود زراعة البطيخ في الأراضي المتوسطة القوام الخصبية الجيدة الصريف والتهوية، ويعطي نوعية ممتازة من الثمار في الأراضي الرملية. وأنسب درجة حموضة pH له تتراوح بين ٦ - ٦,٥، ويتحمل البطيخ الزراعة في التربة الحامضية أيضاً. مواعيد الزراعة: يزرع البطيخ في الأردن في المواعيد الآتية:

المنطقة	موعد الزراعة
المرتفعات والبادية	٥ / ١٥ - ٣ / ١٥
الشفافورية	٣ / ١٥ - ٢ / ١٥
الأغوار	٣ / ١ - ٢ / ١٥

ويمكن التكاثر في زراعة البطيخ في الأغوار باستعمال الأنفاق البلاستيكية.

طرق الزراعة وكمية التقاوي: تجهز الأرض جيداً، ويزرع البطيخ في أتلام، أو في مصاطب، وفي حالة الري بالتنقيط تستعمل المصاطب، إذ يبسط الممش الأسود على مصاطب عرضها متر واحد، وتكون المسافة بين المصاطب مترين، وبين النباتات ٨٠ سم.

٢٢٧

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر صفحة (٢٢٧)

- انتشار الأمراض الفطرية.

### مراعاة الضرووق الفردية

#### علاج

- تكليف بعض الطلبة كتابة تقرير عن عملية توجيه البطيخ والفائدة من ذلك، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

#### إثراء

- تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن الطرق الحديثة لتطعيم البطيخ، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم : الملاحظة
- أداة التقويم : السجل القصصي ( ٢ - ٨ )

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- ماجد الزعبي وآخرون، بدائل غاز بروميد المثلث في الأردن، وزارة البيئة، عمان، الأردن، ٢٠٠٧م.

#### للطالب

- محمود القصرأوي، الخضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط ٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

تقنية جديدة: لقد استخدمت تقنية جديدة هي تطعيم البطيخ على أصل القرع في صواني الشتل، وذلك بوصفه بديلاً آمناً للبيئة بدلاً من استخدام مبيدات تعقيم التربة، كغاز بروميد الميثايل. ومن مميزات هذه الطريقة أن النباتات المطعمة تتحمل ممرضات التربة، والجفاف، وملوحة التربة، انظر الشكل (٢-١٢ / أ، ب).



الشكل (٢-١٢/ب): شق علوي في شتلة طعم البطيخ.

الشكل (٢-١٢/أ): شق سفلي في شتلة الأصل القرع.



الشكل (٢-١٣): شتلة بطيخ مطعمة على أصل قرع جاهزة للزراعة.

تزرع بذور البطيخ والقرع في صواني الشتيل حتى تصل الأشتال إلى الحجم المناسب للتطعيم، عندئذ يُعْمَلُ شَقٌّ سفلي في الأصل، وشق علوي في الطعم، كما في الشكل (٢-١٢ / أ، ب) ثم تُضَمُّ الشتلتان بإدخال الشقين بعضهما في بعض، وتثبيتهما بالملقط، كما في الشكل (٢-١٣)، ثم يفصل ساق طعم البطيخ عن جذوره، ويكمل نموه بالاعتماد على جذر الأصل القرع.

ويلزم الدونم الواحد ٥٠-٢٠٠ غم من بذور البطيخ.

### أخطاء شائعة



## النتائج الخاصة

- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاج البطيخ .
- يذكر أهم أصناف البطيخ الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب البطيخ.
- يصف علامات نضج البطيخ لتحديد موعد جنيهه.

## المفاهيم والمصطلحات

تعديل النبات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات عمل، ثم يكلفها ما يأتي:
- المجموعة الأولى: توضح مفهوم الترقيع والخف والعزق.
- المجموعة الثانية: توضح مفهوم تعديل النبات وأهميته.
- المجموعة الثالثة: تشرح فائدة خف الثمار.
- المجموعة الرابعة: تصمّم برنامجاً للري والتسميد.
- المجموعة الخامسة: تعرض أهم الأصناف التي تزرع في الأردن وأكثر الآفات التي تهاجم البطيخ.
- المجموعة السادسة: تبيّن علامات نضج البطيخ، وكيفية الاستدلال على ذلك؟
- يعرض مقرر والمجموعات نتائج المهام التي كلفوا تنفيذها.
- تبادل الأدوار بين المجموعات، وعرض نتائج العمل، ومناقشتها، وتدوين الإجابات الصحيحة على السبورة.

## عمليات الخدمة بعد الزراعة: يحتاج البطيخ إلى عمليات الخدمة الآتية:

١. الترقيع: تجرى عملية الترقيع بالبذور أو الأشتال المحضرة مسبقاً بعد تفقّد الحفر الغائبة بعد أسبوع من الزراعة.
٢. الخف: لا تجرى هذه الحالة عند الزراعة بالأشتال، وتجري عند الزراعة المباشرة بالبذور، وذلك بإبقاء نبات واحد، وقصّ البادرة من دون قلعها من التربة؛ حتى تتخلخل الجذور حول النبات المتبقي، وتجري هذه العملية بعد أسبوعين من الزراعة بوجود الماء.
٣. العزق: تجرى هذه العملية في حالة الزراعة في أتلام، وذلك للتخلص من الأعشاب، وتهوية التربة، ويكون العزق سطحيًا حتى لا تتضرر الجذور. وعند استعمال الملش تجرى عملية تحضين النبات بوضع تراب حول الساق، لثبيث الجذور، كما في الشكل (٢-٤).



الشكل (٢-٤): زراعة البطيخ على المساطب المغطاه بالملش.

٤. تعديل النباتات والحماية من البرودة: يوجه نموّ النبات باتجاه الريح السائدة في المنطقة؛ حتى لا تُقصّ القمم النامية من أثر الرياح. ويمكن التبيكير في زراعة البطيخ في الأغوار، وذلك عن طريق الزراعة بوساطة الأنفاق البلاستيكية؛ لحماية النبات وهو صغير من البرودة.

٢٢٩

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها)  
عن اصناف البطيخ الشائعة محليًا ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

– استراتيجية التقويم : الملاحظة

– أداة التقويم : السجل القصصي ( ٢ - ٨)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

### للطالب

٥. خفّ الثمار وتغطيتها: تجرى عملية خف الثمار بترك ٢-٣ من الثمار على النبات الواحد؛ وذلك للحصول على ثمار جيدة التكوين، كبيرة الحجم، عالية الجودة، وتجري هذه العملية بعد عقد الثمار بأسبوعين. وفي الأغوار والمناطق الصحراوية تغطّى الثمار بعروش؛ لحمايتها من لفحة الشمس.
٦. الريّ: البطيخ من أكثر محاصيل الفصيلة القرعية تمّلاً للعطش؛ بسبب تعمق جذوره، لذلك يروى عند الزراعة، ثمّ يؤخّر، وتطول فترات الريّ حتى الإزهار، ثمّ تتقارب ويكون الريّ خفيفاً ومنتظماً خلال فترة نمو الثمار.

### مهارات البحث والاتصال

ابحث عن أضرار زيادة الريّ وعدم انتظامه، وأثرها في ثمار البطيخ، باستخدام المصادر المعرفية المتاحة (كتب، أو شبكة الإنترنت، ٠٠٠)، ثمّ اعرض ما تتوصل إليه من معلومات عن طريق برمجية العروض التقديمية، وناقشه مع زملائك.

٧. التسميد: يضاف طثان من السماد البلدي المخمر للدونم عند إعداد الأرض للزراعة، أمّا كمّيات الأسمدة الكيميائية اللازمة للزراعة المروية للدونم فهي كما يأتي:  
أ. (٧) كغم نيتروجين، تضاف على ثلاث دفعات بعد الخف، وعند الإزهار، وفي أثناء العقد.  
ب. (٦-٣) كغم فسفور، تضاف مرة واحدة بعد الخف.  
ج. (٦-٤) كغم بوتاسيوم، تضاف على دفعتين بعد الخف، وعند الإزهار.
٨. الأصناف: توجد أصناف متعددة للبطيخ، تختلف في شكلها، ولونها، وحجمها، منها: شاهين، وسمر الجوهرة، وهي أصناف هجينة، ومن الأصناف العادية: كريمسون سويت.
٩. الآفات: يصاب البطيخ بالعديد من الآفات الآتية:  
أ. الأمراض: كالبياض الدقيقي والزغبي، والأنثراكنوز، والذبول.  
ب. الحشرات: كالمّ، والدودة القارضة، وذبابة البطيخ.  
ج. العنكبوت الأحمر.

٢٣٠

١٠. النضج والجنّي: يبدأ نضج البطيخ بعد ٣-٤ أشهر من الزراعة، ويستمر القطف من شهر إلى شهر ونصف، أمّا علامات نضج البطيخ فهي كما يأتي:  
أ. جفاف المحلاق المقابل لعنق الثمرة بعد وصولها إلى الحجم المناسب.  
ب. تغير لون قشرة الثمرة من الجهة الملامسة للأرض من الأبيض إلى الأصفر الفاتح.  
ج. عند الطرق على الثمرة يكون الصوت مكتومًا وغير رنان.  
د. يُسمّع صوت ممزق أنسجة الثمرة عند الضغط عليها براحة اليدين.  
وتقطف الثمار بقطعها من عند المحلاق، ثمّ توضع في صناديق مناسبة وتسوّق.

### التقويم

- ١- بين الاحتياجات البيئية للخيار.
- ٢- صمّم برنامجاً لتسميد نبات الكوسا.
- ٣- صف كيفية إجراء عملية تقليم الخيار وتسليقه.
- ٤- وضح كيف يمكن حماية الكوسا من الإصابة المبكرة بالأمراض الفيروسية.
- ٥- اذكر علامات نضج البطيخ.
- ٦- وضح الفرق بين أزهار الكوسا وأزهار الخيار في الزراعة المحمية.
- ٧- ما تأثير الريّ في حلاوة البطيخ؟
- ٨- ما مميزات أشغال البطيخ المطعمّة على أصل القرع؟
- ٩- علّل ما يأتي:  
أ - يُوقف ريّ الخيار بعد الزراعة مدة ثلاثة أسابيع.  
ب- لا تجرى عملية خف لنبات الخيار.

٢٣١

- يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:
- ترقع الحفر الغائبة.
  - تجري عملية الحف للنبات.
  - تعزق حقل الخضراوات.
  - تسمد الخضراوات.
  - تحضن النبات.
  - تروي النبات.
  - تعدل النبات.
  - تغطي الثمار.
  - تقاوم الآفات.

المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

\* مجارف. \* بذور. \* أشتال خضراوات. \* مكاش. \* أسمدة كيميائية. \* مبيدات مختلفة. \* مضخة رش.

الرسوم التوضيحية	خطوات العمل والنقاط الحاكمة
	<p><b>أولاً: الترقيع</b></p> <p>١- تفقد الحفر الغائبة بعد أسبوع إلى أسبوعين من الزراعة.</p> <p>٢- ازرع الحفر الغائبة بالأشتال المزروعة المتبقية نفسها، أو بالبذور، ثم اروها.</p> <p><b>ثانياً: الحف</b></p> <p>تجري هذه العملية في الكوسا، والبطيخ؛ لأنها تزرع بواسطة البذور، إذ تقص البادرة من دون قلعها، ويُقى على نبات واحد.</p> <p><b>ثالثاً: العزق</b></p> <p>١- اعزق الأتلام كلما دعت الحاجة؛ واحذر من جرح النباتات؛ لتفكيك التربة والتخلص من الأعشاب.</p> <p>٢- كوّم التراب من الريشة المقابلة إلى الريشة المزروعة لتدعيم النبات.</p>

٢٣٣

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## الموضوع

تمرين (٢-٢): عمليات الخدمة للفصيلة القرعية  
تمرين (٣-٢): تسليق الخيار في البيوت المحمية وتقليمه

### النتائج الخاصة

- يطبق عمليات الخدمة اللازمة للفصيلة القرعية.
- يسلق الخيار.
- يقلم الخيار.

### المفاهيم والمصطلحات

### السلامة المهنية

استخدام الأدوات بصورة صحيحة ومأمونة.

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- تقسيم الطلبة إلى ست مجموعات، وتكليفها ما يأتي:
  - المجموعة الأولى: ترقع الحفر الغائبة وتدوّن الملاحظات.
  - المجموعة الثانية: تعزق الحقل وتدوّن الملاحظات.
  - المجموعة الثالثة: تحضن النبات وتدوّن الملاحظات.
  - المجموعة الرابعة: تعدل النبات وتدوّن الملاحظات.
  - المجموعة الخامسة: تروي النبات، وتضيف إليه السماد، وتدوّن الملاحظات.
  - المجموعة السادسة: تقاوم الآفات، وتدوّن الملاحظات.
- تنظيم المجموعات نتائج عملها وعرضه ومناقشته.
- تقويم أداء الطلبة.
- التعلم عن طريق النشاط / التدريب
- تقسيم الطلبة إلى مجموعتين، وتكليفهما ما يأتي:
  - المجموعة الأولى:
    - تثبت الحبال.
    - تربط حبل التسليق بحامل الحبال.
    - تلف ساق الخيار حول الحبال.
  - المجموعة الثانية:
    - تقلم نبات الخيار بمقص التقليم، وذلك بإزالة أول ثلاث براعم جانبية.
    - تتابع لفّ الخيار حول الحبال.
    - تنظيم المجموعات نتائج عملها وعرضه ومناقشته.
- تبادل المجموعات وتعرض النتائج بإشراف المعلم.
- تقويم أداء الطلبة.

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم : مراجعة الذات
- أداة التقويم : سجل وصف سير التعلم ( ٢ - ٩ )
- استراتيجية التقويم : التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم : قائمة رصد ( ٢ - ١٠ )

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- محمود القصرائي، فؤاد قواسمة، الزراعة المحمية، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.

#### للطالب

- محمود القصرائي، الخضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

٣- ارو النباتات مباشرة بعد العرق.

التحصين

كؤم التراب حول ساق الكوسا والبطيخ لثبيث

الجذور، واقلع الأعشاب.

السميد

أ - انثر السماد في بطن التلم، واحذر من ملامسة السماد للنبات، ثم ارو مباشرة.

ب- اذب السماد الكيميائي في السمادة؛ لكي تجري عملية التسميد مع الري عند استخدام الري بالتنقيط.

رش المحصول؛ لتخلص من هذه الآفة.

الري

ارو النباتات المزروعة في أتلام عن طريق إسالة الماء من القناة الفرعية إلى كل تلم، حتى يروي، ثم أغلق التلم، وانتقل إلى الآخر.

وفي الري بالتنقيط أدر المضخة، وافتح المحابس على الأراضي المراد ريتها حسب البرنامج والوقت اللازم لكل محصول.

تعديل النبات

عدّل نبات البطيخ؛ ليكون اتجاهه مع اتجاه الرياح.

تغطية التمار

غطّ تمار البطيخ بعروش البطيخ (المجموع الخضري)

مقاومة الآفات

حدّد نوع الآفة في المحصول، واختر المبيد المناسب، ثم رشّ المحصول؛ لتخلص من هذه الآفة.

٢٣٤

### تسليق الخيار في البيوت المحمية وتقليمه

التمرين  
(٣-٢)

#### النتائج

يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:

- تسليق الخيار داخل البيوت المحمية.

- تقلم الخيار داخل البيوت المحمية.

#### المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

\* خيط تسليق. \* مقص تقليم. \* نبات خيار. \* أوتاد. \* مبيد فطري. \* مضخة رش.

#### الرسوم التوضيحية

#### خطوات العمل والنقاط الحاسمة

١- ثبت حبلًا (خيطًا) من أول المصطبة من الجهتين إلى آخر المصطبة بواسطة أوتاد.

٢- اربط حبل التسليق في حامل الحبال في أعلى البيت، وأنزله على كل نبتة، واربطه بالخيط السفلي الموجود على أطراف المصاطب مراعيًا عدم الشد.

٣- لفّ ساق نبات الخيار على الخيط بهدوء عندما يصبح على النبات خمس أوراق، مراعيًا لفّ الخيط أسفل عقد الأوراق.

٤- ابدأ عملية التقليم باستخدام مقص التقليم، بإزالة أول ثلاثة براعم جانبية تظهر على الساق الرئيسة، وارك الفروع الأخرى على طبيعتها، كما في الشكل (١).

٥- تابع لفّ الساق كلما دعت الحاجة.

٦- رُشّ النباتات بمبيدات فطرية بعد التقليم.



الشكل (١): تسليق نبات الخيار

٢٣٥

## النتائج الخاصة

– يصف نباتات الفصيلة القرعية نباتيًا.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

● استخدام الأدوات بصورة صحيحة وآمنة.

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- تقسيم الطلبة إلى ست مجموعات، وتكليفها ما يأتي:
- المجموعة الأولى: تتفحص الأوراق وتدوّن الملاحظات.
- المجموعة الثانية: تتفحص سيقان النباتات وتدوّن الملاحظات.
- المجموعة الثالثة: تتفحص الأزهار وتدوّن الملاحظات.
- المجموعة الرابعة: تتفحص الثمار وتدوّن الملاحظات.
- المجموعة الخامسة: تكليف الطلبة تفحص البذور وتدوّن الملاحظات.
- المجموعة السادسة: تكليف الطلبة تفحص الجذور وتدوّن الملاحظات.
- تتبادل المجموعات تنفيذ المهام بإشراف المعلم، ثم تعرض نتائج العمل.
- تنظّم المجموعات نتائج عملها وتعرضها وتناقشها.
- تقويم أداء الطلبة.

## الوصف النباتي للفصيلة القرعية

التمرين  
(٢-٤)

## التحضيرات

يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:  
– تصف نباتات الفصيلة القرعية وصفًا نباتيًا.

## المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

● سكين. ● مقص تقليم. ● عدسة مكبرة. ● مرشوكي. ● نبات كوسا. ● خيار ويطبخ.

الرسوم التوضيحية	خطوات العمل والنقاط الحاكمة
	أولاً: الأوراق تفحص الأوراق من حيث: ١- نوعها. ٢- شكلها. ٣- الحواف. ٤- لونها. ثانياً: الساق تفحص السيقان من حيث: ١- طبيعة النمو. ٢- درجة تفرعها. ٣- وجود الزغب. ٤- ثمراتها ثالثاً: الأزهار تفحص الأزهار من حيث: ١- جنسها. ٢- وجودها. ٣- لونها.

٢٣٦

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى



### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

#### إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) الفصيلة القرعية وعرض نتائج عملهم ومناقشتها.

### استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم : الملاحظة
- أداة التقييم : قائمة رصد ( ٢ - ١١ )

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

#### مصادر التعلم

#### للمعلم

– محمود القصراري، فؤاد قواسمة، الزراعة المحمية، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.

#### للطالب

رابعاً: الفمار  
تفحص الثمار من حيث :  
١- نوعها.  
٢- لونها.  
٣- شكلها.  
خامساً: البذور  
تفحص البذور من حيث:  
١- شكلها.  
٢- لونها.  
٣- ملمسها.  
سادساً: الجذور:  
تفحص الجذور من حيث :  
١- نوعها.  
٢- شكلها ومدى انتشارها.

### أخطاء شائعة

تشتمل هذه الفصيلة على خضراوات عدّة، أهمها: الملفوف، والقرنيط (الزهرة)، والفجل، واللفت، والبروكلي، وتختلف هذه النباتات في طبيعة نموها، والجزء الذي يؤكل منها. وأهم ما يميز خضراوات هذه الفصيلة هو احتواء الأزهار على أربع بتلات منفصلة متصلة.

#### الملفوف (Cabbage)

الاسم العلمي: (*Brassica oleracea* Var. *Capitata*)

يعدّ الملفوف من النباتات الشتوية، ويزرع في مناطق الأردن جميعها، وقد بلغت المساحة المزروعة به لعام ٢٠٠٩م (١٦ ألف دونم) أنتجت ٤٣ ألف طن، والجزء الذي يؤكل هو الأوراق.

المناخ: يحتاج الملفوف إلى درجات حرارة مرتفعة تبلغ ٢٤ - ٢٦°س خلال النصف الأول من حياته، وجوّ معتدل يميل إلى البرودة من ١٥ - ٢٠°س، وجوّ رطب خلال النصف الثاني من حياته؛ حتى تلتف رؤوسه جيّداً. وتنبت بذوره في مجال ملائم من ٧ - ٣٥°س.

أما إذا انخفضت درجة الحرارة خلال تكوين الرؤوس إلى ١٠°س فإنّ الرؤوس تكون صغيرة الحجم، وغير مندمجة، ويندفع النبات إلى الإزهار المبكر.

التربة: تنجح زراعة الملفوف في مختلف أنواع الأراضي، من الثقيلة إلى الخفيفة الخصب، الجيدة الصرف، والتي تكون درجة الحموضة (pH) فيها ٦,٥، وهو من النباتات المجهدة للتربة.

#### حل المشكلات

بما أن الملفوف من النباتات المجهدة للتربة التي تحتاج إلى جوّ معتدل، بارد في مرحلة تكوين الرؤوس، فبمّ تنصح المزارع بخصوص:

- ١ - حفظ خصوبة التربة.
- ٢ - حالة ارتفاع الحرارة.

مواعيد الزراعة: تختلف مواعيد الزراعة حسب المنطقة كما يأتي:

٢٣٨

### إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر صفحة (٢٣٩)

٧ / ١٥ -

- يصوب المعلم إجابات الطلبة ونتائج عمل المجموعات ويناقشها على السبورة، ويدوّن ما هو صحيح منها.

### النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة الملفوف.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالملفوف.
- يوضح الطرق الملائمة لزراعة الملفوف.
- يحدد المسافات المناسبة لزراعة الملفوف.
- يحدد مواعيد زراعة الملفوف في ضوء احتياجاته المناخية.
- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاج الملفوف.
- يذكر أهم أصناف الملفوف الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب الملفوف.
- يصف علامات نضج الملفوف لتحديد موعد جنيه.

### المفاهيم والمصطلحات

### السلامة المهنية

### استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر / اسئلة وأجوبة

- التمهيد للحمصة: ينفذ المعلم جلسة مناقشة زراعة الملفوف، وذلك بطرح الأسئلة الآتية: ما الاسم العلمي للملفوف؟ ما العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج الملفوف؟ ما التربة المناسبة لزراعة الملفوف؟ اقترح مسافات مناسبة لزراعة الملفوف؟ ما الموعد المناسب لزراعته؟ بين طريقة زراعته.
- إعطاء فرصة لكل فرد في المجموعة للتفكير في الإجابة.
- مناقشة جماعية يديرها المعلم للتوصل إلى الإجابات الصحيحة، وتدوينها على السبورة.

التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات عمل، ويحدد مهامها والزمن اللازم على النحو الآتي:
- المجموعة الأولى: توضح مفهوم الترقيع والعزق.
- المجموعة الثانية: تصمّم برنامجاً للرّي والتسميد.
- المجموعة الثالثة: تعرض أهم الأصناف التي تزرع في الأردن، وأكثر الآفات التي تهاجم الملفوف.
- المجموعة الرابعة: تشرح علامات النضج، وتبين كيفية الاستدلال على ذلك.
- يعرض مقرر والمجموعات نتائج المهام التي كلفوا بها.

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

– تكليف بعض الطلبة كتابة تقرير عن أسباب تسمية هذه الفصيلة بهذا الاسم، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

#### إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن عيوب الملفوف الفسيولوجية ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم : مراجعة الذات
- أداة التقويم : سجل وصف سير التعلم ( ٢ - ١٢ )

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

- محمود القصرأوي، فؤاد قواسمة، الزراعة المحمية، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.
- جعفر القضاة وآخرون، الدليل الفني لإنتاج الملفوف، مشروع تنمية الصادرات البستانية ونقل التكنولوجيا، المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، عمان، الأردن، ٢٠٠٧م.

#### للطالب

المنطقة	موعد الزراعة
الشفاغورية	١٥ / ١٠ / ١٥
الأغوار	١ / ٩ - ١ / ٢

**فكر** من معرفتك للاحتياجات المناخية للملفوف استنتج موعد الزراعة المناسب في المرتفعات والبادية؟

٥ طرق الزراعة وكمية التقاوي: يزرع الملفوف على مصاطب عرضها ٨٠ سم باستخدام الملس والرّي بالتنقيط، وتكون المسافة بين المصاطب متراً واحداً، وبين الأشتال ٤٠ سم، كما في الشكل (٢-١٥). وتزرع الأشتال الجاهزة بوجود الماء، ويحتاج الدونم إلى ما يقرب من ٢٥٠ غم من البذور لإنتاج ٧٠٠٠ شتلة.



الشكل (٢-١٥): زراعة الملفوف.

٥ عمليات الخدمة بعد الزراعة: يحتاج الملفوف إلى العمليات الآتية:

١. الترقيع: تجرى بعد أسبوع من الزراعة، وترقع بأشتال لها العمر نفسه.
٢. العزق: تجرى عملية العزق؛ لإزالة الأعشاب وجمع التراب حول السيقان؛ لتدعيمها، ويجب إجراء العزق بحذر، حين يكون سطحياً لمنع إتلاف الجذور، وينبغي ألا تجرى في الصباح الباكر؛ لأن الأوراق تكون سهلة التكسير والقصف.
٣. الري: تروى الشتلات بعد يومين من الزراعة، ثم ينظم الري بمعدل مرة كل ٤-٥ أيام حتى بداية تكوين الرؤوس، ثم تطول فترات الري، حتى تصبح مرة كل ٧-١٠ أيام، ثم يوقف قبل الحني بأسبوعين تجنباً لانفجار الرؤوس.

٢٣٩

٤. التسميد: يضاف طنّان من السماد البلدي المختمر لكلّ دونم عند إعداد الأرض للزراعة، وتضاف أيضاً أسمدة كيميائية للدونم كما يأتي:

- أ. ٢٠ كغم من النيتروجين، تضاف على دفعتين بعد ٤ أسابيع من الزراعة، وبعد ٦ أسابيع من الدفعة الأولى.
- ب. ١٢ كغم فسفور، تضاف بعد ٤ أسابيع من الزراعة.
- ج. ٢٠ كغم بوتاسيوم، تضاف مثل النيتروجين.

٥ الأصناف: هناك أصناف متعددة من الملفوف، منها: بانر، وبرونزويك، والملفوف الأحمر، والبلدي.

٥ الآفات: يصاب الملفوف بأفات عدّة، منها: دودة أوراق الملفوف، كما في الشكل (٢-١٦)، وحفّار ساق الملفوف، والمنّ، والبياض الزغبي، والذبول، والنيماطودا.



الشكل (٢-١٦): دودة ورق الملفوف.

٥ النضج والحني: تقطف رؤوس الملفوف

بوساطة سكين حادة من أسفل الرأس مع ترك جزء من الساق عندما تصبح الرؤوس صلبة مكتملة التكوين، وذلك بالضغط عليها باليد، وتكون الأوراق المغلفة للرأس مشدودة ولامعة، ويبلغ إنتاج الدونم ٢ - ٤ أطنان.

هل تعلم؟

يحتاج الملفوف إلى ٢ - ٤ أشهر لكي ينضج من بداية الزراعة.

#### قضية للبحث

الساق الجوفاء وتفجر الرؤوس عيوب فسيولوجية في الملفوف، ابحث عن أسباب هذه العيوب، باستخدام المصادر المعرفية المتاحة: (كتب، أو شبكة الإنترنت، ...). ثم اعرض ما تتوصل إليه، وناقشه مع زملائك.

٢٤٠

## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة الزهرة.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالزهرة.
- يوضح الطرق الملائمة لزراعة الزهرة.
- يحدد المسافات المناسبة لزراعة الزهرة.
- يحدد مواعيد زراعة الزهرة في ضوء احتياجاتها المناخية.
- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاج الزهرة.
- يذكر أهم أصناف الزهرة الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب الزهرة.
- يصف علامات نضج الزهرة لتحديد موعد جنيها.

## المفاهيم والمصطلحات

التبييض

## السلامة المهنية

## الزهرة (القرنبيط) (Cauliflower)

الاسم العلمي: (*Brassica oleracea* Var. *Botrytis*)

تنتشر زراعة الزهرة في مناطق الأردن جميعها، وهي من المحاصيل الشتوية، والجزء الذي يؤكل هو القرص الزهري. بلغت المساحة المزروعة بها لعام ٢٠٠٩م (٢٠ ألف دونم) أنتجت ٥٠ ألف طن.

المناخ: تحتاج الزهرة إلى طقس بارد رطب خالٍ من الصقيع، وتنبت البذور في مجال حراري من ٧ - ٢٩ س°. والزهرة كالمفوف تحتاج في النصف الأول من حياتها إلى درجة حرارة معتدلة دافئة تبلغ ٢٤ س° لتكوين نمو خضري جيد، وفي النصف الثاني من حياتها تحتاج إلى درجة حرارة تميل إلى البرودة وتقدر بـ ١٨ س°، لتكوين الرؤوس (الأقراص). تنضج أقراص الزهرة إذا ارتفعت درجة الحرارة في أثناء تكوين الرؤوس، فيؤدي ذلك إلى:

١. نمو أوراق صغيرة داخل الأقراص (القرص المتورق).

٢. تغير لون الأقراص، وتظهر مفككة زغبية (القرص المحبب).

٣. عدم تكوين أقراص.

أما إذا انخفضت درجة الحرارة إلى ١٠ س° فإن ذلك يؤخر النضج، ويؤدي إلى ضعف نمو النبات، أو توقفه، وتكوين أقراص صغيرة الحجم.

التربة: كما في المفوف.

مواعيد الزراعة: تزرع الزهرة في الأردن حسب المنطقة على النحو الآتي:

المنطقة	موعد الزراعة
المرتفعات والبادية	٧/١، ٢/١
الشفاغورية	١٠/١ - ١١/١
الأغوار	٩/١٥ - ١١/١

طرق الزراعة وكمية التقاوي: كما في المفوف، ولكن في نبات الزهرة يجب الاهتمام بحجم الشتلات، إذ يجب أن يكون عمر الشتلة بين شهر إلى شهر ونصف، وطولها ١٥ سم؛ لأن زراعتها الشتال وهي كبيرة الحجم يسبب حالة فسيولوجية تسمى التزير، أي تكوين أقراص صغيرة تسمى أزراراً.

٢٤١

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر / أسئلة وأجوبة

- التمهيد للحصة: ينفذ المعلم جلسة لمناقشة نبات الزهرة، ثم يطرح الأسئلة الآتية:
  - ما الاسم العلمي للزهرة؟ ما العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج الزهرة؟
  - ما التربة المناسبة لزراعة الزهرة؟ اقترح مسافات الزراعة المناسبة للزهرة.
  - ما الموعد المناسب لزراعتها؟ بين طريقة زراعتها. لماذا تجرى عملية التبييض للزهرة؟
- إعطاء فرصة لكل فرد في المجموعة للتفكير في الإجابة.
- يصوب المعلم إجابات الطلبة ويدونها على السبورة.
- التعلم التعاوني / العمل الجماعي
  - تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل، وتكليفها ما يأتي:
    - المجموعة الأولى: توضح مفهوم الترقيع والعزق.
    - المجموعة الثانية تصمم برنامجاً للري والتسميد.
    - المجموعة الثالثة: تعرض أهم أصناف المفوف التي تزرع في الأردن وأكثر الآفات التي تهاجمه.
    - المجموعة الرابعة: تشرح علامات النضج، وتبين كيفية الاستدلال عليها.
  - مناقشة داخل المجموعة الواحدة للتوصل إلى الإجابة الصحيحة وتدوينها على السبورة.
  - يعرض مقرر والمجموعات المهام التي كلفوا بها.
  - مناقشة جماعية يديرها المعلم للتوصل إلى الإجابات الصحيحة.

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن فوائد عملية التبييض، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم التقدير العددي (٢ – ١٣)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

للمعلم  
– محمود القصرأوي، فؤاد قواسمة، الزراعة المحمية، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.

### للطالب

– محمود القصرأوي، الخضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

### ٥ عمليات الخدمة بعد الزراعة: تجرى العمليات الآتية للزهرة:

١. الترقيع والعزق والتسميد: كما في الملفوف.
٢. الري: تروى الشتلات بعد يومين من الزراعة، ثم ينظم الري بمعدل مرة كل ٤-٥ أيام حتى بداية تكوين الرؤوس، ثم تطول فترات الري حتى تصبح مرة كل ٧-١٠ أيام.

### قضية للبحث

يتوقف نجاح الزهرة على الري، فإن أي زيادة أو نقصان فيه يؤدي إلى أضرار، ابحث عن هذه الأضرار، باستخدام المصادر المعرفية المتاحة (كتب، أو شبكة الإنترنت،...)، ثم اعرض ما تتوصل إليه من معلومات، وناقشه مع زملائك.

٣. التبييض: هي عملية ربط أوراق الزهرة حول القرص عندما يكون قطره من (٥-٨) سم، وإذا كان النمو الخضري جيداً يكسر العرق الوسطي لبعض الأوراق، وتنتى فوق الأفراس؛ للإبقاء على لون القرص ناصع البياض، ولحمايته من الشمس والأمطار، وحتى لا يصبح لونه بنيًا كما في الشكل (٢-١٧).

### ٦ الأصناف: هناك أصناف عديدة



- منها: ستيدي، وتيرس، وميجها
- ف١، وسنوبول، والبلدي.
- الافات: كما في الملفوف.
- النضج والجنين: تنضج أفراس الزهرة بعد (٥، ٢-٤) أشهر من الزراعة، وتقض بوساطة سكين حادة من الساق عند وصولها إلى الحجم المناسب قبل أن تنفكك. ويتبع الدونم الواحد من (٢-٣) أطنان.

الشكل (٢-١٧): عملية تبييض الزهرة.

٢٤٢

## أخطاء شائعة



## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة الفجل.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالفجل.
- يوضح الطرق الملائمة لزراعة الفجل.
- يحدد المسافات المناسبة لزراعة الفجل.
- يحدد مواعيد زراعة الفجل في ضوء احتياجاته المناخية.
- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاج الفجل.
- يذكر أهم أصناف الفجل الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب الفجل.
- يصف علامات نضج الفجل لتحديد موعد جنيه.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر / الأسئلة والأجوبة

- التمهيد للدرس بربط التعلم السابق بالتعلم اللاحق، وذلك بطرح الأسئلة الآتية:

- ما الاسم العلمي للفجل؟ ما العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج الفجل؟
- ما التربة الملائمة لزراعة الفجل؟ هل تختلف مواعيد الزراعة من منطقة إلى أخرى؟ كيف يمكن تحديد مسافات الزراعة؟ وضح طريقة زراعة الفجل.
- مناقشة إجابات الطلبة وتدوين الصحيح منها على السبورة.

التعلم التعاوني / العمل الجماعي

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل، وتكليفها المهام الآتية:
  - المجموعة الأولى: توضح مفهوم الحف والحف والعزق.
  - المجموعة الثانية: تصمّم برنامجاً لرّي الفجل وتسميده.
  - المجموعة الثالثة: تعرض أهم أصناف الفجل التي تزرع في الأردن وأكثر الآفات التي تهاجمه.
  - المجموعة الرابعة: تشرح علامات نضج الفجل، وتبيّن كيفية الاستدلال عليها.
- يعرض مقررو المجموعات نتائج المهام التي كلفوا بها.
- مناقشة نتائج المجموعات في نتائج العمل، وتصويبها من قبل المعلم وتدوينها على السبورة.

## الفجل Radish

الاسم العلمي: (*Raphanus sativus*)

تنحصر زراعة الفجل في الأردن في مساحات محدودة، وقد بلغت المساحة المزروعة به لعام ٢٠٠٩ ما يقرب من ألفي دونم أنتجت ٥ آلاف طن. والفجل من الخضراوات الشتوية، تؤكل منه الجذور، وقد تؤكل الأوراق.

- ① المناخ: تنبت بذور الفجل في درجة حرارة تتراوح بين (١٨-٢٩) س° بعد (٣-٤) أيام من الزراعة، وتقلّ سرعة الإنبات إذا انخفضت عن ١٣ س°، والفجل ينمو في جو دافئ، يميل إلى البرودة، أي ما يقرب من (١٦-١٨) س°. وهو يتأثر بارتفاع درجة الحرارة، فيؤدي ذلك إلى الإسراع في الإزهار، وتكوين جذور فارغة، وحارة، وصغيرة.

## فكر

أي فترة ضوئية تنصح بها لزراعة الفجل: فترة النهار الطويل أم النهار القصير؟ لماذا؟

- ② التربة: تفضّل زراعة الفجل في الأراضي المتوسطة القوام، الخصبة، الجيدة الصرف والتهوية.
- ③ مواعيد الزراعة: يمكن زراعة الفجل البلدي طوال العام، وأفضل موعد لزراعته هو من شهر أيلول حتى شباط.
- ④ طرق الزراعة وكمية التقاوي: تزرع بذور الفجل في أحواض أبعادها ١ × ١ م، أو ١ × ٢ م بطريقتين، هما: النثر، أو الزراعة في سطور، وتعمل سطور داخل الحوض بعد بعضها عن بعض ١٥ سم، ثم تغطى بطبقة رقيقة من التراب، ويلزم لزراعة دونم واحد (١-٢) كغم من البذور.
- ⑤ عمليات الخدمة بعد الزراعة: تُجرى للفجل العمليات الآتية:
  ١. الحف: يُجرى الحف على مسافات من (٥-١٠) سم حسب الصنف، بخلع البادرات.
  ٢. العزق: تزال الأعشاب يدويًا كلما ظهرت.
  ٣. الري: يحتاج الفجل إلى ري منتظم ومستمر، ويؤدي تعطيش النباتات إلى ضعفها، وزيادة المادة الحريفة (اللاذعة) في الجذور، والتبكير في الإزهار، وقلة الإنتاج.
  ٤. التسميد: يسمّد الفجل بإضافة (١-٢) طن من السماد البلدي المختمر للدونم،

٢٤٣

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر صفحة (٢٤٣)

- النهار القصير؛ لأن مدة النهار الطويل تدفع الفجل إلى الإزهار.

### مراعاة الضروك الفردية

#### علاج

– تكليف بعض الطلبة كتابة تقرير عن الأسباب التي تدفع الفجل إلى الإزهار، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

#### إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن فوائد الفجل الغذائية ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم التقدير العددي (٢ – ١٤)

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

#### مصادر التعلم

– للمعلم  
– محمود القصرأوي، فؤاد قواسمة، الزراعة المحمية، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.

#### للطالب

وتضاف أسمدة كيميائية للدونم تقدر بـ (٤٠) كغم من سلفات الأمونيوك بعد أسبوعين من الزراعة، و١٥ كغم من السوبر فوسفات قبل الزراعة.

① الأصناف: تزرع أصناف متعددة من الفجل، منها: شامبيون، والمرجان الأحمر، والياقوت الأحمر، والبلدي.

② الآفات: كما في الملفوف.

③ النضج والجنين: ينضج الفجل بعد (٣٠ - ٥٠) يوماً من الزراعة عند وصول الجذور إلى الحجم المناسب، وهي غضة ويقلع على دفعات، ثم يفرز، وينظف، ويستبعد منه المتشقق والمتفرع والمصاب، ويربط في حزم مع أوراقه، أو تزال الأوراق، ويعبأ في أكياس شفافة، وينتج الدونم الواحد من طنين إلى ثلاثة أطنان.

#### التقويم

- ١ - صف كيفة زراعة الفجل.
- ٢ - اذكر سبب حدوث الظواهر الآتية :  
أ - اندفاع نبات الملفوف إلى الإزهار المبكر.  
ب - زيادة المادة الحريفة في جذور الفجل.  
ج - التزيرير في أقراص الزهرة.  
د - تكوّن أقراص صغيرة الحجم في الزهرة.
- ٣ - صمّم برنامجاً لتسميد الملفوف.
- ٤ - اذكر أربع آفات تصيب الزهرة.
- ٥ - وضح الاحتياجات المناخية لنبات الملفوف.
- ٦ - صف طبيعة التربة الملائمة لزراعة الفجل.
- ٧ - ما فائدة إجراء عملية التبييض للزهرة؟
- ٨ - اذكر علامات نضج الملفوف.

### أخطاء شائعة

## النتائج الخاصة

- يصف نباتات الفصيلة الصليبية نباتيًا.
- يبيّن نبات الزهرة.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

- استخدام الأدوات بصورة صحيحة وآمنة.

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل لتنفيذ خطوات التمرين (٢-٥)، وتكليفها المهام الآتية:

- المجموعة الأولى: تتفحص الأوراق وتدوّن الملاحظات.
- المجموعة الثانية: تتفحص سيقان النباتات وتدوّن الملاحظات.
- المجموعة الثالثة: تتفحص الأزهار وتدوّن الملاحظات.
- المجموعة الرابعة: تتفحص الثمار وتدوّن الملاحظات.
- المجموعة الخامسة: تتفحص البذور وتدوّن الملاحظات.
- المجموعة السادسة: تتفحص الجذور وتدوّن الملاحظات.

- تنظيم المجموعات نتائج عملها وعرضها وتناقشها.

## التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل، وتكليفها المهام الآتية:
- المجموعة الأولى: تتفحص رأس الزهرة ذا الحجم المناسب.
- المجموعة الثانية: تجمع الأوراق حول رأس الزهرة وتربطه بخيط.
- يتناول المجموعات مهام العمل بإشراف المعلم.
- تنظيم المجموعات نتائج عملها وعرضها على المعلم.
- تقويم المعلم أداء الطلبة.

يتوقّع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:

- تصف نباتات الفصيلة الصليبية وصفًا نباتيًا.

المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

● مسكين. ● مقص تقليم. ● عدسة مكبرة. ● مرشوكي. ● نبات ملفوف. ● زهرة، فجل.

الرسوم التوضيحية	خطوات العمل والنقاط الحاكمة
	أولاً: الأوراق تفحص الأوراق من حيث: ١- نوعها (بسيطة أو مركبة). ٢- شكلها. ٣- لونها. ٤- الحافات. ثانيًا: الساق تفحص السيقان من حيث: ١- طبيعة النمو. ٢- مميزات خاصة. ثالثًا: الأزهار تفحص الأزهار من حيث: ١- جنسها. ٢- وجودها. ٣- لونها.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الفروق الفردية

علاج

إثراء

### استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم: الملاحظة
- أداة التقييم: قائمة رصد ( ٢ - ١٥ )
- استراتيجية التقييم: التقييم المعتمد على الأداء
- أداة التقييم: سلم التقدير العددي ( ٢ - ١٦ )

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلّم

للمعلم

- محمود القصراوي، فؤاد قواسمة، الزراعة المحمية، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ٢٠٠٤م.

للطالب

- محمود القصراوي، الخضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

- رابعاً: الثمار
- تفحص الثمار من حيث :
- ١- نوعها.
  - ٢- لونها.
  - ٣- شكلها.
- خامساً: البذور
- تفحص البذور من حيث :
- ١- شكلها.
  - ٢- لونها.
  - ٣- ملمسها.
- سادساً: الجذور
- تفحص الجذور من حيث :
- ١- نوعها.
  - ٢- شكلها ومدى انتشارها.

٢٤٧

### عملية التبييض في الزهرة

التبريرات	النتائج
التمرين (٢-٦)	يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن: - تبييض نبات الزهرة
المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات	
* خيط رافيا. * نبات زهرة.	
الرسوم التوضيحية	خطوات العمل والنقاط الحاسمة
	١- تفحص أقراس الزهرة في الحقل؛ للتأكد من وصول القرص إلى الحجم المناسب عندما يكون قطره من ٥-٨ سم). ٢- اجمع الأوراق حول القرص، واربطها بخيط الرافيا من القمة، أو اكسر عنق الورقة، وانها على القرص، كما في الشكل (١).
الشكل (١): تبييض الزهرة.	

### التقويم

- ١- ما فائدة عملية تبييض نباتات الزهرة؟
- ٢- وضح كيف تجري عملية التبييض.

٢٤٨

## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة الفاصولياء.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالفاصولياء.
- يوضح الطرق المناسبة لزراعة الفاصولياء.
- يحدد المسافات الملائمة لزراعة الفاصولياء.
- يحدد مواعيد زراعة الفاصولياء في ضوء احتياجاتها المناخية.
- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاجها الفاصولياء.
- يذكر أهم أصناف الفاصولياء الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب الفاصولياء.
- يصف علامات نضج الفاصولياء لتحديد موعد جنيها.

## المفاهيم والمصطلحات

التدعيم

## السلامة المهنية

- استخدام الأدوات بصورة صحيحة وآمنة

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر/ الأسئلة والأجوبة

- التمهيد للدرس يربط التعلم السابق بالتعلم اللاحق، وطرح الأسئلة الآتية:
  - ما الاسم العلمي للفاصولياء؟ ما العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج الفاصولياء؟
  - ما التربة الملائمة لزراعة الفاصولياء؟ هل تختلف مواعيد الزراعة من منطقة إلى أخرى؟ كيف يمكن تحديد مسافات الزراعة؟ وضح طريقة زراعة الفاصولياء.
- طرح السؤال الآتي: هل تكثّر الخضراوات جميعها، وبخاصة نباتات الفصيلة البقولية بوساطة التكاثر البذري في المشاتل؟
- تكليف الطلبة البحث عن أثر انخفاض الحرارة ( قضية بحث ) وعرض النتائج.
- إجراء مناقشة جماعية يديرها المعلم، للتوصل إلى الإجابات الصحيحة.
- مناقشة إجابات الطلبة وتدوين الصحيح منها على السبورة.
- التعلم التعاوني / العمل الجماعي
  - تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل، وتكليفها المهام الآتية:
    - المجموعة الأولى: توضّح مفهوم الترقيع والحف والعزق والتدعيم.
    - المجموعة الثانية: تصمّم برنامجاً لرّي الفاصولياء وتسميدها.
    - المجموعة الثالثة: تعرض أهم أصناف الفاصولياء التي تزرع في الأردن وأكثر الآفات التي تهاجمها.
    - المجموعة الرابعة: تشرح علامات نضج الفاصولياء وتبين كيفية الاستدلال

## الملاحق

ملحق أدوات التقويم (٢-١٧).

تعدّ الفصيلة البقولية من أهم الفصائل النباتية من الناحية الغذائية والاقتصادية، وتضم عدداً كبيراً من الأنواع المنتشرة، وتزرع في الأردن محاصيل الفاصولياء، والبازيلاء، والفول، واللوبيا. وتمتاز هذه الفصيلة بوجود عقد بكتيرية في جذورها ناشئة من بكتيريا تعيش فيها، لها قدرة على تثبيت النيتروجين الجوي في التربة، وثمارها قرنية، وأوراقها مركبة، وبذورها تحتوي على نسبة عالية من البروتين، ولا تحمل نباتاتها النشيل.

## 1 الفاصولياء Common Bean

الاسم العلمي: (*Phaseolus vulgaris*)

تزرع الفاصولياء من أجل الاستفادة من قرونها وبذورها الخضراء، أو الجافة، وهي غنية بالبروتين، وتستخدم في الطهي، طازجة، أو معلبة، أو مجمدة. وبلغت المساحة المزروعة بها لعام ٢٠٠٩م (٧ آلاف دونم)، أنتجت ٩ آلاف طن.

المناخ: الفاصولياء نبات صيفي يتأثر بالعوامل المناخية الآتية:

١. الحرارة: تحتاج الفاصولياء إلى موسم نمو دافئ، خالٍ تمامًا من الصقيع، وتنبت البذور في درجة حرارة بين (٢٠ - ٣٠) س°، ويقبل الإنبات بانخفاض درجة الحرارة عن ذلك. وخلال مرحلة نمو النبات فإن درجة الحرارة الملائمة له هي بين (١٥ - ٢٠) س°، أما إذا قلت عن ذلك فإن النبات يتضرر، والبادرات تختنق قرب سطح التربة، وتصفّر الأوراق، ويظهر عليها بقع بنية بين العروق. وفي حالة ارتفاع الحرارة عن ٣٥ س°، خلال مرحلة الإزهار والعقد فإن البراعم الزهرية والأزهار تتساقط، ويقبل العقد، وتتقرم القرون، وتحتني وتليّف، وتخلو من البذور.

## قضية للبحث

تتضرر الفاصولياء بانخفاض درجة الحرارة عن ١٢ س°، ابحث في هذه الأضرار، باستخدام المصادر المعرفية المتاحة: (كيب، أو شبكة الإنترنت،...)، ثم اعرض ما تتوصل إليه، وناقشه مع زملائك.

٢٤٩

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر صفحة (٢٥٠)

- لحماية البذور من التعفن والأمراض الفطرية في التربة.

عليها.

- يعرض مقرر والمجموعات المهام التي كلفوا تنفيذها.



### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

– تكليف بعض الطلبة كتابة تقرير عن مميزات الفصيلة البقولية، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

#### إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن أنواع الفاصولياء الطويلة والمتوسطة والقصيرة، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

### استراتيجيات التقييم وأدواته

– استراتيجية التقييم : مراجعة الذات

– أداة التقييم : سجل وصف سير التعلم ( ٢ - ١٧ )

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

– إبراهيم محمد حبيب وآخرون، الزراعات المحمية، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة، ٢٠٠٦م.

#### للطالب

٢. الرطوبة الجوية: يلائم الفاصوليا رطوبة معتدلة، أما إذا صاحب جفاف الجو ارتفاع درجات الحرارة فإن الأزهار تتساقط، وإذا صاحب ارتفاع الرطوبة انخفاض درجة الحرارة قلّ العقد، وسقطت الأزهار.

٣. الضوء: الفاصوليا نبات محاميد، ولكنه يتأثر بشدة الإضاءة، إذ تظهر بقع بنية اللون على جوانب القرون المعرضة لأشعة الشمس، وتصبح مائيّة غائرة.

التربة: تنجح زراعة الفاصوليا في الأراضي الرملية الخفيفة والطينية جميعها، على أن تكون عميقة، خالية من الأملاح، ودرجة الحموضة (pH) فيها تتراوح بين ٦ - ٦,٥.

مواعيد الزراعة: تزرع الفاصوليا بعد زوال خطر الصقيع حسب المنطقة كما يأتي:

المنطقة	الزراعة المكشوفة	الزراعة المحمية
المرتفعات والبيادية	٢ / ١٥	٤ / ١ - ٢ / ١٥
الشفاغورية	٢ / ١٥	٣ / ١ - ٢ / ١
الأغوار	١١ / ١ - ٩ / ١	١١ / ١ - ١٠ / ١

طرق الزراعة وكمية التقاوي: تزرع الفاصوليا زراعة مكشوفة ومحمية كما يأتي:

١. الزراعة المكشوفة: تزرع البذور سواء أكانت منقوعة أو جافة مباشرة في التربة، في أتلام، أو مصاطب، مغطاة بالملش، مع الري بالتنقيط، أبعادها ٦٠ - ٧٠ سم، والمسافة بين البذور من (١٠ - ١٥) سم للأصناف القصيرة. ويوضع في الحفرة بذرتان أو ثلاث بذور، وتروى بالتنقيط، ولكن ينبغي الاقتصاد في الري أثناء الزراعة؛ لأن الرطوبة العالية تؤدي إلى تعفن البذور وعدم إنباتها.

٢. الزراعة المحمية: تزرع البذور في مصاطب عرضها من (٧٠ - ٨٠) سم في فتحات الملش، وتكون المسافة بينها ٣٠ سم في أصناف الفاصوليا المتسلقة، ويجب معاملة البذور بمبيد فطري.

#### فكر

لماذا تعامل بذور الفاصوليا في الزراعة المحمية بمبيد فطري؟

وتبلغ كمية التقاوي اللازمة لأصناف الفاصوليا القصيرة من ٥ - ٧ كغم لكل دونم، ولأصناف المتسلقة من ٦ - ٧ كغم.

٢٥٠

#### عمليات الخدمة بعد الزراعة: تجرى للفاصوليا عمليات الخدمة الآتية:

١. الترقيع: تزرع الجور الغائبة بعد ١٠ - ١٥ يوماً.
٢. الخف: يترك نبات واحد في الحفرة، ويتخلص من الزائد منها.
٣. العزق: تعزق الأعشاب الظاهرة في الأتلام عند الحاجة، ويجب عدم التعمق في العزق؛ لأن جذور الفاصوليا سطحية، فتقطيعها يؤدي إلى تساقط الأزهار.
٤. التدعيم: تجرى هذه العملية في البيوت المحمية، وذلك بتجهيز خيوط ممتدة رأسياً، حتى تلتف النباتات حولها، من دون الحاجة إلى تسليقها، ويكون ذلك في الأصناف الطويلة (المتسلقة).
٥. الري: تروى البذور عند الزراعة، ويوقف الري حتى يكتمل الإنبات، ثم ينظم بعد الإنبات لاستمرار النمو الخضري الجيد، لأن زيادة الرطوبة في التربة تؤدي إلى اصفرار الأوراق، وسقوط الأزهار، وتكون قرون صغيرة، أما نقصها قبل الإزهار أو في أثناءه فيؤدي إلى نقص الإنتاج.
٦. التسميد: لا تحتاج نباتات الفصيلة البقولية إلى كثير من الأسمدة، ويمكن إضافة طنّ إلى طين من السماد البلدي المختمر للدونم، وأسمدة كيميائية بمعدل ٧ كغم نيتروجين، و١٠ كغم فسفور، و٧ كغم بوتاسيوم، على دفعات مع مياه الري.

١. الأصناف: يزرع في الأردن العديد من الأصناف، منها القصيرة مثل: عيدن، وسرايت، والبلدي، ومنها المتسلقة، مثل: ماترا، ورومانو.

٢. الآفات: تصاب الفاصوليا بالعديد من الآفات منها: أمراض الصدأ، وذبول الفيوزاريوم، والبيض الدقيقي، وحشرة ذبابة الفاصوليا، والمّ، وخنفساء الفاصوليا.

٣. النضج والجنثي: تنضج الفاصوليا عند وصولها إلى الحجم المناسب، وقبل أن تلتف وتتخشب، بعد ٥٠ - ٦٠ يوماً من الزراعة في الأصناف القصيرة، و٧٠ - ٨٠ يوماً في الأصناف المتسلقة. ويقدر إنتاج الدونم بـ (٨٠٠) كغم تقريباً في الأصناف القصيرة، و(٢ - ٣) أطنان من الأصناف المتسلقة. ويجمع المحصول باليد ويعبأ في صناديق مناسبة، ثم يسوّق.

٢٥١

## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة البازيلاء.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالبازيلاء.
- يوضح الطرق المناسبة لزراعة البازيلاء.
- يحدد المسافات الملائمة لزراعة البازيلاء.
- يحدد مواعيد زراعة البازيلاء في ضوء احتياجاتها المناخية.
- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاج البازيلاء.
- يذكر أبرز أصناف البازيلاء الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب البازيلاء.
- يصف علامات نضج البازيلاء لتحديد موعد جنيها.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر/ الأسئلة والأجوبة

- التمهيد للحصة: ينفذ المعلم جلسة لمناقشة زراعة البازيلاء، ثم يطرح الأسئلة الآتية: ما الاسم العلمي للبازيلاء؟ ما العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج البازيلاء؟ ما التربة المناسبة لزراعة البازيلاء؟ اقترح مسافات المناسبة لزراعة البازيلاء. ما الموعد المناسب لزراعتها؟ بين طريقة زراعة البازيلاء.
- إعطاء فرصة لكل فرد في المجموعة للتفكير في الإجابة.
- إجراء مناقشة داخل المجموعة الواحدة للتوصل إلى الإجابة الصحيحة، ثم تدوينها على السبورة.
- إجراء مناقشة جماعية يديرها المعلم، للتوصل إلى الإجابات الصحيحة.
- التعلم التعاوني/ العمل الجماعي
- تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل، وتكليفها المهام الآتية:
  - المجموعة الأولى: توضح مفهوم الترقيع والخف والعزق والتدعيم.
  - المجموعة الثانية تصمّم برنامجاً لريّ البازيلاء.
  - المجموعة الثالثة: تعرض أهم أصناف البازيلاء التي تزرع في الأردن وأكثر الآفات التي تهاجمها.
  - المجموعة الرابعة: تشرح علامات نضج البازيلاء، وتبين كيفية الاستدلال عليها.
- يعرض مقرررو المجموعات المهام التي كلفوا بها.
- تدوير عمل المجموعات لكي يتبادلوا الخبرات، ثم مناقشة النتائج وتدوينها على السبورة.

## البازيلاء Peas

الاسم العلمي: (*Pisum sativum*)

تزرع البازيلاء للاستفادة من بذورها الخضراء أو الجافة، وتستعمل في الطهي، طازجة، أو مجمدة، أو معلبة، أو مجففة. وتعدّ من أقل المحاصيل التي تزرع في الأردن، إذ بلغت المساحة المزروعة بها لعام ٢٠٠٩م (١٠٠٠ دونم) أنتجت ٩٥٠ طناً.

- ① المناخ: البازيلاء نبات شتوي تنبت بذوره في درجة حرارة ١٨س°، ولا تنبت إذا انخفضت الحرارة إلى ما دون ٥س°. وتتراوح درجة الحرارة المثلى اللازمة لنمو النبات بين ٢٠-٢٣س° في الشهر الأول من حياته، أمّا في الشهر الثاني فيناسبه من ١٠-١٧س°، ولا تعقد الأزهار عند ارتفاع درجة الحرارة عن ٢٣س°، أو أعلى من ذلك، فإذا ارتفعت فإن المحصول يقل، ويكون حجم القرون المتكونة صغيراً، وتقلّ جودة الثمار. والبازيلاء تحتاج إلى الضوء، ويقل إنتاجها عند زراعتها في مكان ظليل.
- ② التربة: تزرع البازيلاء في جميع أنواع الأراضي الرملية والطينية الثقيلة، الجيدة الصرف والتهوية، وأفضل درجة حموضة (pH) هي ٥,٥ - ٦,٨.
- ③ مواعيد الزراعة: تزرع البازيلاء زراعة مكشوفة ومحمية كما يأتي:

المنطقة	الزراعة المكشوفة	الزراعة المحمية
المرتفعات والبادية	١/١ - ١١/١	٤/١ - ١٢/١٥
الشفاغورية	١١/١	٣/١٥ - ٢/١٥
الأغوار	١١/١	١٢/١٥ - ١١/١

④ طرق الزراعة وكمية التقاوي: تختلف طرق زراعة البازيلاء في الأراضي المكشوفة عن المحمية كما يأتي:

١. الزراعة المكشوفة: تقسم الأرض إلى أتلانم، عرض كل منها (٦٠ - ٧٠) سم إذا زرعت على ريشتين، و٤٠ - ٥٠ سم إذا زرعت على ريشة واحدة، وتوضع البذور في حفرة، عمق كل منها (٢-٤) سم، وتكون المسافة بين النباتات ٧

٢٥٢

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر صفحة (٢٥٣)

- لئلا تتعفن البذور.

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم : الملاحظة
- أداة التقويم : السجل القصصي ( ٢ - ١٨ )

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

### للطالب

سم، للأصناف القصيرة، و ١٥ سم للأصناف الطويلة (المتسلقة)، ويمكن إنشاء مصاطب بالمسافات الزراعية وطريقة الزراعة نفسها بدلاً من الأتلام. وتزرع البذور بالطريقة الجافة، أي تزرع في تربة جافة ثم تسري، أو بالطريقة الرطبة بزراعتها في تربة رطبة، وربّها رطباً خفيفاً، وتركها حتى الإنبات.

٢. الزراعة المحمية: تزرع البذور في فتحات الملس على مصاطب عرضها من (٧٠ - ٨٠) سم، بعد أن تصبح التربة موفرة، وتزرع بين النباتات على بعد (٣٠) سم، وعلى طرفي الملس في المصطبة.

لماذا لا تروى نباتات البازيلاء إلا بعد اكتمال الإنبات؟

ويلزم لزراعة الدوّم ٧ كغم من البذور، ويفضل تعقيمها، وبخاصة الأصناف المعجدة.

١. **عمليات الخدمة بعد الزراعة:** تتشابه عمليات الترقيع، والخف، والعرق، والتسميد والتدعيم لنباتات البازيلاء مع نبات الفاصوليا، وتختلف في عملية الريّ، إذ تنظّم عملية الريّ كما يأتي:

١. تروى النباتات بعد اكتمال الإنبات، إلا إذا جفت التربة، فتروى رطباً خفيفاً.
٢. في مرحلة النموّ الأولى تطول فترات الريّ لمساعدة الجذور على التعمق والانتشار في التربة، ثم يزداد حتى مرحلة الإزهار.
٣. في مرحلة الإزهار يوقف الريّ مع مراعاة عدم التعطيش.
٤. في مرحلة نموّ القرون تزداد حاجة النبات للماء، فتقتصر فترات الريّ، وتزداد كمية الماء في الريّة الواحدة، وذلك لزيادة كمية القرون المتكونة، وزيادة البذور فيها.

٢. **الأصناف:** يزرع في الأردن العديد من الأصناف، منها: أسجرو، وأدوارد، وبروجرس، ولنكولن، وآلاسكا.

٣. **الآفات:** تصاب البازيلاء بحشرات، مثل: التربس، والمنّ، والدودة القارضة، وخنافس البقول، وتصاب بالأمراض الآتية: البياض الدقيقي، والزغبي، والذبول، والصدأ، وتصاب أيضاً بالعنكبوت والهالوك.

٤. **النضج والجنّي:** تقطف القرون الخضراء بوساطة اليد، بشدّها إلى أعلى عند امتلائها،

٢٥٣

وهي طرية، قبل أن تصفرّ، وذلك بعد (٧٠ - ٩٠) يوماً في الأصناف المتوسطة والطويلة، و (٥٠ - ٧٠) يوماً في الأصناف القصيرة. وتقطف القرون كل (٣ - ٧) أيام، ويستمر القطف شهراً ونصفاً إلى شهرين ونصف تقريباً، ويقدر إنتاج الدوّم من القرون بـ ٢٥٠ - ٧٠٠ كغم تقريباً.

### التقويم

- ١ - وضح علامات نضج قرون الفاصوليا الخضراء.
- ٢ - ما أضرار ارتفاع درجة الحرارة عن ٢٣ س° في الشهر الثاني من حياة البازيلاء.
- ٣ - صمّم برنامجاً لريّ البازيلاء منذ بداية الزراعة حتى النضج.
- ٤ - اذكر سبباً واحداً لكلّ من الظواهر الآتية:
  - أ - اصفرار قرون البازيلاء.
  - ب - اصفرار الأوراق، وسقوط الأزهار، والقرون الصغيرة في الفاصوليا.
  - ج - ظهور بقع بنية اللون على جوانب قرون الفاصوليا المعرضة لأشعة الشمس، وتحويلها إلى مائية غائرة.
  - د - تقزم قرون الفاصوليا، وانحناؤها، وتلفها، وخلوها من البذور.
  - هـ - صمّم برنامجاً لتسميد الفاصوليا.
  - ٥ - صف عملية تدعيم نباتات الفاصوليا والبازيلاء في البيوت المحمية.

٢٥٤

## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة الجزر.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالجزر.
- يوضح الطرق الملائمة لزراعة الجزر.
- يحدد مسافات زراعة الجزر.
- يحدد مواعيد زراعة الجزر في ضوء احتياجاته المناخية.
- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاج الجزر.
- يذكر أهم أصناف الجزر الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب الجزر.
- يصف علامات نضج الجزر لتحديد موعد جنيه.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر/ الأسئلة والأجوبة

- التمهيد للدرس يربط التعلم السابق بالتعلم اللاحق، طرح الأسئلة الآتية:
  - سمّ أنواع الخضراوات التي تنتمي لهذه الفصيلة؟ لماذا سميت هذه الفصيلة بهذا الاسم؟ عدد العناصر الغذائية الموجودة في الجزر؟ ما العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج الجزر؟ صف التربة الملائمة لزراعة الجزر؟
  - هل تختلف مواعيد الزراعة من منطقة إلى أخرى؟ كيف يمكن تحديد مسافات الزراعة؟ وضح طريقة زراعة الجزر؟
- تكليف الطلبة البحث عن علاقة النمو الخضري بالنمو الجذري (قضية بحث)، وعرض النتائج.
- مناقشة إجابات الطلبة وتدوين الصحيح منها على السبورة.
- التعلم التعاوني/ العمل الجماعي
  - تقسيم الطلبة الى مجموعات عمل، وتكليفها المهام الآتية:
    - المجموعة الأولى: توضح مفهوم الحف والعزق.
    - المجموعة الثانية: تصمّم برنامجاً لريّ الجزر وتسميده.
    - المجموعة الثالثة: تعرض أصناف الجزر التي تزرع في الأردن وأكثر الآفات التي تهاجمه.
    - المجموعة الرابعة: تشرح علامات نضج الجزر، وتبين كيفية الاستدلال عليها.
  - يعرض مقررهم المجموعات المهام التي كلفوا بها.
  - مناقشة النتائج بإشراف المعلم للتوصل إلى فهم موحد.

سميت هذه الفصيلة بالخيمية، لأن النورات الزهرية لنباتات هذه الفصيلة تشبه الخيمة أو المظلة، وتحتوي هذه الفصيلة على عدد كبير من الخضراوات المهمة الغنية بالعناصر الغذائية، مثل: الجزر، والبقدونس، والكرفس.

## الجزر Carrot

الاسم العلمي: (Daucus carota)

الجزر من الخضراوات الشتوية ذات القيمة الغذائية المرتفعة، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من السكر، وغني بمادة الكاروتين (أصل فيتامين "أ" "A")، بالإضافة إلى احتوائه على الفسفور، والحديد، والكالسيوم. ويؤكل من الجزر جذوره اللحمية المخزنة للمواد الغذائية، طازجاً، أو مطبوخاً، أو يشرب عصيراً. بلغت المساحة المزروعة به لعام ٢٠٠٩م (٥ الآف دونم) أنتجت ١ ألف طن.

المناخ: تعدّ الحرارة عاملاً محدداً لنمو الجزر وإنتاجه، إذ يلائمه جو معتدل، يميل إلى البرودة، وبما أنه محصول جذري فإنه يتأثر بحالة المجموع الخضري.

## مهارات البحث والاتصال

ابحث عن العلاقة بين النمو الخضري وتأثيره في النمو الجذري للجزر، باستخدام المصادر المعرفية المتاحة: (كتب، أو شبكة الإنترنت، ٠٠٠)، ثم اعرض ما توصل إليه من معلومات عن طريق برمجية العروض التقديمية، وناقشه مع زملائك.

إن درجة الحرارة المثلى لنمو الأوراق هي ٢٩ س°، ولنمو الجذور ٢٠ س°، وهذا يعني أن الجزر في الأطوار الأولى للنمو يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة لتكوين مجموع خضري جيد، وإلى درجة حرارة منخفضة في أطوار النمو المتأخرة لتكوين الجذور. أما ارتفاع درجات الحرارة فيؤدي إلى تكوين جذور غليظة، وقصيرة، وباهتة اللون.

يؤدي ارتفاع الحرارة إلى تكوّن جذور باهتة اللون، ما سبب ذلك؟

فكر

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الفروق الفردية

#### علاج

– تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن أضرار زيادة الري أو نقصانه في نمو الجزر وعرض نتائج عملهم ومناقشتها.

#### إثراء

– تكليف بعض الطلبة بالبحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن التربة الملائمة لزراعة الجزر في الأردن ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

### استراتيجيات التقويم وأدواته

– استراتيجية التقويم: القلم والورقة

– أداة التقويم: اختبار (٢ - ١٩)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

#### للمعلم

– محمد خليل فرحات، دليلك إلى زراعة الخضار والفاكهة والأعشاب، رشاد برس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٩م.

#### للطالب

– محمود القصاروي، الخضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط ٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

أما انخفاض درجات الحرارة عن ١٥ س° فيؤدي إلى إبطاء نمو الأوراق، وقلة تكوّننها، واستطالة الجذور، وجعلها باهتة اللون.

☞ التربة: بما أن الجزر محصول جذري فإنه يلائمه التربة المفككة الغنية بالعناصر الغذائية،

ذات درجة حموضة (pH) من ٦,٥ - ٨,٥.

☞ مواعيد الزراعة: يزرع الجزر في المواعيد الآتية:

المنطقة	موعد الزراعة
المرتفعات والبادية	٩ / ٣٠ - ٨ / ١٥
الشفاغورية	١١ / ٣٠ - ١٠ / ١
الأغوار	١٢ / ١ - ١١ / ١

☞ طرق الزراعة وكمية النقاوي: تزرع بذور الجزر في أحواض، أبعادها (١ × ١) م، أو

(١ × ٢) م، أو في أتلام بطريقتين، هما: البث، أو الزراعة في سطور، وذلك بعمل سطور داخل الحوض، يبعد كل منها عن الآخر (٢٠) سم، وعمقها لا يزيد على سنتيمتر واحد، ثم تغطى بطبقة رقيقة من التراب. ولا ينصح بتشتيل نباتات الجزر لزراعتها على جانبي الأتلام؛ لأنها تنتج جذوراً متفرعة غير منتظمة الشكل. ويلزم لزراعة دونم واحد ٢ - ٥ كغم من البذور.

☞ عمليات الخدمة بعد الزراعة: يحتاج الجزر إلى عمليات الخدمة الآتية:

١. الخف: تجرى عملية الخف للنباتات بعد حوالي شهر من الزراعة عند وصول طول النبات إلى ما يقرب من (٥ - ٦) سم، وتترك مسافة ٥ سم بين النباتات المزروعة في سطور، و ١٢ سم بين النباتات المزروعة نثراً.  
٢. العزق: يجب إجراء عملية العزق كلما دعت الحاجة، وخاصة في المراحل الأولى للنمو، حتى لا تكثر الأعشاب السريعة النمو، فتضعف نمو الجزر، ويكون العزق سطحيًا.

٣. الري: يحتاج الجزر إلى ري منتظم خلال مراحل نموه المختلفة للحصول على محصول جيد، إذ إن تعطيش النبات يكون جذوراً رفيعة وطويلة، وريّه بعد جفاف التربة فيؤدي إلى تشقق الجذور، أما زيادة الري فتزيد نمو المجموع

٢٥٦

الخضري، وتقلل النمو الجذري، وتخفض نسبة السكر والكاروتين.

٤. التسميد: يحتاج الجزر إلى السماد البلدي المختمر بمعدل طنين للدونم، يخلط بالتربة قبل الزراعة، ويحتاج إلى أسمدة كيميائية بمعدل (٧ - ١٢) كغم نيتروجين، و(٣ - ٤) كغم فوسفور، و(١ - ٤) كغم بوتاسيوم للدونم.

#### تكميل منهجي

عناصر الأسمدة الأساسية: N، P، K، لها تأثيرات في نبات الجزر، ابحث عن هذه التأثيرات، باستخدام المصادر المعرفية المتاحة: (كتب، أو شبكة الإنترنت، ٠٠٠)، ومستعيناً بكتاب الإنتاج النباتي م. الوحدة الرابعة، ثم اعرض ما تتوصل إليه من معلومات، وناقشه مع زملائك.

☞ الأصناف: هناك أصناف عديدة، منها: نانيس، ونايا، وسيناتور، ونيغويا.

☞ الآفات: يصاب الجزر بالعديد من الآفات، منها: أمراض التبرقش، والاصفرار، وتشقق الجذور، والحفارات، والمن، والنيماطودا، والهاولوك.

☞ النضج والحي: تنضج جذور الجزر بعد (٣ - ٤) أشهر من الزراعة بعد وصول جذور الجزر إلى الحجم المناسب للتسويق، ويقلع باليد باستعمال المرشوكي، أو بالمحراث، ويجمع المحصول وينظف من التراب، ويفرز، وتستبعد منه الجذور المشوهة، والمجروحة، والمشققة،

والمفترعة، والمصابة، ثم يدرج ويربط في حزم مع أوراقه، كما في الشكل (٢ - ١٨)، أو يعبأ في صناديق مناسبة من دون أوراق، ثم يسوق. ويقدر إنتاج الدونم بنحو طنين.



الشكل (٢ - ١٨): ربط الجزر في حزم.

٢٥٧



## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة البقدونس.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالبقدونس.
- يوضح طرق زراعة البقدونس.
- يحدد مسافات زراعة البقدونس.
- يحدد مواعيد زراعة البقدونس في ضوء احتياجاته المناخية.
- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاج البقدونس.
- يذكر أهم أصناف البقدونس الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب البقدونس.
- يصف علامات نضج البقدونس لتحديد موعد جنيهه.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## البقدونس Parsley

الاسم العلمي: (*Petroselinum Crispum*)

البقدونس من نباتات الخضراوات الورقية، انظر الشكل (٢-١٩)، يزرع للاستفادة من أوراقه الخضراء التي تستعمل طازجة، وفي السلطات والشوربات، وهناك أصناف تزرع للاستفادة من جذورها اللحمية.



الشكل (٢-١٩): نبات البقدونس.

والبقدونس غني بالمواد الغذائية، كفيتامين ج (C)، وأ (A)، وب١، وب٢ (B1، B2). ويحتوي على أملاح الكالسيوم، والبيوتاسيوم، والفسفور، والحديد.

المناخ: البقدونس من الخضراوات الشتوية، يلائمه جو معتدل يميل إلى البرودة، ولا يتحمل الصقيع.

ودرجة الحرارة المثلى لنموه من ١٠ - ١٢ س°، ويتجه إلى الإزهار السريع في حالة ارتفاع درجة الحرارة، وفي النهار الطويل.

التربة: تفضل زراعته في التربة المفككة التي لا تتشقق عندما تجف، ويزرع في جميع أنواع الأراضي الجيدة الصرف والتهوية الخالية من الأملاح.

مواعيد الزراعة: يزرع البقدونس ابتداءً من ١٥ / ٨ حتى أواخر شهر شباط، وفي الأردن يزرع حسب المناطق، وعلى مدار العام.

طرق الزراعة وكمية التقاوي: تزرع بذور البقدونس في أحواض، أبعادها (١ × ١) م، أو (١ × ٢) م، بطريقتين، هما: النثر، أو الزراعة في سطور تُعمل داخل الحوض، بحيث يبعد بعضها عن بعض ٢٠ سم، ثم تغطى بطبقة رقيقة من التراب. ويلزم لزراعة

دوتم واحد ٥ كغم من البذور.

عمليات الخدمة بعد الزراعة: تحتاج نباتات البقدونس إلى عمليات الخدمة الآتية:

٢٥٨

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر/ الأسئلة والأجوبة

- يطرح المعلم الأسئلة الآتية: ما الاسم العلمي للبقدونس؟ سَم أنواع خضراوات أخرى ورقية. ما العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج البقدونس؟ صف التربة المناسبة لزراعة البقدونس. اقترح مسافات مناسبة لزراعة البقدونس. ما الموعد المناسب للزراعة؟ صف طريقة زراعة البقدونس.
- إعطاء فرصة لكل فرد في المجموعة للتفكير في الإجابة.
- إجراء مناقشة داخل المجموعة الواحدة؛ للتوصل إلى الإجابة الصحيحة، ثم تدوينها على السبورة.
- إجراء مناقشة جماعية يديرها المعلم؛ للتوصل إلى الإجابات الصحيحة.

التدريس المباشر/ الأسئلة والأجوبة

- التمهيد للدرس بربط التعلم السابق بالتعلم اللاحق، وطرح الأسئلة الآتية:
- ما فائدة خف البقدونس؟ لماذا يجب الإسراع في إزالة أعشاب البقدونس؟ صمّم برنامجاً لرّي البقدونس وتسميده. اذكر أهم أصناف البقدونس التي تزرع في الأردن وأكثر الآفات التي تهاجمه.
- متى يقص البقدونس للتسويق؟
- مناقشة إجابات الطلبة، وتدوين الصحيح منها على السبورة.

## مراعاة الضرووق الفردية

### علاج

### إثراء

## استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم: التقييم المعتمد على الأداء
- أداة التقييم: سلم التقدير العددي (٢ - ٢٠)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

للمعلم  
- محمد خليل فرحات، دليلك إلى زراعة الخضار والفاكهة والأعشاب، رشاد برس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٩م.

للطالب  
- محمود القصاروي، الخضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط ٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

١. الخف: تترك مسافة ٥ سم بين النباتات.
  ٢. العزق: يجب إجراء عملية العزق كلما دعت الحاجة، وبخاصة في المراحل الأولى للنمو؛ حتى لا تكثر الأعشاب السريعة النمو، فتضعف نمو البقدونس، وتقلل من نوعيته عند الجني.
  ٣. الري: يجب توافر الرطوبة في التربة باستمرار؛ ليكون نمو البقدونس جيدًا.
  ٤. التسميد: يضاف السماد البلدي المختمر بمعدل طنين للدونم عند إعداد الأرض للزراعة، وتضاف أسمدة كيميائية تحتوي على (٣) كغم نيتروجين للدونم، تضاف بعد ٤ أسابيع من الزراعة، وتكرر بعد أن يجنى البقدونس في كل مرة.
- الأصناف: من أصناف البقدونس الورقية: البلدي، وتوصن، وفريزي، وهاي باك.
- الآفات: يصاب البقدونس بآفات متعددة، منها: أمراض الذبول، وتعفن الجذور، والتعفن البكتيري، والنيماطودا.
- النضج والجني: تحتاج نباتات البقدونس كي تصبح صالحة للتسويق إلى شهرين من الزراعة عندما تصل إلى الحجم المناسب، وتحش قريبًا من سطح التربة، وتربط في حزم، كما في الشكل (٢ - ٢٠)، وتسوق، ويكرر الحش كل ٣٠ يوم مرة. ويعطي الدونم عند جنيه في كل مرة طنًا واحدًا.



الشكل (٢ - ٢٠): ربط البقدونس في حزم.

٢٥٩

## أخطاء شائعة

## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة البصل.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالبصل.
- يوضح طرق زراعة البصل.
- يحدد مسافات زراعة البصل.
- يحدد مواعيد زراعة البصل في ضوء احتياجاته المناخية.

## المفاهيم والمصطلحات

المعالجة

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- يمكن طرح أسئلة على الطلبة، مثل: ما سبب الطعم الحار في البصل. لماذا يعدّ البصل من أهم الخضراوات غذائياً؟ صف الجو المناسب لزراعة البصل. لماذا يحتاج البصل إلى تربة خفيفة لزراعته؟ اذكر مواعيد زراعة البصل؟ هل هناك اختلاف في زراعة البصل (القنار) إذا زرع زراعة بعليّة أو زراعة مروية؟ فسّر سبب زراعة القنار على عمق جيد. لماذا تعدّ عملية الخف مهمة؟ بين أهمية عملية العزق.

- مناقشة الطلبة في إجابات الأسئلة.

- يدون أحد الطلبة الإجابات الصحيحة على السبورة .

- تكليف الطلبة البحث عن أسباب تكون الأبصال المزدوجة في البصل ( قضية بحث )، وعرض النتائج بوساطة شريحة عرض تقديمي.

التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- يطرح المعلم الأسئلة الآتية: ينصح بتوافر الرطوبة السطحية في التربة عند زراعة البصل، وضح ذلك. صمّم برنامجاً لتسميد البصل. اذكر أهم أصناف البصل التي تزرع في الأردن وأكثر الآفات التي تهاجمه. كيف يمكن الاستدلال على نضج البصل. ما المقصود بالمعالجة؟ وضح خطوات فرز محصول البصل وتعبئته.

- إعطاء فرصة لكل فرد في المجموعة للتفكير في الإجابة.

- إجراء مناقشة داخل المجموعة الواحدة، للتوصل إلى الإجابة الصحيحة، ثم تدوينها على السبورة.

- إجراء مناقشة جماعية يديرها المعلم للتوصل إلى الإجابات الصحيحة.

تضم هذه الفصيلة خضراوات كثيرة تنتمي إلى الجنس Allium، منها البصل، والثوم، والكراث، وتتميز نباتات هذه الفصيلة بأن بعضها يكون بصلة محددة، كالبصل، وبعضها الآخر يكون بصلة مركبة من بصيلات أو من فصوص، كالثوم.

## 1 البصل (Onion)

الاسم العلمي: (Allium cepa)

يعدّ البصل محصولاً استراتيجياً لبعض البلدان، ويزرع للاستفادة من أبصاله الجافة، أو أوراقه الخضراء، ويدخل في إعداد معظم أصناف الطعام، فهو يحسّن مذاقها، ويرفع قيمتها الغذائية؛ لاحتواء أوراقه الخضراء على فيتامين ب 2 (B2)، و ج (C). وأبصاله تحتوي على الكربوهيدرات، وأملاح الحديد، والكالسيوم، والفسفور، واليود، والكبريت المسؤول عن الرائحة المميزة للبصل، ويدخل الكبريت أيضاً في المادة العضوية المسؤولة عن الطعم الحار، فهي زيوت طيارة تسمى أليل بروبايل داي سلفايد (Allylpropyl disulfide). وبلغت المساحة المزروعة به في الأردن لعام 2009م (27 ألف دونم) أنتجت 70 ألف طن.

المناخ: يعدّ البصل من الخضراوات الشتوية، ويتأثر بالعوامل الآتية:

1. الحرارة: يحتاج البصل في أطوار نموه الأولى إلى درجات حرارة منخفضة تتراوح بين (13-24) س°، ثم يحتاج إلى درجات حرارة معتدلة في أطوار نموه الأخيرة.

فكر لماذا يحتاج البصل في أطوار نموه الأولى إلى حرارة منخفضة، في حين يحتاج في أطوار نموه الأخيرة إلى حرارة معتدلة؟

وفي حالة انخفاض درجة الحرارة عن 15.5 س° خلال تكوّن الأبصال، فإن الأبصال يتوقف تكوّنهما، أما إذا ارتفعت عن 21 س° خلال المدة نفسها فإن تكوّن الأبصال يزداد. وينتج البصل إلى الإزهار المبكر في حالة ملائمة للفترة الضوئية، وكذلك الأمر عند ارتفاع درجة الحرارة في بداية حياته، وانخفاضها عند تكوّن الأبصال، ويُعرف البصل بتحملة الصقيع.

٢٦١

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر صفحة (٢٦١)

- حتى يكون مجموعاً خضرياً جيداً في أطوار نموه الأخيرة.

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

– تكليف بعض الطلبة كتابة تقرير عن أسباب تكوّن الأبخال المزوجة في البصل، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

### إثراء

– تكليف مجموعة من الطلبة تصميم عرض تقديمي من ثلاث شرائح يتضمن الفرق بين طرق زراعة البصل بالقنار وبالبدور، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم التقدير العددي (٢ - ٢١)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

– محمود القصاروي، الخضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط ٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

### للطالب

- الضوء: تتأثر عملية تكوّن الأبخال بطول الفترة الضوئية وباختلاف الأصناف، فالأصناف العربية تحتاج إلى نحو (١٢ - ١٤) ساعة إضاءة، أما الأصناف الأجنبية فتحتاج إلى نحو (١٥ - ١٧) ساعة إضاءة، كالأصناف الهولندية.
- التربة: يحتاج البصل إلى تربة خفيفة مفككة غنية بالمادة العضوية، ودرجة حموضة (pH) من ٦ - ٦,٥، ويجب تجنب زراعته في تربة ثقيلة.
- مواعيد الزراعة: تختلف مواعيد زراعة البصل (أشتال أو قنار) حسب المنطقة كما يأتي:

المنطقة	موعد الزراعة
المرتفعات والبادية	١٢/٣١ - ٩/١
الشفاغورية	١٢/١٥ - ١٠/١
الأغوار	١/١ - ١١/١

طرق الزراعة وكمية القناري: يزرع البصل إما بالأشتال الناتجة من تشتيل البذور، وإما بالبدور أو بالقنار (البصيلات)، على النحو الآتي:

- الزراعة بطريقة التشتيل: تزرع البذور في أحواض، نثرًا، أو سطورًا، أو في صواني التشتيل، حتى يبلغ طول الشتلة (٢٠ - ٢٥) سم، وتصبح جاهزة للزراعة في الأرض الدائمة، ثم تزرع في مصاطب، عرضها (٥٠) سم في صفين، بجانب خطوط الري التي تُصنّف بنظام التنقيط، وتكون المسافة بين النباتات من (٧ - ١٠) سم، وقد تزرع في أتلام. ويجب ألا تعمق الأشتال في التربة، والاكتفاء بتغطية الجذور وجزء من الساق؛ وذلك لإنتاج أبخال كبيرة الحجم؛ لأن عمق الزراعة يؤثر في تكوّن الأبخال المزوجة.

### قضية للبحث

ابحث عن أسباب تكوّن ظاهرة الأبخال المزوجة في البصل، باستخدام المصادر المعرفية المتاحة (كتب، أو شبكة الإنترنت)، ثم عرض ما توصل إليه من معلومات، وناقشه مع زملائك.

- الزراعة بطريقة القنار (البصيلات): تُختار البصيلات التي قطرها أقل من ٢,٥ سم، ثم تزرع مباشرة في الأرض الدائمة في أي وقت في السنة، إلا أنه يفضل زراعتها بدءًا من الحريف حتى بداية الربيع بطريقتين، هما:

٢٦٢

أ. الزراعة البعلية: يزرع القنار في أتلام، المسافة بينها ٥٠ سم، وبين النباتات من ١٠ - ٢٠ سم في جور، ثم القنار في الثرى الرطب، ويغلى بالتراب الجاف؛ لمنع جفافها، ولا يروى.

ب. الزراعة المروية: يزرع القنار كزراعة الأشتال، باستخدام طرق الزراعة نفسها، في مصاطب، أو أتلام ثم يغلى القنار جميعه بالتراب. أما في حالة زراعة القنار لإنتاج البصل الأخضر فيفضل زراعة القنار على عمق كبير؛ لتكوين نباتات بأعناق بيضاء جذابة وطويلة، وتزرع أصناف البصل البيضاء لإنتاج البصل الأخضر، لجاذبيتها وطعمها الحلو. وتعدّ زراعة البصيلات قليلة الانتشار في الزراعات الواسعة، بسبب ارتفاع تكاليف البصيلات (القنار).

٣. زراعة البذور مباشرة في الحقل: تستخدم هذه الطريقة في حالة الزراعة بواسطة الآلات في كثير من بلدان العالم، وهذه العملية لا يزال استعمالها محدودًا في البلدان العربية، إذ تزرع البذور مباشرة في الحقل في أتلام.

### نشاط (٢-٤)

شارك زملائك في إعداد تقرير عن طريقة إنتاج بصيحات (القنار) البصل.

عمليات الخدمة بعد الزراعة: بعد زراعة البصل في الأرض الدائمة تحتاج النباتات إلى عناية كما يأتي:

- الترقيع: تجرى هذه العملية بعد أسبوعين من الزراعة.
- الحف: تفرّد النباتات بعد ٤٠ - ٦٠ يومًا من الزراعة، بترك مسافة ١٠ سم بين النباتات في حالة زراعة البذور مباشرة في الحقل.
- العزق: تجرى عملية عزق الأرض سطحيًا؛ للتخلص من الأعشاب، وتكويم التراب حول النبات منذ بداية حياة النبات مرات عدّة.
- الري: تتميز جذور البصل بأنها سطحية؛ لذلك يجب توافر الرطوبة في الطبقة السطحية وباستمرار، وبخاصة في مراحل النمو الأولى. وفي حالة الزراعة بالبدور تروى جيدًا؛ لأن قلة الماء تمنع إنبات البذور التي تكون مغطاة بطبقة من

٢٦٣

## النتائج الخاصة

- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاج البصل .
- يذكر أهم أصناف البصل الشائعة محلياً .
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب البصل .
- يصف علامات نضج البصل لتحديد موعد جنيه .

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر/ أسئلة وأجوبة

- يطرح المعلم الأسئلة الآتية :

- ينصح بتوافر الرطوبة السطحية في التربة عند زراعة البصل، وضح ذلك.
- صمّم برنامجاً لتسميد البصل. اذكر أهم أصناف البصل التي تزرع في الأردن وأكثر الآفات التي تهاجمه. كيف يمكن الاستدلال على نضج البصل؟
- ما المقصود بالمعالجة؟ وضح خطوات فرز محصول البصل وتعبئته.
- ما المدة اللازمة لنضج البصل في كلٍّ من البذور والقنار؟
- ما الفرق بين زراعة محصول البصل بالبذور والقنار؟
- ما المعاملات التي يجب إجرائها بعد نضج البصل في الحقل؟
- ما خطوات فرز محصول البصل وتعبئته قبل تسويقه؟
- مناقشة داخل المجموعة الواحدة، للتوصل إلى الإجابة الصحيحة وتدوينها على السبورة.
- مناقشة جماعية يديرها المعلم للتوصل إلى الإجابات الصحيحة للتوصل إلى فهم صحيح وموحد للطلبة جميعهم.

ملحق أدوات التقويم (٢-٢١).

الملاحق

الأغلفة الصلبة. وقلة الماء في النصف الثاني من حياة البصل تسرّع من نضجه، وتكون أبصلاً صغيرة الحجم؛ مما يؤثر في كمية المحصول، وأما عدم انتظام الري فيكون أبصلاً مشوهة. ويوقف الري قبل جمع المحصول بمدة (٣ - ٤) أسابيع.

لماذا يوقف الري قبل جمع محصول البصل بمدة ٤ أسابيع؟

فكر

٥. التسميد: يضاف (١ - ٢) طن من السماد البلدي المختمر للذونم عند إعداد الأرض، ويضاف السماد الكيميائي على النحو الآتي: (٥ - ١٠) كغم فسفور، و (٨) كغم بوتاسيوم، للذونم عند إعداد الأرض للزراعة.

٦. الأصناف: من الأصناف التي تزرع في الأردن: تكساس جرانو، وجيزة ٦، والمصري، والشامي، والسلموني الأبيض، وكانون.

٧. الآفات: يصاب البصل بآفات عديدة، منها: البياض الزغبي، والعفن الأبيض، وصدأ البصل، والترس، والمَر، وذبابة البصل، والحامول.

٨. النضج والجني: تختلف فترة النضج لمحصول البصل حسب طريقة الزراعة، فالأبصال الناتجة من زراعة البذور والأشتال تحتاج إلى ١٣٠ - ١٥٠ يوماً حتى تنضج، أما الأبصال الناتجة من زراعة القنار فتنتضج بعد (٩٠ - ١٠٠) يوم من زراعتها، أما البصل الأخضر



فيكون جاهزاً للتسويق بعد ٦ - ٨ أسابيع من الزراعة، كما في الشكل (٢-٢١)، ونستدل على علامات نضج البصل بما يأتي:

١. اصفرار الأوراق وجفافها.
٢. ضعف أنسجة عنق البصل.
٣. انحناء الأوراق إلى أسفل.

الشكل (٢-٢١): إنتاج البصل الأخضر.

٢٦٤

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

إجابة صندوق (فكر) صفحة (٢٦٤)

- حتى تجف أوراق الخارجية، مما يساعد على تخزينه وعدم تعفن رؤوسه.



## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف بعض الطلبة البحث في المصادر المتاحة (كتب، مواقع إنترنت، وغيرها) عن الفصيلة النرجسية، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم التقدير العددي (٢ - ٢١)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

للمعلم

للطالب

يبدأ جمع محصول البصل بعد انحناء ما نسبته ٥٠٪ من النباتات، ويجب عدم التبكير في جمع محصول البصل؛ لأنه يقلل من وزن المحصول، ولا ينصح بتأخير الجمع؛ لأنه يؤدي إلى انفصال الأوراق الحرشفية الخارجية عن البصلة، ويصبح لونها داكناً، وهي صفة غير مرغوبة. ويخلع البصل بواسطة اليد، أو المرشوكي، أو آلياً، ثم يجمع ويكوزم في طبقات قليلة الارتفاع لمدة (٣ - ٥) أيام في مكان جاف، وظليل، وجيد التهوية، وتسمى هذه العملية بالمعالجة.

لماذا يعالج البصل قبل التسويق؟

فكر

الفرز والتعبئة: تقطع أعناق الأبصال بواسطة سكين حادة، وتترك ٣ سم من عنق البصلة، لمنع وصول الفطريات إليها، وكي لا تتعفن عند التخزين، ثم يفرز البصل، وذلك باستبعاد الأبصال المزدوجة، وذات الحامل النوري، والمشوهة، وذات الأعناق الغليظة، والمكسورة، والمجروحة، والمصابة، والمخالفة لهيئة الصنف، ثم تبدأ عملية التدرج يدوياً، أو آلياً حسب الحجم، وتعبأ في أكياس من الخيش جيدة التهوية، ثم تسوق. أما البصل الأخضر فيخلع، ثم تقلم جذوره، وتنظف، وتزال أوراقه الخارجية، ويربط في حزم، ثم يسوق. ويبلغ إنتاج الدوم من محصول البصل الجاف ٤ أطنان تقريباً، أما إنتاج الدوم من محصول البصل الأخضر فيبلغ ٦ - ٨ أطنان.

## أخطاء شائعة

## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة الثوم.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالثوم.
- يوضح طرق الزراعة الملائمة للثوم.
- يحدد مسافات زراعة الثوم.
- يحدد مواعيد زراعة الثوم في ضوء احتياجاته المناخية.
- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاجه الثوم.
- يذكر أهم أصناف الثوم الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب الثوم.
- يصف علامات نضج الثوم لتحديد موعد جنيه.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر / الأسئلة والأجوبة

- التمهيد للدرس بربط التعلم السابق بالتعلم اللاحق، وطرح الأسئلة الآتية:
- ما أهم العناصر الغذائية التي يحتويها الثوم؟ هل تستخدم زيوت الثوم في الطب العلاجي؟
- وضح تأثير العوامل المناخية في نمو الثوم.
- لماذا لا ينصح بزراعة الثوم في تربة ثقيلة؟
- وضح طرق زراعة الثوم في مصاطب وأتلام.
- ما المقصود بزراعة الثوم تحمياً؟ صف عمليتي ترقيع الثوم وعزقه.
- صمّم برنامجاً لرّي الثوم وتسميده.
- اذكر أهم أصناف الثوم التي تزرع في الأردن وأكثر الآفات التي تهاجمها.
- تكليف الطلبة البحث عن زراعة الثوم زراعة تحميلية ( قضية بحث ).
- متى يصبح الثوم جاهزاً للتسويق؟
- مناقشة إجابات الطلبة، وتدوين الصحيح منها على السبورة.

## الثوم Garlic

الاسم العلمي: (*Allium sativum*)

تستعمل الثوم في غذاء الإنسان طازجاً أو مجفّفاً، وتدخل في الطهي في كثير من الأطعمة. لاحتوائه على كثير من العناصر الغذائية، فهو غني بالبروتين، والكاربوهيدرات، والأملاح المعدنية، والفيتامينات، والدهون والماء. ويتميز بأن له نكهة خاصة بسبب احتوائه على بعض الزيوت الطيارة، مثل أليل داي سلفايد، وأليل بروبايل داي سلفايد اللذين يستخدمان في الطب العلاجي، مثل معالجة التهاب الأمعاء والدوستناريا، وبسبب احتوائه على مركب له تأثير فعال ضد البكتيريا.

بلغت المساحة المزروعة بها في الأردن لعام ٢٠٠٩م ألفي دونم، أنتجت ألفي طن.

① المناخ: الثوم من الخضراوات الشتوية، وهو يتأثر بالعوامل المناخية الآتية:

١. الحرارة: يحتاج الثوم إلى جو معتدل يميل إلى البرودة في النصف الأول من حياته، وإلى جو دافئ، عند تكوين الأصيل ونضجها، إذ إن نمو النباتات، وتكون الرؤوس يتسارع بارتفاع درجة الحرارة، ودرجة الحرارة الملائمة لإنبات أسنان الثوم هي ١٥ س°.

٢. الضوء: ترتبط طول الفترة الضوئية بتكوين رؤوس الثوم، إذ يبدأ تكوين الرؤوس عندما تتعرض النباتات إلى نهار طويل.

٣. الرطوبة الجوية: يحتاج الثوم إلى رطوبة معتدلة، لأنّ الزيادة في الرطوبة تؤدي إلى انتشار الأمراض الفطرية.

⊖ التربة: تفضل زراعة الثوم في التربة الخفيفة، والمتوسطة القوام، الغنية بالمواد العضوية، الجيدة الصرف، الخالية من مسببات المرضية، وبخاصة مرض العفن الأبيض، ولا ينصح بزراعة الثوم في التربة الثقيلة؛ بسبب التصاق حبيبات التربة بجذور رؤوس الثوم، ممّا يصعب قلعها من الأرض، ويجعلها صغيرة الحجم، مشوّهة الشكل، فنقل قيمتها التسويقية.

⊖ مواعيد الزراعة: موعد زراعة الثوم مرتبط بطول الفترة الضوئية، فتبدأ زراعته في شهر أيلول وتشيرين الأول.

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر صفحة (٢٦٧)

- كلما قصرت الفترة الضوئية كان المجموع الخضري جيداً.

## مراعاة الضروك الفردية

### علاج

– تكليف الطلبة كتابة تقرير عن أضرار زراعة الثوم في التربة الثقيلة، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

### إثراء

## استراتيجيات التقييم وأدواته

– استراتيجية التقييم: القلم والورقة

– أداة التقييم: اختبار (٢-٢٢)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

### للطالب

– محمود القصاروي، الخضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط ٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

## فكر

فكر العلاقة بين تأثير الفترة الضوئية وارتباطها بموعد زراعة الثوم؟

طرق الزراعة وكمية الثقاوي: يمكن زراعة الثوم بطرق عدّة، منها:  
١. الزراعة في مصاطب مع الري بالتنقيط: تزرع أسنان الثوم في صفين في المصطبة، بجانب أنابيب الري التي تعمل بالتنقيط، وتكون المسافة بين الأسنان ١٠ سم، وعرض المصطبة ٨٠ سم، ويمكن زراعة الثوم محملاً على بعض المحاصيل، مثل البندورة.

### قصة للبحث

يزرع الثوم تحميلاً مع محاصيل أخرى، ابحث عمّا يقصد بالزراعة التحميلية، وعن المحاصيل التي تزرع معه، باستخدام المصادر المعرفية المتاحة: (كتب، أو شبكة الإنترنت،....)، ثم اعرض ما تتوصل إليه من معلومات، وناقشه مع زملائك.

٢. الزراعة في أتلام: تخطط الأرض لعمل الأتلام، بحيث تكون المسافة بينها ٦٠ سم، وتزرع أسنان الثوم على ريشتين، المسافة بينها ١٠ سم، إذ تزرع بعد ري التربة، على عمق من ٣ - ٥ سم، حتى تصبح موفرة، ثم تغطى الأسنان بالتربة. ويحتاج الدوتم إلى ما يقرب من ٢٠ - ٢٥ كغم من الثوم.

عمليات الخدمة بعد الزراعة: تحتاج نباتات الثوم إلى عمليات الخدمة الآتية:

١. الترقيع: ترقع الثوم عند الضرورة بعد أسبوعين من الزراعة في الحفر الغائبة.
٢. العزق: تنمو جذور الثوم سطحياً، كما تنمو جذور البصل، لذلك يجب أن يكون العزق سطحياً؛ حتى لا تتضرر الجذور، وتهدف هذه العملية إلى التخلص من الأعشاب، وبخاصة في بداية فترة النمو، لأن الثوم في بداية حياته يكون بطيء النمو، وتجري عملية العزق مرات عدّة.
٣. الري: يروى الثوم رياً معتدلاً ومنظماً، وبخاصة في بداية حياته؛ لأن عدم انتظام الري يؤدي إلى تكوين رؤوس مشوهة ومتشقة، تنضج قبل اكتمال حجمها، فيقل المحصول. ويؤدي تعطيش النبات في بداية حياته إلى نقص المحصول. يوقف الري قبل جمع المحصول بمدة (٣ - ٤) أسابيع، تجنّباً لتعفن الأوراق المغلقة للرأس؛ وحتى لا يسود؛ وتلتصق حبيبات الأتربة بالجذور.

٢٦٧

٤. التسميد: يضاف سماد بلدي مختمر بمعدل طنين للدوتم، وأسمدة كيميائية كما يأتي: ١٠ كغم نيتروجين، و ٨ كغم فوسفور، و ٦ كغم بوتاسيوم، تضاف على أربع دفعات، الأولى بعد شهر من الزراعة، ثم تضاف كل شهر دفعة.

الأصناف: هناك أصناف عديدة، منها البلدي، مثل الكسواني، والبيرودي، وأصناف أجنبية، مثل بنك، وكريول، والصيني، والياباني، وتاهيتي.

الآفات: يصاب الثوم بالآفات نفسها التي تصيب البصل.

النضج والحني: يحتاج محصول الثوم حتى ينضج إلى ما يقرب من ٦ - ٧ أشهر من الزراعة، ومن علامات النضج جفاف المجموع الخضري، وانحنائه باتجاه الأرض.

وتقلع الرؤوس باليد أو بالمرشوكي، أو آلياً. ويجمع المحصول بعد خلعها قبل أن تجف الأوراق تماماً، ويربط في مجموعات، ويوضع في مكان ظليل جيد التهوية، ويقلب حتى يجف، وتسمى هذه العملية بالمعالجة، ثم يستبعد منها الرؤوس المصابة، وغير الصالحة، والمجروحة، والمشوهة، والصغيرة، ثم تعبأ بعد إزالة أوراقها في أكياس من الخيش، أو تربط في حزم مع أوراقها، كما في الشكل (٢-٢٢)، ثم تسوق. ويبلغ إنتاج الدوتم من الثوم طنّاً واحداً إلى طنين تقريباً.



الشكل (٢-٢٢): ربط الثوم في حزم.

٢٦٨

## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة الملوخية.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالملوخية.
- يوضح الطرق الملائمة لزراعة الملوخية.
- يحدد مسافات الزراعة للملوخية.
- يحدد مواعيد زراعة الملوخية في ضوء احتياجاتها المناخية.
- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاج الملوخية.
- يذكر أهم أصناف الملوخية الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب الملوخية.
- يصف علامات نضج الملوخية لتحديد موعد جنيها.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر / الأسئلة والأجوبة

- التمهيد للدرس بعمل مراجعة سريعة للحصة السابقة، ثم ينفذ المعلم جلسة عصف ذهني، وي طرح الأسئلة الآتية :
  - هل تتحمل الملوخية البرودة؟ ما أفضل تربة لزراعة الملوخية؟
  - متى تزرع الملوخية في المرتفعات؟
  - صف طريقة زراعة الملوخية في البيوت المحمية.
  - صمّم برنامجاً لرّي الملوخية و تسميدها.
  - اذكر أهم أصناف الملوخية التي تزرع في الأردن وأكثر الآفات التي تهاجمها
  - ما الموعد المناسب لحشّ الملوخية؟
- إعطاء فرصة لكل فرد في المجموعة للتفكير في الإجابة.
- إجراء مناقشة داخل المجموعة الواحدة، للتوصل إلى الإجابة الصحيحة.
- إجراء مناقشة جماعية يديرها المعلم، للتوصل إلى الإجابات الصحيحة.
- تدوين الإجابات الصحيحة على السبورة.

## سابقاً

## الفصيلة اليزفونية Tiliaceae

يتبع هذه الفصيلة من الخضراوات نبات واحد هو الملوخية.

## 1 الملوخية (Jew's Mallow)

الاسم العلمي: (*Chorchorous alitorus*)

تزرع الملوخية للاستفادة من أوراقها الخضراء التي تستعمل في الغذاء، طازجة، أو مجففة، أو مجمّدة، فهي غنية بفيتامين أ (A)، وب (B)، وتحتوي على الفسفور، والكالسيوم. بلغت المساحة المزروعة بها في الأردن لعام ٢٠٠٩م ألفي دونم أنتجت ٤ آلاف طن.

1 المناخ: الملوخية من الخضراوات الصيفية، لا تتحمل البرودة، ويلائمها درجة حرارة تبلغ (٢٥ - ٣٠) س°، ولا تثبت بذورها في درجات حرارة منخفضة.

2 التربة: تجود زراعة الملوخية في التربة المتوسطة والثقيلة.

3 مواعيد الزراعة: تزرع الملوخية في الأردن حسب المواعيد الآتية:

الزراعة المحمية	الزراعة المكشوفة	المنطقة
٣/١-٢/١٠	٧/١-٥/١	المرتفعات والبيادية
٤/١٥-٢/١٥	٧/١-٥/١	الشفاعورية
	٥/١٥-٤/١٥	الأغوار

4 طرق الزراعة وكمية التقاوي: تزرع بذور الملوخية في أحواض مكشوفة، أو محمية داخل البيوت البلاستيكية، نثراً، أو في سطور. ويمكن زراعتها نثراً على مصاطب داخل البيوت البلاستيكية، وتزاد أنابيب الرّي بالتنقيط على المصطبة كي يصل الماء إليها جميعاً. ويحتاج الدونم من ٢ - ٣ كغم من البذور.

5 عمليات الخدمة بعد الزراعة: تجرى العمليات الآتية للملوخية :

١ . العزق: تخلع الأعشاب باليد كلما ظهرت.

٢ . الرّي: تروى الأرض بعد الزراعة مرة، أو مرتين، حتى يبدأ الإنبات، ويجب

المحافظة على رطوبة التربة في هذه المرحلة، ثم ينظم الرّي كل (٥ - ١٠) أيام،

حسب الحاجة؛ لأنّ الرّي المنتظم يجعل نموّ النبات منتظماً، والأوراق جيدة.

أما عمليتا الحفّ والترقيع فلا تجريان للملوخية.

٢٧٠

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر صفحة (٢٧١)

- لأنها محصول ورقي، فالنيتروجين يغذي الأوراق.

### مراعاة الضرووق الفردية

#### علاج

– تكليف بعض الطلبة كتابة تقرير عن طريقة زراعة الملوخية في البيوت المحمية، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

#### إثراء

– تكليف بعض الطلبة، تصميم عرض تقديمي من ثلاث شرائح يتضمن الفرق في طريقة جني الملوخية في الموسم الحار وجنيها في الموسم البارد، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

### استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم: التقييم المعتمد على الأداء
- أداة التقييم: سلم التقدير اللفظي ( ٢ – ٢٣ )

#### التكامل الأفقي

#### التكامل الرأسي

#### مصادر التعلم

#### للمعلم

– محمد خليل فرحات، دليلك إلى زراعة الخضار والفاكهة والأعشاب، رشاد برس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٩م.

#### للطالب

٣. التسميد: تحتاج الملوخية إلى عنصر النيتروجين أكثر من غيره من العناصر، لذلك يضاف ٢,٥ م ٣م للدونم من السماد البلدي المختمر عند إعداد الأرض للزراعة. وتضاف الأسمدة الكيميائية بعد كل حشة، كما يأتي: (٧ كغم) نيتروجين، و (٥ كغم) فسفور، و (١٠ - ٥) كغم بوتاسيوم للدونم.

#### فكر

لماذا تحتاج الملوخية إلى عنصر النيتروجين أكثر من بقية العناصر؟

١. الأصناف: تزرع في الأردن الأصناف الآتية: الشامية، كما في الشكل (٢ - ٢٣)، والمصرية ذات الساق الطويلة.

٢. الأوقات: تصاب الملوخية بالآفات الآتية: دودة القطن، والمن، والنطاط.

٣. النضج والجني: تحتاج الملوخية حتى تصل إلى الحجم المناسب في المواسم الباردة إلى ما يقرب من ٢,٥ - ٣ أشهر، ثم تقلع من الجذور. أما في المواسم الدافئة فتحش



قريباً من سطح الأرض بعد أن تصل إلى الحجم المناسب بعد شهر ونصف إلى شهرين من الزراعة. ويؤخذ منها (٤ - ٦) حشات، ثم تربط في حزم، أو تقطف أوراقها، وتعبأ في أكياس ثم تسوق. ويقدر إنتاج الدونم في كل حشة بـ (٤٠٠ - ٥٠٠) كغم.

الشكل (٢-٢٣): نبات الملوخية.

٢٧١

### أخطاء شائعة



## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة الباميا.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالباميا.
- يوضح الطرق الملائمة لزراعة الباميا.
- يحدد مسافات زراعة الباميا.
- يحدد مواعيد زراعة الباميا في ضوء احتياجاتها المناخية.
- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاجه الباميا.
- يذكر أهم أصناف الباميا الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب الباميا.
- يصف علامات نضج البامية لتحديد موعد جنيها.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر / الأسئلة والأجوبة

- التمهيد للدرس، وربط التعلم السابق بالتعلم اللاحق، وطرح الأسئلة الآتية:
  - ما الاسم العلمي للباميا؟
  - وضح تأثير العوامل المناخية في الباميا.
  - ما التربة المناسبة لزراعة الباميا؟ ما الموعد المناسب لزراعة الباميا؟
  - صف طرق زراعة الباميا المروية والباميا البعلية.
  - صف عمليتي الترقيع والعزق اللتين تجريان للباميا.
  - صمم برنامجاً لرّي الباميا وتسميدها.
  - اذكر أهم الأصناف التي تزرع في الأردن وأكثر الآفات التي تهاجم الباميا. ما أضرار تأخير قطف الباميا؟
  - ما كمية التقاوي لزراعة محصول الباميا؟
  - ما الفرق بين طريقة زراعة الباميا زراعة بعلية وزراعتها زراعة مروية؟
  - ما عمليات الخدمة الرئيسة لمحصول الباميا؟
  - ما أهم أصناف الباميا التي تزرع في الأردن؟
  - ما علامات نضج الباميا؟
  - ما معدل إنتاج الدونم من محصول الباميا في كل من الزراعة البعلية والزراعة المروية؟
  - ما سبب تلف ثمار الباميا؟
  - ما سبب وجود قرون فارغة في الباميا؟
- مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## الملاحق

ملحق أدوات التقويم (٢-٢٤).

## ثامناً

## الفصيلة الخبازية

## Malvaceae

تضم هذه الفصيلة عدداً كبيراً من الأجناس والأنواع، والقليل منها يزرع بوصفه خضراوات، وأهمها الباميا.

## ١ الباميا (Okra)

الاسم العلمي: (*Hibiscus Esculentus*) أو (*Esculentus Abelmoschus*)

تزرع الباميا للاستفادة من ثمارها الخضراء، سواء أكانت طازجة، أم مجففة، أم مجمدة.

① المناخ: الباميا من الخضراوات الصيفية، ولذلك تحتاج إلى موسم نمو طويل ودافئ، وتنبت بذورها في درجة حرارة ٣٠° س ولا تنبت إذا كانت أقل من ٢٠° س، ودرجة الحرارة الملائمة لنموها تتراوح بين (٣٠ - ٣٥)° س. وقد بلغت المساحة المزروعة بها في الأردن عام ٢٠٠٩ م حوالي (١٠ آلاف دونم) أنتجت ٥ آلاف طن.

## قضية للبحث

تتضرر الباميا إذا تعرضت لارتفاع درجة الحرارة عن المعدل، وإذا انخفضت عن ١٢° س، يبحث عن هذه الأضرار، باستخدام المصادر المعرفية المتاحة: (كتب، أو شبكة الإنترنت، ...)، ثم اعرض ما تتوصل إليه من معلومات عن طريق برمجية العروض التقديمية، وناقشه مع زملائك.

② التربة: يمكن زراعة الباميا في أنواع مختلفة من الأراضي، وتوجد في الأراضي المتوسطة القوام، الجيدة الصرف.

③ مواعيد الزراعة: تزرع الباميا حسب المواعيد الآتية:

المنطقة	موعد الزراعة
المرتفعات والبادية	١٥ / ٤ - ١ / ٥
الشفاغورية	٣ / ١٥
الأغوار	٢ / ١

④ طرق الزراعة وكمية التقاوي: تزرع الباميا بطريقتين، هما:

١. الزراعة المروية: تجهز الأرض لزراعة الباميا في أتلام أو مصاطب، المسافة بينها من (٨٠ - ٩٠) سم، أو في حفر صغيرة، يعد كل منها عن الأخرى ٣٠ سم،

٢٧٣

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر صفحة (٢٧٤).

- للمحافظة على الرطوبة حول البذور ولمنع تبخر الماء .

## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف عدد من الطلبة تصميم عرض تقديمي من ثلاث شرائح يتضمن زيادة إنتاج لباميا، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

## استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم: التقييم المعتمد على الأداء
- أداة التقييم: سلم التقدير العددي (٢ - ٢٤)

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

### للمعلم

### للطالب

– محمود القصاروي، الخضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط ٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

ويوضع في الحفرة من (٣ - ٤) بذور على عمق ٣سم، ثم تروى الأرض بعد الزراعة إذا زرعت البذور جافة.

٢ . الزراعة المطرية (البعلية): تزرع الباميا زراعة مطرية في المناطق التي تسقط فيها كميات كافية من الأمطار بطريقة أتلام، على أن تكون المسافة بينها متراً واحداً، وتوضع البذور المنقوعة في الماء قبل ٢٤ ساعة في حفر يبعد بعضها عن بعض ٨٠ سم في الترى الرطب، ثم تغطى بالتراب الجاف.

**فكر** لماذا تغطي بذور الباميا بالتراب الجاف في الزراعة المطرية بعد زراعتها في الترى الرطب؟

ويحتاج الدونم إلى ما يقرب من ٢ - ٣ كغم في الزراعة العادية، وينصح حالياً بزيادة كثافة الزراعة، أي تقريب مسافات الزراعة، وذلك للحصول على ثمار صغيرة الحجم؛ مما يرفع من قيمتها التسويقية، ويرغب المستهلك فيها.

**١** عمليات الخدمة بعد الزراعة: تحتاج الباميا إلى العمليات الآتية:

- ١ . الحفّ والترقيع: تجرى عملية حفّ الجور بإبقاء نبات واحد، وتزرع الجور الغائبة بعد أسبوع من الزراعة، ويضاف الماء بعد الحفّ أو الترقيع.
- ٢ . العزق: تعزق الأرض؛ للتخلص من الأعشاب، وتفكيك الطبقة السطحية من التربة، للمحافظة على رطوبة التربة.
- ٣ . الري: ينظّم الري في الزراعة المروية حسب حالة الجو ونوع التربة، بشرط ألا تعطش النباتات.
- ٤ . التسميد: يضاف طنّان من السماد البلدي المختمر للدونم في بداية فصل الشتاء في الزراعة البعلية، وعند إعداد الأرض للزراعة في الزراعة المروية، ولا تضاف الأسمدة الكيميائية في الزراعة (المطرية) البعلية، وتضاف في الزراعة المروية (٥ كغم) نيتروجين، و(١٠ كغم) فسفور، و(٥ كغم) بوتاسيوم للدونم.
- ٥ . الأصناف: تزرع في الأردن أصناف عديدة، منها: جرين ستار ف١، وكلمسون سبينلس، ووايت فلفت، والبلدي.

٢٧٤

**١** الآفات: تصاب الباميا بأمراض الذبول، والبياض الدقيقي، وتصاب بحشرات المنّ، والبقّ الدقيقي، وتصاب بالنيماطودا.

**٢** النضج والجنين: تقطف ثمار الباميا بوساطة اليد، أو بمقص التقليم، وهي صغيرة وطرية، بعد شهرين إلى شهرين ونصف من الزراعة، ويجب عدم تأخير جمع المحصول، حتى لا تليف ولا تتخشب، ولكي لا تزداد نسبة المادة المخاطية فيها، ومن أجل تنشيط النبات ومساعدته على تكوين ثمار جديدة كما في الشكل (٢ - ٢٤). ويبلغ معدل إنتاج الدونم في الزراعة البعلية (٢٠٠) كغم، وفي الزراعة المروية من (٥٠٠ - ٧٠٠) كغم.



الشكل (٢-٢٤): نبات الباميا.

### التقييم

- ١ - ما أسباب ظهور الحالات الآتية في الباميا من وجهة نظرك؟
  - أ - زيادة نسبة المادة المخاطية في الثمار.
  - ب - تليف الثمار.
  - ج - تكوّن ثمار فارغة.
- ٢ - صف طريقة الزراعة المطرية (البعلية) في الباميا.
- ٣ - قارن بين محصولي الباميا والملوخية من حيث:
  - أ - اسم الفصيلة.
  - ب - كمية التقاوي اللازمة للدونم.
  - ج - موعد الزراعة في المرتفعات.
  - د - درجة الحرارة.

٢٧٥

تشتمل هذه الفصيلة الخضراوات المهمة الآتية: السبانخ، والشمندر، والسلق. ويختلف الغرض الذي تزرع هذه النباتات من أجله، فقد تزرع للاستفادة من الأوراق، أو للإفادة من جذورها.

### السبانخ (Spinach)

الاسم العلمي: (*Spinacia oleraceae*)

السبانخ من الخضراوات الورقية الشتوية، التي تؤكل أوراقها مطبوخة، ولها قيمة غذائية مرتفعة؛ لاحتوائها على كميات كبيرة من الأملاح، والفيتامينات، والبروتين، والزيوت، والكربوهيدرات. وتحتوي السبانخ على حامض الأكساليك، وعند تناولها تتحد مع الكالسيوم في الجسم مكوناً أكسالات الكالسيوم غير القابل للامتصاص في الجسم، وهذا المركب يساعد على تكوين الحصى في الكلى، لذلك ينصح المتخصصون مرضى الكلى بعدم الإكثار من تناول السبانخ. وقد بلغت المساحة المزروعة بها في الأردن لعام ٢٠٠٩م نحو (٣) آلاف دونم، أنتجت ٥ آلاف طن.

المناخ: تتأثر السبانخ بالعوامل المناخية الآتية:

١. الحرارة: تجود زراعة السبانخ في المناطق التي يبلغ معدل درجة الحرارة فيها أثناء موسم النمو (١٦ - ١٨) س°. ويتوقف النمو عند درجة حرارة ١٠ س°، وإذا ارتفعت بعد ذلك فإن النبات يتهيأ للإزهار.

#### مهارات البحث والاتصال

تتأثر نبات السبانخ بارتفاع درجات الحرارة أثناء موسم النمو، ابحث عن هذه التأثيرات باستخدام المصادر المعرفية المتاحة: (كتب، أو شبكة الإنترنت،...) ثم اعرض ما توصل إليه من معلومات عن طريق برمجية العروض التقديمية، وناقشه مع زملائك.

٢. الضوء: يؤثر طول فترة الإضاءة في نبات السبانخ، فالأصناف البلدية تجود زراعتها في النهار القصير، أما النهار الطويل إلى الإزهار فيدفعها، على العكس من الأصناف الأجنبية.
٣. الرطوبة الجوية: يلائم السبانخ الجو الرطب إلى حد ما، ولكن إذا قلت الرطوبة فإن النمو يتباطأ، وقد تجف حواف الأوراق، وأما زيادتها فتساعد على انتشار الأمراض.

٢٧٦

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر صفحة (٢٧٧)

١١ / ١ -

## الفصيلة الرامرامية (السبانخ)

## الموضوع

### النتائج الخاصة

- يتعرف المناخ والتربة الملائمين لزراعة السبانخ.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالسبانخ.
- يوضح الطرق الملائمة لزراعة السبانخ.
- يحدد مسافات زراعة السبانخ.
- يحدد مواعيد زراعة السبانخ في ضوء احتياجاته المناخية.
- يتعرف العمليات اللازمة لإنتاج السبانخ.
- يذكر أهم أصناف السبانخ الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب السبانخ.
- يصف علامات نضج السبانخ لتحديد موعد جنيه.

### المفاهيم والمصطلحات

### السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التدريس المباشر / اسئلة وأجوبة

- التمهيد للدرس بعمل مراجعة سريعة للوحدة السابقة، ثم ينفذ المعلم جلسة عصف ذهني، وي طرح الأسئلة الآتية:
  - لماذا ينصح مرضى الكلى بعدم تناول السبانخ؟
  - ما الفترة الضوئية المناسبة لزراعة السبانخ؟
  - هل يتحمل السبانخ درجات الحرارة المرتفعة؟ ما أفضل تربة لزراعة السبانخ؟ صف طريقة زراعة السبانخ.
  - بين كيف تجرى عمليات الخدمة الآتية: الخف، العزق، الري، التسميد.
  - اذكر أهم أصناف السبانخ التي تزرع في الأردن وأكثر الآفات التي تهاجمه.
- تكليف الطلبة البحث عن أهمية عنصر النيتروجين ( قضية بحث )، ثم عرض النتائج ومناقشتها.
- تكليف الطلبة البحث عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة ( قضية بحث ) في السبانخ، ثم عرض النتائج.
  - صف طريقة جني السبانخ.
- مناقشة إجابات الطلبة، وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.

## مراعاة الضروك الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف بعض الطلبة تصميم عرض تقديمي من ثلاث شرائح يتضمن مواعيد زراعة السبانخ المناسبة في مناطق الأردن، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

## استراتيجيات التقويم وأدواته

- استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء
- أداة التقويم: سلم التقدير العددي (٢-٢٥)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

– محمد خليل فرحات، دليلك إلى زراعة الخضار والفاكهة والأعشاب، رشاد برس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٩م.

### للطالب

– محمود القصاروي، الخضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط ٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

التربة: تزرع السبانخ في أنواع مختلفة من الأراضي، ولكن أفضلها هي المتوسطة الخصبة الجيدة الصرف والتهوية، القليلة الملوحة، وذات درجة حموضة (pH) من (٦ - ٧).  
مواعيد الزراعة: تعتمد مواعيد الزراعة في الأردن على المنطقة والسن، ففي المناطق الغورية والشاغورية تزرع السبانخ في بداية شهر تشرين الأول.

**فكر** تأثر زراعة السبانخ بطول النهار وقصره، بناء على ذلك استنتج موعد الزراعة في المرتفعات؟

طرق الزراعة وكمية التقاوي: تزرع بذور السبانخ في أحواض، نثرًا، أو في سطور، وتكون المسافة بينها (١٥) سم، على عمق ٢ سم، ويحتاج الدونم إلى ما يقرب من ٣ كغم من البذور.

- عمليات الخدمة بعد الزراعة: تجرى للسبانخ العمليات الآتية:
١. الخف: تجرى هذه العملية بعد ٣ أسابيع من الزراعة، وترك مسافة من (٥ - ٨) سم بين النباتات. وقد تترك النباتات مزروعة لحين وصولها إلى الحجم المناسب للجنس، ثم تفلح الكبيرة من الأرض، وتنظف وتسوق، وتستمر النباتات الصغيرة في النمو، وتجري عملية الخف قبل الري.
  ٢. العزق: يجري العزق حول النباتات، لتنخلص من الأعشاب كلما ظهرت.
  ٣. الري: يجب توافر الرطوبة باستمرار، وذلك بتنظيم الري؛ لتأمين نمو سريع للنباتات، وتؤدي زيادة الري عن الحد اللازم إلى ضعف النمو، واصفرار الأوراق، ونقص المحصول، أما تعطيها فيوقف النمو، ويدفع النبات إلى الإزهار؛ مما يؤدي إلى خسارة المحصول.
  ٤. التسميد: يضاف طثان من السماد البلدي المخمر للدونم عند إعداد الأرض للزراعة، ويجب توفير عنصر النيتروجين في التربة، لأن المحصول ورقي، وبخاصة في حالة سقوط الأمطار الغزيرة، وتضاف أسمدة كيميائية بعد الزراعة كما يأتي: (٧ - ١٤) كغم نيتروجين، و (٤) كغم فسفور، و (٥) كغم بوتاسيوم، للدونم.

### قضية للبحث

بعد عنصر النيتروجين مهمًا لزراعة السبانخ، ابحث عن أهمية هذا العنصر باستخدام المصادر المعرفية المتاحة: (كتب، أو شبكة الإنترنت،...) ثم شارك زملاءك في إعداد تقرير، ناقشه معهم.

٢٧٧

**الأصناف:** تختلف أصناف السبانخ التي تزرع في الأردن، فمنها الأصناف الهجينة، مثل: أورينتال برايد ف١، و وينا ف١، ومنها العادية، مثل البلدي، كما في الشكل (٢-٢٥)، و سيقانا، و شروق.



الشكل (٢-٢٥): نبات السبانخ.

- الآفات:** تصاب السبانخ بآفات عديدة، كأمراض البياض الزغبي، والذبول الفيوزاري، والصدأ، وتصاب بحشرات المآ، وثاقبات الأوراق، والخنفساء البرغوثية.
- النضج والجنس:** تقطف أوراق السبانخ قريبًا من سطح الأرض عند وصولها إلى الحجم المناسب بعد ٤٠ - ٦٠ يومًا من الزراعة بواسطة السكين، ثم تقفز، وتستبعد منها الأوراق الصفراء، والمصابة، وتربط في حزم وتسوق. وتقطف النباتات عادة كل شهر مرة، ويؤخذ منها أربع حشات، ويبلغ إنتاج الدونم طثين تقريبًا في كل حشة.

### التقويم

- ١ - بين الأسباب التي تدفع نباتات السبانخ إلى الإزهار المبكر.
- ٢ - يشتكي مزارع من أن لون أوراق محصول السبانخ في بستانه أخضر فاتح، وأن الإنتاج قليل، فما سبب ذلك؟ وماذا تنصحه أن يفعل؟
- ٣ - كيف يمكنك حل مشكلة اتجاه نبات السبانخ إلى الإزهار؟

٢٧٨

## النتائج الخاصة

- يتعرّف المناخ والتربة الملائمين لزراعة الخس.
- يحدد كمية التقاوي اللازمة لزراعة مساحة معينة بالخس.
- يوضح الطرق الملائمة لزراعة الخس.
- يحدد مسافات الزراعة للخس.
- يحدد مواعيد زراعة الخس في ضوء احتياجاته المناخية.
- يتعرّف العمليات اللازمة لإنتاج الخس.
- يذكر أهم أصناف الخس الشائعة محلياً.
- يذكر أبرز الأمراض والحشرات التي تصيب الخس.
- يصف علامات نضج الخس لتحديد موعد جنيهه.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

## التدريس المباشر / الأسئلة والأجوبة

- التمهيد للدرس بربط التعلم السابق بالتعلم اللاحق، وطرح الأسئلة الآتية:
  - ما الاسم العلمي للخس؟
  - وضح تأثير العوامل المناخية في الخس.
  - ما التربة المناسبة لزراعة الخس؟
  - ما الموعد المناسب لزراعة الخس؟
  - صف طرق زراعة الخس.
  - صف عمليتي الترقيع والعزق اللتين تجريان للخس.
  - صمّم برنامجاً لرّي الخس وتسميده.
  - اذكر أهم أصناف الخس التي تزرع في الأردن وأكثر الآفات التي تهاجمه.
  - ما الأمور الواجب مراعاتها عند قطف الخس؟
- مناقشة إجابات الطلبة وتدوين ما هو صحيح منها على السبورة.
- تكليف الطلبة البحث عن أهمية الأسمدة الكيميائية (قضية بحث)، وعرض النتائج ومناقشتها.

تعدّ هذه الفصيلة من أكبر الفصائل النباتية، وأهم جنسين من الخضراوات يتبعان لها هما: الخس، والخرشوف.

## الخس Lettuce

الاسم العلمي: (*Lactuca sativa*)

يعدّ الخس من أهم الخضراوات الورقية، ويزرع من أجل الاستفادة من أوراقه الخضراء الغنية بفيتامينات (A)، وب (B2)، وج (C)، وأملاح الحديد، والفسفور، والكالسيوم، ولاحتوائه على البروتين والزيوت. بلغت المساحة المزروعة به في الأردن لعام ٢٠٠٩م (١٠ آلاف دونم) أنتجت ١٧ ألف طن.

① المناخ: الخس محصول شتوي يحتاج إلى حرارة معتدلة تميل إلى البرودة، ودرجة الحرارة المثلى لنموه تتراوح بين ١٢ - ١٨ س°، وإذا ارتفعت إلى ٢٦ س° فإن النبات يتجه إلى الإزهار، ويصبح طعم أوراقه مرّاً، وفي الأصناف التي تكوّن رؤوساً تبقى سائبة، ليس لها رؤوس. ولطول الفترة الضوئية تأثير في نبات الخس، فالنهار الطويل يسرّع إزهار النباتات في الزراعة المتأخرة، والخس من النباتات المحبة للضوء؛ لذلك ينصح بعدم زراعته بكثافة، أو في الظل؛ لأن ذلك يكون نباتات ضعيفة النمو، ورؤوساً مفككة غير مندمجة الأوراق.

② التربة: يزرع الخس في الأراضي المتوسطة القوام، الغنية بالمواد العضوية، الجيدة الصرف والتهوية، وذات درجة حموضة (pH) من ٥,٥ - ٦,٥.

فكر لماذا ينصح بزراعة الخس في الأراضي الخفيفة إذا كان موعد الزراعة والنضج في الجو البارد؟

مواعيد الزراعة: يزرع الخس في الأردن حسب المواعيد الآتية:

المنطقة	موعد الزراعة
المرتفعات والبيادية	١٠ / ١٥ - ١٠ / ١
الشفاعورية	٢ / ١ - ١٠ / ١
الأغوار	١٠ / ١٥ - ١٠ / ١

٢٧٩

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

فكر صفحة (٢٧٩)

- للحصول على محصول مبكر، خوفاً من البرد .



## مراعاة الفروق الفردية

### علاج

### إثراء

– تكليف بعض الطلبة تصميم عرض تقديمي من ثلاث شرائح يتضمن أسباب تكوّن رؤوس مفككة وغير مندمجة في نبات الخس، ثم عرض نتائج عملهم ومناقشتها.

## استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم: التقييم المعتمد على الأداء
- أداة التقييم: سلم التقدير العددي (٢ - ٢٦)

## التكامل الأفقي

## التكامل الرأسي

## مصادر التعلم

### للمعلم

– محمد خليل فرحات، دليلك إلى زراعة الخضار والفاكهة والأعشاب، رشاد برس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٩م.

### للطالب

– محمود القصاروي، الخضراوات، جامعة القدس المفتوحة، ط ٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

١. طرق الزراعة وكمية التقاوي: تزرع الأشتال عندما يصل طول الشتلة إلى ١٠ سم، أي بعد ٤ - ٦ أسابيع من زراعتها في المشتل، أو في صواني الشتيل في أتلام، المسافة بينها ٦٠ سم، وبين الأشتال ٢٥ سم، على ريشتين، أو تزرع في مصاطب، وتروى بالتنقيط، وتغطى بالملش، وفي كلتا الحالتين تزرع الأشتال بوجود الماء، وتغطى الجذور جميعها، ولا يزرع الخس زراعة عميقة؛ لأنه يكون حينئذ رؤوساً ضعيفة، أما الزراعة السطحية فتعطي رؤوساً جيدة الحجم. ويلزم للدونم ٥٠ غم من البذور.
٢. عمليات الخدمة بعد الزراعة: يحتاج الخس إلى العمليات الآتية:
  ١. الترياق: تجهز الأشتال لهذه الغاية؛ لإعادة زراعة الحفر الغائبة.
  ٢. العزق: يجرى العزق سطحيًا؛ خوفًا من تضرر الجذور؛ وذلك للتخلص من الأعشاب.
  ٣. الري: يحتاج الخس إلى الرطوبة باستمرار؛ لأن جذوره سطحية؛ لذلك لا يزرع زراعة مطرية (بعلية)، وينظم الري كما يأتي:
    - أ. مراحل النمو الأولى: يقلل الري في هذه المرحلة؛ لتشجيع الجذور على التعمق والانتشار في التربة، وأما زيادته فتؤدي إلى ضعف أوراق النبات، واصفرارها.
    - ب. مرحلة تكوين الرؤوس: ينظم الري على فترات متقاربة مع الانتباه إلى عدم زيادته؛ لأن ذلك يؤدي إلى تكوين رؤوس مفتوحة سائبة، ويجعل السيقان طويلة، ويكون الحوامل الزهرية.
    ٤. التسميد: يضاف طتان من السماد البلدي المختمر عند إعداد الأرض للزراعة، ويجب الحذر من إضافة الأسمدة، وبخاصة في الأيام الحارة؛ لأنه يدفع النبات إلى تكوين الحوامل الزهرية.

### قضية للبحث

الأسمدة الكيميائية مهمة لنبات الخس، ابحث عن برنامج لتسميد الخس كيميائيًا باستخدام المصادر المعرفية المتاحة: (كتب، أو شبكة الإنترنت، ٠٠٠)، ثم عرض ما توصل إليه من معلومات عن طريق برمجية العروض التقديمية، وناقشه مع زملائك.

٢٨٠

١. الأصناف: للخس أصناف كثيرة منها: نالا، وكورسيكا، وشالنج، ومارفيل، وسوبرمارفيل، والبلدي.
٢. الآفات: يصاب الخس بالأمراض الآتية: البياض الدقيقي، والزرغبي، والذبول، والموزايك، ويصاب بحشرة المن.
٣. النضج والجني: تحتاج رؤوس الخس حتى تنضج إلى نحو ٧٥ - ١٠٠ يوم من الزراعة، وتقطف بالسكين قريبًا من سطح الأرض عندما تصل إلى الحجم المناسب، بحيث تكون الرؤوس صلبة جيدة الالتفاف، وغير مستطيلة الساق كما في الشكل (٢-٢٦). ويجب مراعاة الأمور الآتية عند قطف الخس:
  ١. عدم تأخير الجني في الأيام الحارة حتى لا تستطيل السيقان، وتدفع إلى الإزهار.
  ٢. يجب جمع المحصول في الصباح الباكر، أو في المساء، قبل اشتداد الحرارة؛ حتى لا تذبل الأوراق.
  ٣. عدم جمع المحصول بعد سقوط المطر تجنبًا لانتشار المسببات المرضية في النبات. وبعد جمع المحصول تُزال الأوراق الخارجية، وتنظف الرؤوس، وتعبأ في صناديق مناسبة، ثم تسوّق. ويبلغ إنتاج الدونم من ٢,٥ - ٣ أطنان.



الشكل (٢-٢٦): نبات الخس.

٢٨١

## النتائج الخاصة

- يحدد علامات نضج الخضراوات.
- يجني محاصيل الخضراوات.

## المفاهيم والمصطلحات

## السلامة المهنية

- استخدام الأدوات بصورة صحيحة وآمنة.

## استراتيجيات التدريس وإدارة الصف / المشغل

التعلم عن طريق النشاط / التدريب

- تقسيم الطلبة إلى أربع مجموعات، وتكليفها المهام الآتية:
  - المجموعة الأولى: تجني بالسكين محاصيل الملفوف والكوسا والملوخية والخس وتدون الملاحظات.
  - المجموعة الثانية: تجني بمقص التقليم محاصيل الباذنجان والبطيخ والبايما وتدون الملاحظات.
  - المجموعة الثالثة: تجني بالمرشوكي محاصيل الجزر والبصل والثوم، وتدون الملاحظات.
  - المجموعة الرابعة: تجني باليد محاصيل البندورة والفاصولياء والفلفل وتدون الملاحظات.
- تبادل المجموعات وتنفيذ المهام بإشراف المعلم.
- تقويم المعلم أداء الطلبة.

## جني الخضراوات

التمرين  
(٧-٢)

## النتائج

يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا التمرين أن تكون قادرًا على أن:  
- تجني محاصيل الخضراوات.

## المواد المستخدمة والأدوات والتجهيزات

● سكين. ● مقص تقليم. ● مرشوكي. ● صناديق مناسبة. ● محاصيل خضراوات متنوعة.

## الرسوم التوضيحية

## خطوات العمل والنقاط الحاكمة



- ١- حدّد علامات نضج محاصيل الخضراوات حسب معاييرها.
- ٢- اجن المحاصيل الآتية بالسكين: الملفوف، والزهرة، والكوسا، والبقدونس، والملوخية، والسيانخ، والخس.
- ٣- اجن المحاصيل الآتية بمقص التقليم: الباذنجان، والبطيخ، والبايما.
- ٤- اجن المحاصيل الآتية بالمرشوكي: البطاطا، والفجل، والجزر، والبصل، والثوم.
- ٥- اجن المحاصيل الآتية باليد: البندورة، والفلفل، والفاصولياء، والبازيلاء.

## التقويم

- ١- قارن بين علامات نضج البطاطا والبندورة.
- ٢- كيف تحدّد بأن نبات الفجل جاهز للجني؟
- ٣- لماذا يوضع محصول البصل بعد جمعه في مكان ظليل؟
- ٤- ما أفضل وقت لجني المحاصيل الآتية:
  - أ- الخس.
  - ب- الباذنجان.
  - ج- السيانخ.

٢٨٣

## إجابات الأسئلة الواردة في المحتوى

### مراعاة الفروق الفردية

علاج

إثراء

### استراتيجيات التقييم وأدواته

- استراتيجية التقييم: التقييم المعتمد على الأداء
- أداة التقييم: سلم التقدير العددي ( ٢ - ٢٧ )

### التكامل الأفقي

### التكامل الرأسي

### مصادر التعلم

للمعلم

- محمود القصرأوي، الخضرأوات، جامعة القدس المفتوحة، ط ٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

للطالب

- محمود القصرأوي، الخضرأوات، جامعة القدس المفتوحة، ط ٢، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.

### أخطاء شائعة

